

23,654 / B


J. XXVI Fno



HANDBOEK

DER

VERLOSKUNDE.



Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b29291719>

HANDBOEK
DER
VERLOSKUNDE
VAN

L. F. VON FRORIEP,

UIT HET HOOGDUITSCH VERTAALD

NAAR DE ACHTSTE UITGAVE,

EN

MET EENIGE AANTEKENINGEN VERMEERDERD,

DOOR

S. J. GALAMA,

Stads Doctor in de Genees- en Verloskunde te Sneek,

*Lid van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap
van Kunsten en Wetenschappen.*



EERSTE DEEL.


bevattende

HET BESCHOUWENDE GEDEELTE.



TE AMSTERDAM, BIJ
R. J. BERNTROP.

1831.



20 9 1881

THE WELLS MEMORIAL



THE WELLS MEMORIAL

THE WELLS MEMORIAL

THE WELLS MEMORIAL

THE WELLS MEMORIAL

THE WELLS MEMORIAL

THE WELLS MEMORIAL

THE WELLS MEMORIAL

V O O R R E D E.

Onder de nieuwere Leerboeken der Verloskunde, die met een bijzonderen bijval ontvangen, en veelal ten leiddraad bij voorlezingen gebruikt zijn geworden, komt wel aan het theoretisch-praktisches Handbuch der Geburtshülfe zum Gebrauch bei academischen Vorlesungen und für angehende Geburtshelfer von L. F. VON FRORIEP eene voornamē plaats toe. Van 1802 tot 1827 is hetzelfde, telkens vermeerderd en verbeterd, achtmalen herdrukt. Bij het opstellen van hetzelfde heeft de Schrijver zich ten doel gesteld eene volledige schets der Verloskunde, volgens eene doelmatige orde en naar een doelmatig plan voor te dragen, en alle tegenstrijdigheid en dwaling te vermijden en zoo mogelijk uit den weg te ruimen. FRORIEP'S Handboek onderscheidt zich door behoorlijke kortheid en door duidelijkheid in de uitdrukking; in hetzelfde heeft Hij getracht de heerschende meeningen, begrippen, enz. op te geven, en het boek naar het tegenswoordige standpunt der wetenschap, zoo al niet (zoo als NAEGELE zegt) in een formeel opzicht, dan toch door het verzamelen van al het nieuwe, dat hem wetenswaardig voorkwam, in te rigten.

De gezochtheid, volledigheid, beknoptheid en doelmatigheid van genoemd Handboek, deden den Uitgever besluiten, hetzelve uit het Hoogduitsch in onze taal te doen overbrengen; oordeelende daarmede geen ondiens te zullen doen, aan met de Hoogduitsche taal onkundige, eerstbeginnende Verloskundigen.

Het werk nu eenmaal ter vertaling aangeboden zijnde, heb ik op verzoek, mij wel met de vertaling daarvan willen belasten. Daar mij echter toescheen, dat dit Handboek, ofschoon zeer geschikt voor akademisch onderwijs, echter voor eigene oefening te beknopt en niet altijd duidelijk genoeg was, daar ook de voornaamste inhoud (vooral der vroegere uitgaven) reeds in de uitmuntende Handleiding tot de Verloskunde van den Hoogleeraar SALOMON was opgenomen, zoo heb ik mij slechts met die taak willen belasten, onder voorwaarde van hier en daar den tekst te mogen uitbreiden (het geen echter spaarzaam geschied is), de bij ieder Hoofddeel gevoegde literatuur en de geschiedenis der Verloskunde met andere, mij belangrijk voorkomende Werken en Schrijvers te vermeerderen, en daar waar FRORIEP naar mijn oordeel te beknopt of te onduidelijk was, of daar waar ik in gevoelen van Hem verschilde, eenige korte aantekeningen te mogen bijvoegen; die echter veelal slechts moeten strekken om den lezer naar die Schrijvers te verwijzen, die over het onderwerp uitvoeriger hebben gehandeld. De aantekeningen die ik in de laatste jaren uit eigene ervaring, uit het gene ik in de tijdschriften en elders las, bij mijnen FRORIEP gemaakt had, het bij de mondelinge voordragt van mijnen onvergetelijken leermeester, den voor de Wetenschappen te vroeg verstorvenen Hoogleeraar BAKKER, opgeteekende, waarvan ik gebruik heb mogen maken, dit een en ander zou mij overvloedige stoffe hebben opgeleverd tot meer uitvoerige nooten en uitbreidingen, hadden niet het doel der uit-

gave van dit Handboek: om namelijk een kort, zoo veel mogelijk volledig, duidelijk, vooral echter niet zeer kostbaar werk te leveren mij daarvan terug gehouden; ik heb mij daarom alleen tot het noodzakelijkste moeten bepalen, en overigens (soms onder de door den Schrijver aangehaalde Werken, veelal echter in aan den voet der bladzijden geplaatste aantekeningen), naar de beste en nieuwste Verloskundige Werken verwezen.

Daar mijne vertaling reeds in 1830 was afgewerkt, heb ik van sommige, mij later bekend geworden en ter hand gekomene Handboeken (*), Verhandelingen, Tijdschriften, enz., geen gebruik kunnen maken, en daarom ook dat geene, wat § 15-17 als tijdrekenkundige tafel der geschiedenis gevonden wordt, niet verder kunnen uitbreiden. FRORIEP die ons eene eigenlijke pragmatische geschiedenis der Verloskunde beloofd heeft, wil het aldaar (§ 15 - 17.) vermelde, niet zoo zeer beschouwd hebben, als eene eigenlijke geschiedenis der Verloskunde, dan wel als een optelling der daartoe betrekking hebbende Schrijvers.

Toevallige oorzaken en omstandigheden, hebben den Uitgever dezes belet, dit theoretische en uitgebreidste gedeelte van dit Handboek spoediger in het licht te doen verschijnen; het praktische gedeelte, dat reeds voorlang ter perse was, zal spoedig volgen en daarbij de plaat, een behoorlijk register en eene lijst der drukfeilen, (die den vertaler, door verre afstand der drukpers, niet te wijten zijn) gevoegd worden.

De hier en daar in den tekst, door den Schrijver tusschen haakjes geplaatste vraagteekens, zijn door hem

(*) Vooral Dr. W. H. BUSCH's, *Lehrbuch der Geburtskunde*, Marburg 1829. 8; en het belangrijke *Handbuch der Entbindungskunst*, von Dr. P. B. OSIANDER, bearbeitet von Dr. JOH. FR. OSIANDER, 2 Theilen. Freiburg 1830. 8.

ingelascht, om zijne twijfeling, aangaande de aldaar vermelde zaken te kennen te geven, en tevens om over datgene, wat nog betwistbaar beschouwd kan worden, met zijne leerlingen te spreken.

In de voorrede voor de laatste uitgave van dit Handboek betuigt de Heer FRORIEP, dat veel ter verbetering van hetzelfde is toegebracht door FEILER te Landshut, D'OUTREPONT, te Wurzburg, NAEGELE, te Heidelberg, en vooral door BUSCH, te Marburg, die de goedheid gehad heeft den Schrijver een Exemplaar der zevende uitgave, met zijne aantekeningen voorzien te doen toekomen, van welke voornamelijk bij §. §. 65, 83, 135, 151, 154, 226, 239, 298, 299, 304, 306, 312, 318, 323, 364, 380, 383, 415, 419, 420, 421, 422, 423, 427, 429, 430, 450, 480, 507, 508, 541, 543, 552, 565, is gebruik gemaakt, en welke aanmerkingen op onderscheidene plaatsen door eene (B) worden gekenmerkt.

Overigens bevat de voorrede van den Schrijver niets belangrijks voor den lezer dezer vertaling. De hoop dat ook onze arbeid de goedkeuring van deskundigen zal wegdragen, en niet ongunstig moge worden ontvangen, en de zucht om anderen eenigzints nuttig te zijn, hebben ons tot de vertaling van dit werk doen besluiten. Indien wij dit doel eenigermate mogten bereiken en iets tot nut onder jeugdige mede-beoefenaars der moeilijke Verloskunde hebben mogen bijdragen, zullen wij ons voor de aan dit werk besteede moeite en tijd dubbeld beloond achten.

G.

Sneek 26 Junij 1831.



I N H O U D

VAN HET

BESCHOUWENDE GEDEELTE.



INLEIDING. - - - - - bladz. 1.

EERSTE AFDEELING.

EERSTE HOOFDDEEL. *Van het Bekken.* bladz. 74.

- I. Van de beenderen des bekkens. - — 75.
- II. Van de vereeniging der beenderen van
het bekken. - - - - - — 79.
- III. Van de holte des vrouwelijken bek-
kens, deszelfs verdeeling, gedaante
en ruimte. - - - - - — 81.
- IV. Van de asfen des bekkens. - — 88.
- V. Van het verschil van het vrouwen- en
mannen-bekken. - - - - - — 95.
- VI. Van de gebreken van het vrouwen-
bekken. - - - - - — 97.
- VII. Van de zachte deelen, welke binnen
en buiten het bekken gevonden wor-
den, met uitzondering van de teel-
deelen. - - - - - — 103.

TWEEDE HOOFDDEEL. <i>Van de uitwendige</i>		
<i>teeldeelen.</i>	- - -	bladz. 108.
Gebreken der uitwendige teeldeelen.	-	— 112.
DERDE HOOFDDEEL. <i>Van de inwendige teel-</i>		
<i>deelen.</i>	- - - -	— 114.
I. Van de scheede.	- - -	— 115.
II. Van de baarmoeder.	- - -	— 118.
III. Van den trompetten van FALLOPIUS en de eijerstokken.	- -	— 127.
IV. Van de verrigtingen der inwendige vrouwelijke teeldeelen, afgescheiden van de zwangerheid, de verlossing en het kraambed.	- - -	— 130.
VIERDE HOOFDDEEL. <i>Van de borsten.</i>		— 134.

TWEEDE AFDEELING.

De leer der Zwangerheid.

EERSTE HOOFDDEEL. <i>Van de zwangerheid</i>		
<i>in het algemeen.</i>	- -	bladz. 137.
I. Van de bevruchting.	- - -	— —
II. Van de verschillende soorten van zwan- gerheid.	- - -	— 141.

TWEEDE HOOFDDEEL. *Van de veranderingen van het vrouwelijk ligchaam gedurende de zwangerheid.* — bladz. 149.

- I. Van de veranderingen van het vrouwelijke ligchaam, die door de ontleding ontdekt worden. — — — —
- II. Van de veranderingen van het vrouwelijke ligchaam, die men door het gezigt en het gevoel waarneemt. — 153.

DERDE HOOFDDEEL. *Van het menschelijk ei, en de daarin bevatte vrucht.* — 160.

- I. Van de deelen, die de vrucht omgeven. — 161.
- II. Van de menschelijke vrucht. — 177.
- III. Van eenige eigendommelijkheden der menschelijke vrucht in het bijzonder. — 186.
- IV. Van de misvormingen van het ei en van de vrucht. — 193.

VIERDE HOOFDDEEL. *Van de teekenen der zwangerheid.* — 201.

- I. Van de teekenen der eenvoudige zwangerheid. — 202.
- II. Van de teekenen der veelvuldige zwangerheid. — 212.
- III. Van de teekenen der zwangerheid buiten de baarmoeder. — 213.

- IV. Van de kenteekenen van den dood des kinds gedurende de zwangerheid. bladz. 217.
- V. Van de teekenen der misvorming van het ei. — — — — — 218.
- VI. Van de tijdrekening in de zwangerheid. — —
-

DERDE AFDEELING.

De leer der Verlosfing, Geboorte of Baring.

EERSTE HOOFDDEEL. *Van de verlosfing in het algemeen.* — — — bladz. 220.

TWEEDE HOOFDDEEL. *Van de gewone verschijnselen bij de verlosfing.* — — 230.

DERDE HOOFDDEEL. *Van de regelmatige verlosfingen, en van het werktuiglijke beloop derzelve.* — — — 240.

- I. Van de hoofdgeboorten. — — —
- II. Van de aangezichtsgeboorten. — — 250.
- III. Van de voetgeboorten. — — — 255.
- IV. Van de kniegeboorten. — — — 260.
- V. Van de stuitgeboorten. — — — 261.

VIERDE HOOFDDEEL. *Van de onregelmatige verlosfingen.* - - - - - bladz. 265.

- I. Van de onregelmatige verlosfingen, wegens eene gebrekkige ligging des kinds. - - - - - — 266.
- II. Van de onregelmatige verlosfingen, door ziekten en gebreken van het ligchaam der moeder. - - - - - — 276.
- III. Van de onregelmatige verlosfing, ten gevolge van gebreken en ziekten van het kind. - - - - - — 303.
- IV. Van de onregelmatige verlosfingen, door verkeerde kunsthulp. - - - - - — 315.
- V. Van de ontijdige verlosfing. - - - - - — 316.

VIJFDE HOOFDDEEL. *Van den dood des kinds, gedurende de verlosfing.* - - - - - — 323.

VIERDE AFDEELING.

De leer van het Kraambed.

EERSTE HOOFDDEEL. *Van het regelmatige beloop des kraambeds.* - - - - - bladz. 327.

TWEEDE HOOFDDEEL. *Van eenige ziekten en toevallen der kraamyrouwen.* - - - - - — 332.

- I. Van de bloedstortingen uit de baarmoeder na de verlossing. - bladz. 334.
- II. Van de stuipen na de verlossing. — 337.
- III. Van de zogkoorts. - - — 339.
- IV. Van de kraamvrouwenkoorts. - — 342.
- V. Van de omkeering der baarmoeder. — 349.
- VI. Van eene bijzondere vooroverkanteling van de baarmoeder, die in een hoek gebogen is. - - — 351.
- VII. Van de ontsteking der borsten. — 353.
- VIII. Van de scheuring des bilnaads, de zwelling der schaamlippen, en de ontwrichting des staartbeens. — 355.

DERDE HOOFDDEEL. *Van eenige ziekten en toevallen der pasgeboren kinderen.* — 357.

- I. Van eenige ziekten der pasgeborenen. — 358.
- II. Van de plaatselijke toevallen, door de verlossing te weeg gebragt. - — 362.
- III. Van eenige aangeborene plaatselijke gebreken. - - - — 363.



INLEIDING.

§. 1.

De Verloskunde (in een uitgebreiden zin) bevat de grondstellingen en regelen, door wier toepassing men zwangere, barende en kraamvrouwen, als ook pasgeboren kinderen voor gevaren tracht te behoeden, en de reeds aanwezige te verminderen, of geheel weg te nemen.

§. 2.

Het doel der verloskunde is: *bij elke verlossing de meest mogelijke overeenstemming met den regelmatigigen gang der natuur te bewerken, alle dreigende afwijkingen voor te komen en te vermijden, en werkelijk voorhandene af te weren of zoo mogelijk onschadelijk te maken, of met andere woorden: verhoeding, afwending of althans vermindering van alle gevaar voor moeder en kind; dewijl iedere afwijking van den regelmatigigen gang der natuur met meer of minder gevaar verbonden is, hetwelk, zoo mogelijk, verwijderd moet worden.*

§. 3.

Dit doel der verloskunde blijft steeds hetzelfde, hetzij het de bespoediging of de vertraging der ver-

losfing vordert; hetzij men hetzelfde bereike blootelijk door diëtetifche en geneeskundige voorfchriften, door veranderde ligging, of door de hulp der handen of van instrumenten; hetzij door middelen, die volkomen zonder gevaar, of door zulken, die zelfs met gevaar verbonden zijn, wanneer flechts het door het middel te weeg gebragt gevaar geringer is, dan dat, hetwelk daardoor verwijderd moet worden.

§. 4.

Het is derhalve verkeerd, het doel der verloskunde, zoo als voorheen gefchiedde, bij het enkele verlossen van het kind uit den fchoot zijner moeder te bepalen, dit is veeleer flechts een der voornaamfte middelen, om dat doel te bereiken. Wanneer het bij eene verlosfing aanwezige gevaar, door eenig ander, voor de moeder of het kind minder gevaarlijk middel weggenomen kan worden, dan is het doel der verloskunde zonder verlosfing bereikt, en fomwijlen vordert zelfs het doel der verloskunde de verlosfing te vertragen of te verhoeden. — Niet minder is het eene verkeerde meening, de verloskunde, wegens de bij haar voorkomende kunstbewerkingen, blootelijk voor een deel der heekunde te houden: tot de verloskunde behooren evenzeer geneeskundige grondftellingen en regelen. De verloskunde is de kunst om de gezondheid te bewaren en om de verlorene gezondheid te herftellen, met bijzondere betrekking tot het in §. 2. aangewezen doel.

D. M. MENDEL, *über das Verhältniss der Geburtshülfe zur Medizin*; im Hamb. Magazin für die Geburtshülfe. 2tes Stück. S. 143.

D. WILH. AUG. GEORGI, *zwei Vorträge über den Begriff von Chirurgie und Geburtshülfe, und die Bedingungen ihrer Ausübung.* Tub. 1817. 4.

ED. CASP. JAC. DE SIEBOLD, *Med. Stud. Commentatio exhibens disquisitionem, an ars obstetricia sit pars chirurgiae?* Gött. 1824. 4.

§. 5.

De omvang der verloskunde is zeer uitgebreid. De *vrouw* is, wat het hoofddoel van haar aanwezen betreft, van het tijdstip der bevruchting af tot op den tijd, dat de onmiddellijke gevolgen der verlosfing voorbij zijn, met de *vrucht* het onderwerp der verloskunde. Voor, gedurende en na de verlosfing, is het de taak van den verloskundige, om de gevreesde nadeelige invloeden op moeder en kind te verhinderen, en de reeds aanwezigen te verwijderen of ten minste onschadelijk te maken.

§. 6.

Om een gepast overzicht van de verloskunde te geven, en hare beoefening gemakkelijker te maken, verdeelt men dezelve reeds sedert lang in twee deelen; in het theoretische, bespiegelende of beschouwende en in het praktische, beoefenende of werkdadige; deze afdeelingen zijn ook door ons behouden. Het *theoretische gedeelte* bevat de leer van alle die onderwerpen, waarop het praktische deel der verloskunde toegepast wordt; het leert den regelmatigigen gang der natuur, en de afwijkingen daarvan kennen, duidt de oorzaken der regelmatigheid en onregelmatigheid aan, zoodat alles wat over den gang der natuur licht ver-

ispreiden kan daartoe behoort. Uit de kennis van het theoretische deel nu, laten zich regelen afleiden, om de overeenstemming met den regelmatigen gang der natuur te bewaren, en afwijkingen daarvan (den onregelmatigen gang der natuur en de daarmee verbondene gevaren) te verhoeden en af te weren. Deze regelen behooren tot het *praktische gedeelte*, dat men derhalve beschouwen moet, als geheel op het theoretische gegrond.

§. 7.

Het *theoretische* gedeelte bevat in zich:

1) *De ontleed- en natuurkunde van die deelen der vrouw, welke met de bevruchting, de zwangerheid, de verlossing en het kraambed in de naaste betrekking staan*, in den regelmatigen, zoowel als onregelmatigen toestand. Daar deze deelen, waarvan de kennis eigenlijk tot de voorbereidende kundigheden (§. 11.) behoort, in de ontleedkunde alleenlijk op zich zelve, zonder bepaalde toepassing, afgehandeld worden, is eene *korte* beschouwing derzelven *met bijzondere toepassing op de verloskunde*, hier niet geheel overtollig.

2) *De leer der zwangerheid*: hiertoe behoort

a) de beschrijving der veranderingen en achtereenvolgende verschijnselen, welke in het vrouwelijk lichaam, van het tijdstip der bevruchting af tot aan het begin der verlossing, volgens het regelmatige en onregelmatige beloop, plaats hebben.

b) de beschrijving der ontwikkeling en bijzondere hoedanigheden der vrucht, in een ontleed- en natuurkundig opzicht.

3) *De leer der verlossing*: deze beschrijft

a) de verrigting der geboorte of baring in het algemeen, en der verschillende wijze van baring in het bijzonder, in zoo verre zij regelmatig plaats heeft.

b) de afwijkingen van den regelmatigen gang der natuur bij de verlossing; de oorzaken, door welke deze afwijkingen te weeg gebragt worden; de gebreken van de zijde der moeder, van het kind, enz.

4) *De leer van het kraambed*: hiertoe behoort de beschrijving

a) van het regelmatig beloop der verschijnselen van het kraambed, met betrekking tot moeder en kind;

b) die van het onregelmatig beloop of der afwijkingen van den regelmatigen gang van het kraambed; van het beloop, de oorzaken en de voorzegging van de ziekten der kraamvrouwen en pasgeborene kinderen.

§. 8.

Het *praktisch gedeelte* bevat:

1) De zoo zeer gewigtige leer van het *onderzoek*: (de regelen en hulpmiddelen, door welker aanwending men de in de zwangerheid, bij de verlossing en gedurende het kraambed voorkomende verschijnselen en veranderingen erkennen kan); die men voorheen zeer te onregt in de leer der zwangerheid behandelde.

a) Het onderzoek met de hand.

b) Het onderzoek met instrumenten.

2) De regelen, volgens welke de overeenstemming met den regelmatigen gang der natuur verkregen, en afwijkingen daarvan tegengegaan kunnen worden.

a) De zorg voor de deelen, die in den gezonden toestand, met de bevruchting, de zwangerheid, de verlosfing en het kraambed het allernaast in betrekking staan.

b) De regelen, die gedurende de zwangerheid moeten worden gevolgd.

c) De regelen, die bij eene regelmatige verlosfing moeten worden in acht genomen.

d) De regelen, gedurende het regelmatige kraambed te volgen.

Hierbij bepaalt zich hoofdzakelijk *de post der vroedvrouwen*, het eigenlijke gebied der *lagere verloskunde*, die tot de hoogere verloskunde genoegzaam in dezelfde verhouding staat, als de gezondheidsleer tot de leer van de behandeling der ziekten. (*Therapia.*)

3) De regelen, naar welken reeds aanwezige afwijkingen van den regelmatigen gang der natuur en het daardoor gedreigde gevaar verwijderd kunnen worden.

Deze regelen betreffen:

a) De behandeling van plaatselijke toevallen, der bij de verlosfing in werking zijnde deelen.

b) De behandeling der ziekten en toevallen eener zwangere vrouw.

c) De hulp der kunst bij alle onregelmatige verlosfingen, met betrekking tot moeder en kind.

d) De behandeling van het onregelmatige kraambed, van de ziekten der kraamvrouwen en pasgeborene kinderen.

Dit is de eigenlijke *verloskunde*, het veld van den verloskundigen arts of vroedmeester. Het gevaar wordt nu verwijderd:

a) Of door de *algemeene* op de krachten en de verschillende weeffels van het ligchaam werkende middelen (*geneeskundige verloskunde*),

b) of door *werktuigelijk* werkende, *plaatselijke* middelen (*heelkundige verloskunde*); de hulp met de handen en instrumenten.

Om te menigvuldige herhalingen te vermijden, wordt deze genees- en heelkundige verloskunde niet afzonderlijk maar gezamenlijk voorgedragen.

NÄGELE, *Erfahrungen und Abhandlungen aus dem Gebiete der Krankh. des Weibl. Geschl.* 1812. S. 15.

§. 9.

Het theoretische gedeelte moet het praktische voorafgaan, beide echter nauwkeurig beoefend worden, anders is de uitoefening der verloskunde niets, dan eene verderfelijke Empirie, een bloot handwerk. Niet ieder genees- of heelkundige kan of mag de verloskunde *uitoefenen*, doch *beoefend moet dezelve worden door een ieder*, die op den naam van een wel onderwezen genees- of heelkundige aanspraak maken, den post van geregteijk geneesheer waarnemen of zich met de behandeling van de ziekten der vrouwen en kinderen onledig houden wil.

J. G. RÜDERER, *Orat. de artis obstetriciae praestantia etc.* Gött. 1752. *recus. in ejusd. opusculis.*

SECKER, *de artis obstetriciae studio medicis quam maxime necessario.* Viteberg 1811. 4.

§. 10.

Men acht het leeren der verloskunde gewoonlijk veel te ligt, men bedenkt niet, dat eene onvolkomene

kennis nergens meer nadeel stichten kan, dan hier; men beschouwt haar als bijzaak, en besteedt aan haar den behoorlijken tijd niet, hoezeer zij toch altijd over het leven en de gezondheid van twee of meer menschen gaat en derhalve belangrijker kan worden dan de genees- en heilkunde. (*) — Hare zoo groote belangrijkheid voor en invloed op het huisfelijk geluk, de bevolking en de gezondheid, moest daarom ook de staatsbesturen meer opmerkzaam op dezelve maken, en vooral te weeg brengen, dat dat gedeelte der verloskunde, hetwelk aan vroedvrouwen toevertrouwd is, naar de vatbaarheid en kundigheden dezer vrouwen beperkt mogt worden. (*)

(*) *Etwas über Nothwendigkeit, mehr Zeit auf das Studium der Geb. Hülfe zu wenden.* FUNK, in *Baldinger's N. Mag. für Aerzte*. XIV. 2.

JOH. P. FRANK, *Geneeskundige Staatsregeling, uit het Hoogd. door H. A. BAKE*. I. D. bl. 496. Leid. 1797.

CH. AUG. LANGGUTH, *de cura, qua respublica prosequi debeat rem obstetriciam*. Viteb. 1782—1789. DEZELFDE in *STARK's Archiv*. I Bd. 4. St. en II Bd. 1. St.

J. G. KNEBEL, *Grundriss der polizeilich gerichtlichen Entbindungskunde*. 2 Bde. Breslau 1801. 1803. 8.

JOH. A. SCHMIDTMÜLLER, *Conspectus polittiae obstetriciae*. Erl. 1801. 8.

L. G. SCHMIDTMANN's *ausführliche praktische Anleitung zur Gründung einer vollkommenen Medicinalverfassung und Polizei*. Hannov. 1804. 2 Bde. I Bd. Cap. 4.

C. F. HEINSSE, *Ideen und Vorschläge zu einer zweckmässigen Einrichtung des gesammten Hebammenwesens und der Kunstlichen Geburtshülfe*. Freiberg 1806. m. 1. pl.

(*) J. P. WEIDMANN, *de officio artis obstetriciae concedendo solis viris*. Mog. 1804. 4.

EJUSDEM, *annotatio ulterior: quomodo res ista intra virorum solas manus tradi possit.* Mog. 1807. 4.

WIEDEMANN, *wie weit soll und muss man beim Hebammen-unterrichte gehen?* in WIGAND's Hamb. Magazin. II Bd. 1. St. S. 176.

MENDEL'S *Versuche u. s. w.* S. 115.

SCHMIDTMÜLLER, *welchen Wirkungskreis hat die Polizei den Hebammen anzuweisen?* in *Asclepieion*. 1811. N^o. 5 en 6.

§. 11.

Tot de *hulpmiddelen eener grondige beoefening* der verloskunde, behooren niet alleen de voorbereidende kundigheden, welke tot de beoefening der genees- en heelkunde in het algemeen vereischt worden, maar ook reeds verschillende deelen der genees- en heelkunde zelve; zoo als de ontleed- en dierenkunde, de natuurkunde van den mensch, de ziektekunde, de gezondheidsleer (vooral de kennis der voor- en nadelen van de gewone ligchamelijke opvoeding der meisjes,) de leer der geneesmiddelen, de eigenlijke genees- en heelkunde. (*) Eerst dan wanneer men met deze kundigheden is toegerust, kan het mondelijk en schriftelijk onderrigt over alle deelen der verloskunde, en de toepassing van dit onderrigt op het Fantome en bij levenden, onder eene geregelde opleiding in *welingerigte kraamvrouwengeflichten* een volledig nut aanbrengen. — Bovendien kan het aanleeren der verloskunde nog zeer bevorderd worden door teekenen, schilderen, enz.

(*) De schrijver had hier kunnen bijvoegen de beginselen der meetkunde.

JOH. CARL ACKERMANN'S *Winke zur Verbesserung der Bildungsanstalten für Aerzte, Wundärzte, Geburtshelfer und Hebammen*. Posen en Leipzig 1803. 8.

ELIAS VON SIEBOLD, *über den praktischen Unterricht in der Entbindungskunst*. Nurnb. 1803. 8.

DEZELFDE, *über Zweck und Organisation der Klinik in einer Entbindungsanstalt*. Wurzb. 1806. 4.

A. F. NOLDE, *Gedanken über die Zweckmässigste Einrichtung und Benutzung öffentlicher Entbindungsanstalten*. Braunschweig 1806. 4.

EL. DE SIEBOLD, *oratio ad inaugurandum institutum obstetricium universitatis Berolinensis*. Berol. 1818. 4.

§. 12.

De hoedanigheden, die in een goeden verloskundige vereischt worden, zijn de volgende:

1) Met betrekking tot het ligchaam: duurzame gezondheid en sterke, welgevormde, geëvenredigde lichaamsbouw, gespierde armen, die aan den voorhand niet te dik zijn, ranke, buigzame, noch te breede, noch mismaakte handen, die, met een fijn gevoel der vingers, eenige vaardigheid tot werktuigelijke verrigtingen bezitten, en waarbij de linker even zoo goed gebruikt kan worden als de regter. (Vermijding van handenarbeid, zorgvuldige onderhouding der nagels, alsmede het dragen van handschoenen, dienen tot versijning der handen).

2) Ten aanzien der ziels- en gemoedshoedanigheden: eene juiste, levendige verbeeldingskracht, een doordringend vaardig oordeel, vastberadenheid, koelbloedige volharding zonder roekeloosheid en wreedheid, voorzigtigheid zonder schroomvalligheid, geduld en verschooning der vrouwelijke teergevoeligheid.

(Menschlievendheid, gemoedelijkheid, onbaatzuchtigheid en pligtgevoel; kieschheid, geheimhouding, matigheid, enz., zijn eigenlijk voor een ieder, maar vooral voor een goeden vroedmeester, onmisbaar.) Komt hierbij nog eene geoorloofde Politiek, eenig *savoir faire*, (levenswijsheid) dan mag men zich belooven, van niet alleen een bekwaam, maar ook een geacht en gezocht verloskundige te worden.

PT. GF. JÖRDENS, *von den Eigenschaften eines ächten Geburtshelfer, eine Skizze*. Leipzig 1789.

A. VON SOLINGEN, *over de verpligtingen der verloskundigen, in het bestuur der hartstogten, bij de geboorte van den mensch*. Middelb. 1802. 8.

E. V. SIEBOLD, *Handb. over de kennis en genezing der ziekten van het vrouwelijk geslacht*; uit het Hoogd. door J. J. GAASWIJCK. Amst. 1827. I D. bl. 121.

§. 13.

Het leeren der verloskunde is moeilijk, en hare uitoefening met menigvuldige zwarigheden en zelfs onaangenaamheden verbonden, maar de verloskundige wordt daarvoor ook weder beloond. In geen deel der geneeskunde, zoo als het thans met dezelve gesteld is, kan men de gelukkige afwending van het gevaar met zoo veel zekerheid aan zich zelve of aan zijne bekwaamheden toeschrijven, als in de verloskunde. De grenzen, buiten welke de natuur niet meer werken kan, laten zich in de verloskunde dikwijls op het nauwkeurigste bepalen. In zulke gevallen kan het zeer duidelijk betoogd worden, dat de kunst alleen volbragt, wat de natuur niet vermogt te volbrengen, en in zulke gevallen mag men dan ook aan de dank-

baarheid van de geredde met volkomen regt eenige waarde hechten, dewijl men zeker weet, die verdiend te hebben, hetwelk bij den geneesheer tot heden niet altijd zoo stellig het geval is.

Dr. M. F. L. EISFELD, an Herrn Dr. HENCKEL in Berlin, *über das Angenehme und Unangenehme bei Ausübung der Geburtshülfe etc.* Quedlinburg 1764. 8.

G. D. BÖSSEL, *über das Angenehme und Unangenehme bei Ausübung der Geburtshülfe.* Quedlinburg 1764. 8.

H. B. L. LEMBKE, *Beantwortung der Schrift von der Beschwerlichkeit der Geburtshülfe.* Lubeck 1769. 8.

§. 14.

Al eer wij tot het eerste of theoretische gedeelte overgaan, zullen wij hier nog een tijdrekenkundig overzicht van de geschiedenis der verloskunde laten volgen; ofschoon het mischien voor den eerstbeginnenden doelmatiger is, de geschiedenis der wetenschap, als ook vele der tot dus verre in de inleiding behandelde zaken, zoo lang te besparen, tot dat hij een algemeen overzicht van het geheele leerstelsel verkregen heeft. De *pragmatische geschiedenis* der verloskunde moet uit de hulpbehoefte der barende vrouw, als ook uit het daardoor verwekte medelijden, uit de allengskens toenemende beschaving der menschen, uit de waarde, welke verschillende volken in het leven van de moeder en van het kind stellen, uit de vorderingen van den geheelen omvang der geneeskunde, uit de door volkszedes of vooroordeelen te weeg gebragte grootere of geringere verwijdering des mannelijken geslachts van de zwangere of barende vrouw, uit de op verschillende tijden heerschende theorien en scho-

len, en uit de dikwijls verkeerd geplaatste eerezucht van eenige mannen, die zich aanzien wisten te verwerven, geput worden.

§. 15.

De geschriften over de geschiedenis der verloskunde zijn de volgende:

La pratique des accouchemens, contenant l'histoire critique de la doctrine et de la pratique des principaux accoucheurs, qui ont paru depuis Hippocrate jusqu'à nos jours etc. par Mr. ALPHONSE LE ROI Dr. a. Paris, 1776. 8. — Onvolledig, voornamelijk in de buitenlandfche literatuur, en partijdig omtrent zeer vele fchrijvers. De door Dr. NUSCHE in het licht gegevene Duitfche vertaling (*Literairhistorie und praktischer Unterricht in der Entbindungskunst etc. Frankf. Leipz. Memming. 1779. kl. 8.*) heeft nog den voorrang boven het oorfpronkelijke.

Essais historiques, littéraires et critiques sur l'art des accouchemens etc. par Mr. LE SUE. Paris, 1773. 2 vol. 8. LE SUE, gelehrte und kritische Versuche einer Geschichte der Geburtshülfe etc., a. d. Fr. Altenburg. 1786 en 87. 8. — Beter, onpartijdig, wijdloopig, voor het overige lezenswaardig.

Lehre der Geburtshülfe, zur Anwendung nach ächten Grundsätzen und der Erfahrung gemäss, bearbeitet, auch mit praktischen Anmerkungen durchgehends erläutert von JOS. WEYDLICH, 1. Th. Wien 1797. 8. — Onvoltooid, niet op eigene beoefening der bronnen gegrond, en onaangenaam om te lezen, wegens de dikwijls met gedwongenheid bijgebragte wederlegging van het bovenaangehaalde werk van LE ROI.

- Dr. F. B. OSIANDER's. *Lehrbuch der Entbindungskunst*.
 1 Th. *Literarische und pragmatische Geschichte dieser Kunst*. Gött. 1799. — De volledige en beste letterkundige geschiedenis der verloskunde die wij tot heden toe bezitten, maar, zoo als bij geschiedschrijvers van denzelfden leeftijd moeilijk te vermijden is, eenigzins onbillijk jegens verschillende latere verloskundigen.
- NOLDE's *Beiträge zur Geburtshülfe*. Erfurt 1811. 8. 3. St. p. 8 — 68.
- OSIANDER's *Lehrbuch der Hebammenkunst*. Gött. 1796. 8. Bevat eene uitmuntende geschiedenis der verloskunde, doch die in een boek voor onze gewone vroedvrouwen niet te pas komt.
- W. SCHMITT's *Geburtshülfl. Fragm.* Wien 1804. S. 1. volg. JOERG, in het *neuste Journal der Erfindungen etc.* 1 Bd. 1 St. 1801. 8.
- J. Z. PLATNER, *de arte obstetricia veterum*. Lipsiae 1735. 4. *Schreiben des Hrn Hofraths BÖTTIGER in B. CH. FAUST Guter Rath an Frauen über das Gebären*. Hannov. 1811.
- J. F. KNOLLE Ep., *de artis obstetriciae historia*. Argentor 1738 en 1773. 8. Voor dien tijd vrij goed.
- A. VAN SOLINGEN, *Orat. inaug. de praestantia recentiorum in arte obstetricia progressuum*. Middelb. 1793. 8.
- N. VAN DER EEM praes. E. SANDIFORT, *Diss. de artis obstetriciae hodiernorum prae veterum praestantia, ratione partus naturalis*, Lugd. Bat. 1783. 8. en
- N. VAN LEEUWEN praes. E. SANDIFORT, *Diss. de artis obstetriciae hodiernorum prae veterum praestantia, ratione partus difficilis et praeternaturalis*, L. B. 1783. 8. Goede geleerde bijdragen.
- J. F. SCHWEIGHÄUSER, *Tablettes chronologiques de l'histoire de la médecine puerpérale*. Strafsb. 1806. 8. — Leveren een zeer goed overzicht op.

KURT SPRENGEL's *kritische Uebersicht des Zustandes der Arzneikunde in dem letzten Jahrzehend*. Halle 1801. — Wegens de literatuur van de jaren 1790—1800 lezenswaardig.

Fragmentorum ex Geographia Nosocomiorum atque Institutorum ad artem obstetriciam spectantium. Spec. I. II. auctore JOAN GULIELM. SCHLEGEL, Dr. en Onderwijzer der vroedvrouwen te Merseburg. Lipsiae 1801. 4. — Zeer gepast en dienstig.

C. E. FISSCHER, *Bemerkungen über die Englische Geburtshülfe*. Gött. 1797. 8.

J. A. BOCK, *Beschreibung der neuen Pariser Entbindungs- und Findelanstalten etc.* Berlin 1804. 8.

JOH. FRIEDR. OSIANDER, *Bemerkungen über die Französische Geburtshülfe, nebst einer ausführlichen Beschreibung der Maternité in Paris*. Hann. 1813. 8.

Deszelfs *Nachrichten von Wien etc, über Gegenstände der Chir. und Geburtshülfe*. Tübingen 1817. 8.

CHOULANT in de *Bereicherungen für die Geburtshülfe und für die Physiologie und Pathologie des Weibes und Kindes, herausgegeben von D. L. CHOULANT, HAASE, KÜSTNER und MEISSNER*. Leipz. 1821. 1. Bd.

M. ONSLOW deelt onder de Rubriek *Obstetric researches* zijne waarnemingen mede over de vorderingen der verloskunde in Engeland, in *The London Medical Repository*. 1821. N^o. 81—83.

Onder de Handboeken der verloskunde bevatten SMELLIE, ASTRUC, JACOBS en DENMANN eene goede korte geschiedenis der kunst. Kurt SPRENGEL heeft ook in zijn *Geschichte der Medizin*, 3. Aufl. 1821—30. 8. — en in zijne *Geschichte der wichtigsten churgische operationen*. Halle 1805—19. veel tot teregtwijzing in de geschiedenis der verloskunst bijgedragen.

Zeer nauwkeurige, in een geestigen en kernachtigen stijl geschrevene, bijdragen bevat ook de tweede afdeeling van F. C. NAEGELE's werk: „*das weibliche Becken, betrachtet in Beziehung auf seine Stellen, und die Richtung seiner Höhle, nebst Beiträgen zur Geschichte der Lehre von den Beckenaxen.* Carlsr. 1825. mit 3 Tab."

§. 16.

Schrijvers over de boekenkennis van de verloskunde:

- JOH. ANT. VAN DER LINDEN, *de scriptis medicis libri duo edid.* G. A. MERKLIN. Norimb. 1686. 4.
- H. BOERHAAVE, *methodus studii medici.* Edt. A. V. HALLER. Amstel. 1774. 4. Tom. II.
- A. ab. HALLER, *Bibliotheca chirurgica.* Bernae 1774 en 75. T. II.
- STEPH. HIERON. DE VIGILIIS VON CREUTZENFELD, *Bibliotheca chirurgica.* Vindob. 1781. T. II.
- G. GODOFR. PLOUQUET, *Initia bibliothecae medico-practicae et chirurgicae realis.* Tom. I—VIII. Tub. 1793 — 1797. 4.
- EJUSD. *continuatio et supplementa initiorum bibliothecae medico-practicae et chirurgicae.* Tom. I—III. Tub. 1799—1802. 4. — Nieuwe uitgave, onder den titel: *Literatura medica digesta sive Repertorium medicinae practicae, chirurgiae atque artis obstetriciae.* Tom. I—IV. Tub. 1808. in gr. 4. benevens een supplement. Tub. 1813. 4.
- LUD. SCHWEIKARD, *tentamen catalogi rationalis dissertationum ad artem obstetriciam spectantium.* Francf. a. M. 1795. 8. Eene bijdrage daartoe bevat BALDINGER's *Neues medizinisch-physisches Journal.* 1797—1802. III. Bd. 8.
- P. USTERI, *Repertorium der medizinischen Literatur der Jahre 1789—94.* Zürich und Leipzig 1790—96. 8.

Annalen der Geburtshülfe, Frauenzimmer und Kinderkrankheiten für 1790—91. von D. H. RÖMER, Winterthur 1793 und 1794. 8.

F. H. MARTENS, *kritisches Jahrbuch der Geburtshülfe.* Leipz. 1802. 8.

J. A. SCHMIDTMÜLLER, *Jahrbuch der Geburtshülfe etc.* Ook onder den titel: *der stand der Geburtshülfe der neuesten Zeit.* Erlangen 1807. 8.

AD. EL. VON SIEBOLD, *Lehrbuch der theoretisch-practischen Entbindungskunde.* Nürnberg. 1812—20. 1. Bd. §. 43—54.

J. G. RICHTER'S *chirurgische Bibliothek.* Gött. 1772—96. 15. Bde. 8.

J. CH. TR. SCHLEGEL, *sylloge minorum operum praestantiorum ad artem obstetriciam spectantium.* Lipsiae 1795—96. 2. Bde. 8.

J. S. ERSCH, *Repertorium der gesamten Literatur der Jahre 1785—90 und 1791—95.* Jena 1791. en Weimar 1800. 4. Abth. V.

Archives de l'art des accouchemens par J. F. SCHWEIGHÄUSER, 3de en 4de stuk. Strasb. 1802. 8.

CH. F. LUDWIG, *Einleitung in die Bücherkunde der praktischen Medicin.* Leipz. 1806. 23ster Abschnitt.

IMMANUEL MEYER, *Repertorium der gesamten medicinischen Literatur.* Berlin 1809. 2. Bde. 1822. 8.

K. F. BURDACH, *Literatur der Heilwissenschaft.* 3. Bde. 1810—11. 1822. 8.

J. S. ERSCH, *Literatur der Medicin seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit.* Leipz. 1812. 8. Neue fortgesetzte Ausgabe von FR. AUG. BENJ. PUCHELT. Leipz. 1822. 8.

Bibliotheca medico-chirurgica et pharmaceutica oder *Verzeichniss der in den Jahren 1750 bis 1822 in Teutschland erschienenen medicinisch-chirurgisch-pharmaceut. und chemischen Büchern.* 3te Aufl. Berl. 1823. 8.

Kritisches Repertorium der auf in- und ausländischen höhern Lehranstalten vom Jahre 1781–1800 herausgekommenen Probe- und Einladungsschriften aus dem Gebiete der Arzneigelahrtheit und Naturkunde, 1ste Abtheilung, von S. J. A. DÖRING, Herborn 1803. 4. (bevat ook korte uittreksels en inhouds-opgaven).

Salzburger medicinisch-chirurgische Zeitung, Asclepiion, Altenburger Annalen der Heilkunde. HECKER'S literarische Annalen der gesammten Heilkunde. (sedert 1825). Allg. deutsche Bibliothek. Allg. Lit. Zeit., Jen. A. L. Z., N. Leipz. L. Z.; Wiener L. Z. Göttinger gelehrte Anzeigen, Heidelberger Jahrbucher, HUFELAND'S Bibliothek en meer andere tijdschriften.

J. D. REUSS, *Repertorium commentationum a societatibus litter. editarum secundum disciplinarum ordinem. Tom. XI et XII. Scientiam et artem med. continens. Gött. 1816. 4.*

F. A. EBERT, *allgemeines bibliographisches Lexicon. Leipz. 1820. 4. (bevat menige belangrijke aanwijzing.)*

Tijdrekenkundig overzicht van de geschiedenis der verloskunde.

§. 17.

Tot een gemakkelijker en gepaster overzicht van de tijdrekenkundige geschiedenis der verloskunde, heeft men vrij willekeurig (*) drie (†) hoofdtijdperken aangenomen.

- 1). Van de vroegste tijden tot op de verschijning van het eerste gedrukte boek over de verloskunde, 1513.

(*) NOLDE, *Beiträge etc.* 3tes Stück. f. 11.

(†) OSIANDER, *Lehrbuch der Entbindungskunst.* f. 39.

2) Van 1513 tot op de bekendmaking der verloskundige tang, 1723.

3) Van 1723 tot op de nieuwste tijden.

EERSTE TIJDVAK.

Van de vroegste tijden tot op de verschijning van het eerste gedrukte boek over de verloskunde, 1513.

VOOR CHRISTUS
geboorte. De oudste narigten, die wij van de verloskunde bezitten, zijn bevat in hetgene de bijbel meldt van het baren der *Israëlitische* en *Egyptische* vrouwen. Zeker is het, dat de eerste reeds vroedvrouwen hadden; hare kundigheden moeten echter zeer gering geweest zijn.

Iste Boek van Mozes, 35ste en 38ste kap. — IIde B. Iste kap. — Iste Boek van Samuel, 4de kap.

F. G. GUDIUS, resp. WENDT, *Diss. de ebraica obstetricum origine etc.* Lips. 1724. 4.

Jaar. 690. DANZ, *de arte obstetricia Aegyptiorum.* Giesfen, 1722.

690. Numa Pompilius geeft in de XXI Olympiade de wet *de inferendo mortuo.* (?)

436. Hippocrates levert het eerste narigt van door mannen toegebragte verloskundige hulp.

HIPPOCRATIS COI, *Opera omnia.* Ed. VAN DER LINDEN, Lugd. Bat. 1665.

430-348. Plato geeft in zijnen *Theaetetus* narigt van de Atheensche vroedvrouwen.

400. Lucina wordt te Rome aanbeden, en hare helpsters, de Godinnen *Prosa*, *Postverta* enz. bij de verlossing aangeroepen.

322-284. Aristoteles verspreidt door zijne geschiedenis der dieren eenig licht over de zwangerheid en verlossing.

ARISTOTELIS, *opera gr. et lat. ex ed. G. du Val.* Paris 1654. fol.

- Jaar.
307. *Herophilus* onderwijst *Agnodike* in de vroedkunde (?) en verrijkt de leer der zwangerheid door onderscheidene ontleedkundige ontdekkingen, b. v. die der trompetten.
- na
CHRISTUS ren, af te halen en in 's moeders ligchaam te ontleden.
geboorte.
3-5. *Celsus*, *de medicina*. Lugd. Bat. 1785. 4. — ed. Biponti 1786. 8. — ed. C. KRAUS, Lips. 1766. 8.
- 23-79. *C. Plinius* levert in zijne natuurlijke historie veel gewigtigs voor de leer der zwangerheid en verlossing; bij hem vindt men het eerste narigt van bij gestorvene zwangere vrouwen bewerkstelligde keizerlijke snede.
C. PLINII, historiae naturalis, libr. XXXVII. Bipont. 1783. 8.
97. *Soranus*, van Ephese, bezit vele ontleedkundige kennis van de vrouwelijke geslachtsdeelen, van welke kennis latere schrijvers, b. v. *Caelius Aurelianus*, *Oribasius* en *Aetius* een zeer goed gebruik gemaakt hebben.
117. *Moschion* schrijft een boek voor vroedvrouwen, in vragen en antwoorden.
Gynaecia s. de Mulierum affectibus et morbis etc. cura Isr. SPACH. Argentor 1597. fol.
- 132-200. *Galenus* van Pergamus onderwijst in Rome. Zijne schriften bevatten veel, dat middellijk of onmiddellijk tot de verloskunde betrekking heeft.
GALENI, opera omnia. Basil 1562. fol.
360. *Oribasius* verzamelt op verzoek van keizer *Julianus* de geneeskundige werken van vroegeren tijd bijeen.
ORIBASII, collectorum medicinalium. Libr. XVI. Par. 1655.
543. *Aetius*, van Amida, bezorgt te Konstantinopel de volledige verzameling der hem bekende geneeskundige schriften. Over de verloskunde en de ziekten der vrouwen heeft hij voornamelijk uittreksels geleverd uit de verloren geraakte schriften van *Philumenus* en van een zekere *Aspasia*.
AETII AMIDENI, libr. XVI. en versione JAN. CORNARI. Lugd. Bat. 1549.

- Jaar.
643. *Paulus*, van *Aegina*, bijgenaamd *Alcawabeli*, (een verloskundig arts), de laatste Grieksche schrijver over verloskundige onderwerpen, is slechts een uitschrijver.
PAUL AEGINETAE, *de re medica, libri VII.* Basil. 1552. fol.
640. De verwoesting van Alexandria, door *Amru*, veldheer van den kalif *Omar*; en vernieling der bibliotheek aldaar, aan welke slechts de door *Sergius*, *Masardschawaih* en eenige andere in de Arabische en Syrische talen overgezette werken ontkwamen.
853. *Paulin Johanna* geeft aanleiding tot de fella exploratoria. (?)
900. *Muhammed Ebn Secharjah Abu Bekr Arrasi*, gemeenlijk *Rhazes* genaamd, uit Ray, in Irak, in Bagdad, leert de grondstellingen van *Hippocrates* en anderen zijner voorgangers, heeft echter ook veel eigendommelijks.
RHAZIZ, *opera exquisitoria ed. Channing, denuo recudo curavit* J. C. RINGEBROIG, 1781. 8.
959. Graaf *Burcard*, van Linzgau, Buchhorn en Montfort, abt van St. Gallen, van zijne gestorvene moeder door de keizerlijke snede weggenomen. (?)
Almansur sticht de akademie van *Cordova*.
980. De reis van den bisschop *Adalberon* van Verdun naar Salerno, om zich aldaar te laten genezen, als het eerste narigt van het bestaan der geneeskundige school aldaar.
- 994.† *Avicenna Al-Hussain, Abu-Ali Ben Abdallah, Ebn Sina*, een Perziaan, dien men, wegens het aanzien dat hij zich onder de geneeskundigen verworven had, den Prins der Artsen noemde. Zijne geschriften, hoewel uit stukken van onderscheidene schrijvers tezamen gesteld en weinig eigendommelijks bevattende, bleven echter verscheidene eeuwen lang de vraagbaak der artsen.
AVICENNAE, *Arabum medicorum principis canon medicinae.* Venet. 1608. fol.

- Jaar.
1036.† *Ali Ebno l'Abbas*, gemeenlijk *Halv Abbas* de toovenaar, een der beste Arabische artzen. Uit zijn werk blijkt, dat de verloskunde door vrouwen werd uitgeoefend, en de artzen bij dezelve slechts raadgevers waren.
HALV FILII ABBAS, dispositionis regalis theoreticae libri X. a STEFANO, ex Arabico in latinam linguam reducti etc. Lugd. Bat. 1523. 4.
1001. *Gebhard*, Graaf van Brianzon, bisschop van Konstantz, wordt insgelijks door de keizerlijke snede uit zijne gestorvene moeder weggenomen. (?)
- 1087.† *Constantyn*, van Carthago, maakt zich tot roem der Salernitaansche school verdienstelijk, door zijne uittreksels uit Arabische geneeskundige schriften. — Hij schreef over de ziekten der vrouwen.
Ejusdem opera. Basil. 1536.
- 1122.† *Albucasis, Khalaf Ebn Abbas Abu'l Kasem*, levert in zijn voor de heilkunde belangrijk werk, eene beschrijving der verloskunde van zijnen tijd, alsmede afbeeldingen van verloskundige werktuigen.
ALBUCASIS, de chirurgia, arabice et latine edidit CHANNING. Oxon. 1778. 4.
1131. Op het concilie te Rheims wordt den monniken, die bijna uitsluitend in het bezit der genees- en heilkundige kennis waren, de uitoefening derzelve verboden.
1139. In het Lateraansche en meer andere conciliën werd tevens de *lex regia de inferendo mortuo* vernieuwd, om voor te komen, dat met eene gestorvene zwangere vrouw, niet te gelijk het misschien levensvatbaarheid bezittende kind, begraven werd en ongedoopt bleef.
1145. De geneeskundige school te *Salerno* verkrijgt van *Roger den tweeden* vele voorregten en wetten.
1150. Geneeskundige school te *Montpellier*.
1210. Paus *Innocentius III* bekrachtigt een vondelinghuis, dat door de hospitaalbroeders, tot opneming van onechte kinderen, gesticht was.

- Jaar.
1214. Keizer *Frederik II*, begunstiger der wetenschappen, maakt uitmuntende verordeningen voor de geneeskunde.
1215. De geneeskundige scholen te *Parijs*, *Montpellier* en *Bologna*, verdonkeren weldra geheel die van *Salerno*.
1271. Het collegie van heelmeeesters te *Parijs* wordt van de faculteit afgezonderd.
- 1282.† *Albert von Bolstädt* (*Albertus Magnus*) schrijft:
De secretis mulierum et virorum. Amst. 1643.
- Onder den naam van *Eros* of *Trotula* schrijft een onbekend arts uit de *Salernitaansche* school, een weinig nieuws bevattend boek:
TROTULAE curandarum aegritudinum muliebrium ante, in et post partum libellus. Lips. 1778. 8.
- 1315.† *Herstelling der ontleedkunde*; eerste openlijke ontleding van vrouwelijke ligchamen, door *Mondini da Luzzi* bewerkstelligd.
1348. Eerste Duitse universiteit te *Praag*.
- 1381-1477. Stichting der universiteiten te *Weenen*, *Heidelberg*, *Keulen*, *Erfurt*, *Krakau*, *Wurtsburg*, *Leipzig* en *Tubingen*.
1423. De Boekdrukkunst, door *Laurens Koster*, te *Haarlem* uitgevonden 1423, door *Johannes Guttenberg* te *Mentz* bekend gemaakt 1440.
1450. Uitvinding van het Lettergieten.
1453. Verovering van *Konstantinopel* door de *Turken* en de daarop volgende vlucht der *Grieksche* geleerden naar *Italië*.
1482. De universiteit te *Tubingen* verkrijgt een pauselijk privilegium medicorum: de corporum dismembratione. —
F. F. FRORIEP, über die anatomischen Anstalten von Errichtung der Universität bis auf gegenwärtige Zeit. Weimar 1811. p. 14.
1491. *Eerste narigt van eene*, met gelukkig gevolg aan eene levendige vrouw bewerkstelligde keizerlijke snede.
NICOLAI DE FALCONIIS, observationes chirurgicae. Venet. 1491. fol.

Aanmerking. Dat de ouderdom der keizerlijke snede bij de Joden van het begin der twaalfde eeuw, zoo niet reeds vroeger dagteekent, is het, hoewel wederlegde gevoelen van Dr. MANSFELD. Ueber das Alter des

- Gebärmutter schnittes an Lebenden. Braunschweig 1824.*
 Jaar. 1492. Uitvinding der graveerkunde.
 1500. *Jacob Nufer*, een varkensnijder te Siegershausen, in Thurgau, in Zwitserland, verrigt met een gelukkig gevolg de keizerlijke snede aan zijne eigene huisvrouw.
 1502- Stichting der universiteiten te Wittenberg en Frankfort
 1505. aan den Oder.

TWEEDE TIJDVAK.

van 1513—1723.

1513. *Eucharius Röslin*, gemeenlijk *Rhodion* genaamd, arts te Worms en te Frankfort aan den Main, geeft het *eerste leerboek voor vroedvrouwen in het licht*, hetwelk, ofschoon geheel en al uit vroegere schrijvers ontleend, evenwel een zeer goed onthaal te beurte viel.
Der swangern Frauen und Hebammen Rosengarten.
 Kölln in 4. met houtsnede platen.
 1521. Dr. *Veit*, in Hamburg, wordt wegens gewaande hekserij in de verloskunde, verbrand.
 1527. Geringere goedkeuring als het boek van *Röslin* verwierf dat van *Jason à Pratis*.
De pariente et partu, obstetricibus, puerperis, nutricibusque utilissimus liber. Amstelod. 1657. 12.
 Aangemoedigd door het gunstig onthaal, dat aan het werk van *Röslin* was te beurt gevallen, schreef *Walther Hermann Ryff* ook een
Frauen Rosengarten etc., neu am Tag gegeben durch Gualtherum REIFF. Frankf. a. M. 1615.
 1545. *Jacob Ruef*, operateur van den steen en arts te Zurich, heeft in zijn werk eene tang afgebeeld, die men (ten onregte) voor de eerste verloskundige tang heeft gehouden.

De conceptu et generatione hominis. Tigur 1554. 4.

Ein schön lustig Trostbuchlein von dem Empfängnissen und Geburten der Menschen und ihren vielfältigen Zufällen etc. erst neulich zusammengelesen durch JACOB RUEF, Zurich 1553. 4. Naderhand onder den titel: Hebammenbuch, daraus man alle Heimlichkeiten des Weiblichen Geschlechts etc. Frankf. a. M. 1600. 4.

Jaar.
1543-1559. *Vesalius en Realdus Columbus* bewijzen door hunne beoefening der ontleedkunde, aan de verloskunde wezenlijke diensten.

ANDR. VESALII, *de humani corporis fabrica, libri VII.* Bas. 1543. fol.

R. COLUMBI, *de re anatomica, libri XV.* Venet. 1529.

1550. *Matthias Cornax*, Profesfor, en *P. Dirlewang*, heelmeester te Weenen, verrigten aan eene levendige vrouw de buiksnode.

Foetus vivi ex matre sine alterius vitae periculo caesura, a FR. ROUSSETO; *med. gall. conscripta*, CASP. BAUHINO, *Prof. med. Basil. lat. reddita.* Basil 1591. 8.

1563.† *Gabriël Fallopi*a, een uitmuntend ontleedkundige. *Ej. Observat. anatomic.* Francof. 1600.

Conrad Gesner, een Zwitfersch geneesheer, begint éene verzameling van verloskundige onderwerpen, uit oude Grieksche en Romeinsche schrijvers; laat echter het voltooijen derzelve aan zijnen leerling *Caspar Wolf* over.

Gynaeciorum seu de mulierum etc. affectibus. Basil 1566. 4.

1548-1580. Stichting der universiteiten te Straatsburg, Jena, Leiden, Helmstad en Edinburg.

1573. *Ambrosius Paré*, lijfarts van vier koningen van Frankrijk (geb. 1510. gest. 1590.), maakt grooten naam, door een werk, waarin hij veel belangrijks voordraagt; en onder anderen den gelukkigen afloop der keizerlijke snede aan levendige vrouwen geheel en al loochent.

AMBR. PARÉ, *de la generation de l'homme et maniere*

d'extraire les enfans du ventre de leur mère. à Paris 1573. 8.

Les oeuvres d'AMBROISE PARÉ. à Lyon 1652. *De chirurgie en alle de opera.* Amst. 1649.

Jaar.
1581.

Frans Rousset wederlegt *Paré*; hij verzamelt alle de gevallen van gelukkig afgeloopene keizerlijke sneden, en maakt dezelve in het volgende, door *Bauhinus* in het Latijn overgezette werk, bekend:

Traité nouveau de l'hysterotomie ou enfantement césarien etc. par FRANÇOIS ROUSSET. *Med. à Paris.* (vide CORNAX).

1586-
1588.

Casp. Bauhinus bezorgt eene nieuwe vermeerderde uitgave van de, door *Gesner* en *Wolf* in het licht gegevene, verzameling van verloskundige schriften, welke echter insgelijks zoo zeer gezocht werd, dat *Israel Spach*, prof. te Straatsburg, op nieuw eene vermeerderde uitgave derzelve bezorgde.

Gynaecia etc. (vide MOSCHION).

1587.

Gervais de la Touche, een Fransch edelman, tracht den hoogere standen, de verloskundige hulp door mannen aan te bevelen, en de onkunde der toenmalige vroedvrouwen te doen kennen.

La très-haute et très-souveraine science de l'art et industrie naturelle d'enfanter, contre la maudite et perverse imperitie des femmes, que l'on nomme sage-femmes etc. etc. à Paris 1587. 8.

1589.

Jul. Caesar Arantius, prof. in de ontleedkunde te Bologna, levert belangrijke bijdragen tot de leer der zwangerheid.

De humano foetu liber. Venet. 1587. 4.

1593.

Severin Pineau, heelmeeester te Parijs (†1619), beweert het van één wijken der beenderen van het bekken, vooral der schaambeenderen, bij de verlossing.

SEVER. PINAEUS, *de virginitatis notis, graviditate et partu.* Lugd. Bat. 1639.

Opusculum physiologicum, anatomicum, Φυσικας vere admirandum, libris duobus distinctum etc. Par. 1598. 8.

Jacob Guillemeau, heelmeeſter te Parijs († 1609), vertaalt de werken van *Paré* in het Latijn, en beſchrijft in een weinig eigendommelijks bevattend werk, een dubbelde haak tot ontleding van een waterzuchtig kind.

JACQ. GUILLEMEAU, *de la grosseſſe et de l'accouchement des femmes, du gouvernement d'icelles etc.* Paris 1543. c. f.

Les oeuvres de chirurgie de J. GUILLEMEAU. à Paris 1598.

Jaar. 1600. *Fabricius ab Aquapendente*, prof. in de ontleed- en heelkunde te Padua, (geb. 1537, geſt. 1619), levert eene zeer goede beſchrijving en afbeelding van de menſchelijke vrucht en van de deelen van het ei.

HIER. FABRICII AB AQUAPENDENTE, *opera omnia anatomica et physiologica, cum praefat.* B. S. ALBINI. Lugd. Bat. 1738. fol.

Minder gewigtig, doch ook belangrijk voor de verloskunde, is het geſchrift van eenen arts uit Hamburg, *Roderic a Castro*, een Portugees.

RODERICI A CASTRO, *etc. de universa mulierum medicina novo et antehac a nemine tentato ordine opus absolutissimum.* Hamb. 1603—1604.

1606. Eene niet onbelangrijke bijdrage ter opheldering van ſommige onderwerpen der verloskunde levert *Fabricius Hildanus* (geb. 1560, geſt. 1634); onder anderen levert hij het bewijs, dat een kind nog eenigen tijd in het ligchaam der geſtorvene moeder kan voortleven.

F. H., *Opera observationum et curationum medico-chirurgicarum, quae exstant omnia.* Francof. 1646. fol.

1607. *Scipio Mercurius*, Dominikaner monnik en arts, openbaart in zijn geſchrift zeer zonderlinge denkbeelden.

La commare o raccogliatrice dell' Ecc. Sign. Scipione MERCURIO. Divis. in tre libri Edit. corr. in Verona,

1662. 4. — De vertaling van dit werk, door GODFRIED WELSCH, prof. te Leipzig, in 1681 bezorgd, levert de eerste afbeelding eener geboortestoel, met beweegbare leuning.
- Jaar.
1609-
1664. Het leerboek voor vroedvrouwen van *Louize Bourgeois*, genaamd *Bourcier*, vroedvrouw der gemalin van *Hendrik den vierden*. Verder de handboeken van *St. Germain*, *Huxholz*, *Sommer* etc.
- Observations diverses sur la sterilité, perte de fruits, fécondité, accouchemens et maladies de femmes et enfans nouveaux nés.* à Paris 1644.
- Dezelfde. *Instructions à ma fille.* Paris 1616.
- OSIANDER'S *Hebammenbuch* etc. S. 747. volg.
1645. *Nicolaus Stenson*. *Steno*, een Deen, ontdekt de ver- rigting en werking der eijerstokken, welke men tot dusverre voor vrouwelijke ballen had gehouden.
- NICOL. STENONIS, *elementorum myologiae specimen.* — Tilor. 1667.
1651. *William Harvey*, lijfarts van *Karel I*, koning van Engeland, ontdekt den omloop des bloeds, en verrijkt de leer der zwangerheid en geboorte met belangrijke ontdek- kingen.
- Exercitationes de generatione animalium, quibus accedunt quaedam de partu etc.* Auct. GUIL. HARVEO. Lond. 1651.
1656. *Thomas Warton* maakt vele waarnemingen over de bezwangerde baarmoeder.
- Adenographia.* Lond. 1656. 8.
- 1660-
1670. *Hugo Chamberlaine*, heelmeeester te Londen, bezit een geheim, om de moeilijkste geboorten met voorliggend hoofd, voor moeder en kind gelukkig te doen afloopen, welk geheim men in de verloskundige tang meende te be- staan, en hetgeen hij in 1693 aan *Rogier Roonhuysen*, *Corn. Boekelmann* en *Fred. Ruysch* te Amsterdam verkocht.

- Jaar. 1662. *Car. Drelingcourt*, prof. te Leiden, schrijft in zijne verzameling van geschriften op onderscheidene plaatsen over de zwangerheid en geboorte.
CAR. DRELINCOURTII etc., opuscula medica, quae reperiri potuerunt omnia. Hag. Comit. 1727. 4.
- 1663-1729. De heelmeeester *Clement*, van Parijs, wordt vroedmeester der Dauphine en tot den adelsstand verheven, verkrijgt den titel van *Accoucheur*, vernietigt daardoor de vooroordeelen der genees- en heelkundigen, die door zijn geluk aangemoedigd worden, zich met de uitoefening der verloskunde onledig te houden.
1664. *Thomas Bartholinus* verbreidt veel licht over de leer der zwangerheid en geboorte.
TH. BARTHONINI, de insolitis partus humani viis diss. nova. Hafn. 1664. 8.
1665. Begin der *Philosophical Transactions*.
1668. Naauwkeuriger als door *Steno*, worden de eijerstokken beschreven door *Reinier de Graaf*, een Nederlander.
 † 1673.
R. DE GRAAF, de virorum et mulierum organis generationi inservientibus. L. B. 1668. 8. c. f.
- Het *Journal des Savans* en de
1670. *Miscellan. et Ephemerid. medico-physic. naturae curiosorum*, worden uitgegeven.
- 1670-80. *Collegium Obstetricium* te Amsterdam.
1672. *Joh. van Hoorn*, prof. te Leiden, schrijft:
Prodromus observationum suarum circa partes genitales in utroque sexu. L. B. 1672.
Joh. Swammerdam, ontleedkundige te Amst., schrijft:
Miraculum naturae sive de uteri mulieris fabrica. Lugd. Bat. 1672—1729.
1673. *Cornelis van Solingen* schrijft over onderwerpen der praktische verloskunde.
Alle de medicinale en chirurgische werken, mitsgaders Embryulcia vera etc. Amst. 1694. 4. met pl.

Jaar.

1674. *Cosme Viardel*, vroedmeester te Parijs, schrijft:
*Observations sur la pratique des accouchemens naturels ,
contre nature , monstrueux etc. par Mr. COSME VIARDEL.*
Par. 1671. — In het Hoogduitsch: VIARDEL's *An-
merkungen von der Weiblichen Geburt etc.* Franckf.
1676. 8.
1675. *François Mauriceau*, heelmeeester te Parijs († 1707),
verwerft door zijne geschiktheid, bekwaamheid en door
zijne geschriften een groot aanzien, hij maakt voorna-
melijk op het gewigtige van het onderzoek (*toucheren*)
opmerkzaam, beveelt de keering sterk aan, geeft echter
tevens aan het gebruik van scherpe instrumenten de voor-
keur boven de keizerlijke snede.
*Traité des maladies des femmes grosses et de celles ,
qui sont nouvellement accouchées etc. composé par
FR. MAURICEAU*, Paris 1668. 4. met pl. In het Hoogd.
Straatsb. 1732. 4. — *Over de ziekten der zwangere
vrouwen*, met eene voorrede van P. CAMPER, met pl.
Amst. 1759. 4.
- Dezelfde. *Observations sur la grossesse et l'accouchement
des femmes , sur leurs maladies et celles des enfans
nouveau nés.* Paris 1706.
- Dezelfde. *Dernieres observations sur les maladies des fem-
mes grosses et accouchées.* Paris 1721. In het Hoogd.
door MARTIN SCHURIG, Dresden 1709.
- Dezelfde. *Aphorismes touchant la grossesse , l'accouche-
ment , les maladies , et autres dispositions des femmes.*
Paris 1694. — In het Hoogd. *Frauenzimmers Wohl-
wesen.* Franck. 1716. 8.
1680. *P. Dionis*, heelmeeester der koningin en der dauphine
van Frankrijk, schrijft een niet onbelangrijk
Traité general des accouchemens. Paris 1724. DIONIS,
algemeene verhandeling van de kraamkunde. Leiden
1735. 8.

Sam. Jansonius schrijft een handboek der verloskunde, waarin hij zich onder anderen tegen het bewerkstelligen der keizerlijke snede bij gestorvene vrouwen verklaart.

Korte en bondige verhandeling van de voortteeling en het kinderbaren enz., door J. S. P. Rotterd. 1681. In het Hoogd. *Kurze jedoch ausführliche Abhandlung von Erzeugung der Menschen und dem Kinder-Gebähren*, durch S. J. übersetzt. Francf. a. M. 1706. 8.

Jaar.
1682. D. van der Sterre beveelt daarentegen de keizerlijke snede zeer aan.

Voorstelling der noodzakelijkheid der keizerlijke snede van de baaring. Leid. 1682. 12.

1682. *Acta Eruditorum*.

1685. Paul. Portal, vroedmeester bij het hospitaal *Hotel de Dieu* te Parijs, dringt er sterk op aan, om de natuur niet te overhaasten.

La pratique des accouchemens, par P. PORTAL. Par. 1685. Het oppercollegium medicum te Berlijn.

De leerboeken voor vroedvrouwen, van de la Marche, Chamberlaine, Sermon, Thompson en Dampier, der vrouwen van Horenburg, Iber, Keil en vooral van Siegmund en Völters.

Instruction familière et très facile etc. par M. DU TERTRE, veuve du Sieur de la MARCHE. Paris 1677.

OSIANDER'S *Hebammenbuch*. S. 747. fg.

1691. *Mémoires de l'academie des sciences*.

1694. Cyprianus, prof. te Franeker, verrigt met een gelukkig gevolg de buiksnede.

Ejusd. Epistola historiam exhibens foetus humani post XXI. mens. ex uteri tuba matre salva et superstite excisi. L. B. 1700. 8.

1695. Philippus Peu geeft, na een veertigjarigen praktijk, een goed verloskundig werk uit.

La pratique des accouchemens, par M. PEU, *Maitre Chirurgien etc.* Paris 1695.

Joh. van Hoorn, vroedmeester en lijfarts te Stockholm, schrijft :

Die zwei um ihrer Gottesfurcht und Treue wohlbelohnten Wehmütter Siphra und Pua. Stockholm en Leipzig 1726. Ook in het Nederduitsch: *Siphra en Pua enz.* Leid. 1736. 8.

Jaar.
1701.

Hendrik van Deventer, (geb. 1651. † 1725,) een zeer bekwaam en geleerd vroedkundige, schrijft :

II. a. D. *Operationes chirurgicae novum lumen exhibentes obstetricantibus, quo fideliter manifestatur ars obstetricandi, et quidquid ad eam requiritur etc.* Lugd. Bat. 1701. 4. (in het Hoogd. overgezet: H. v. D. *neues Hebammenlicht.* Jena 1804.) en H. v. D. *Operationum chirurgicarum novum lumen exhibentium obstetricantibus pars secunda etc.* L. B. 1724. Beide deelen bij elkander als *editio secunda.* L. B. 1733. — H. v. D. *nieuw licht der vroedmeesters en vroedvrouwen*, met platen. 1765. 4.

1708-
1718.

Twist tusfchen *Hecquet* en *de la Motte*, over de voor- en nadeelen van de uitoefening der verloskunde door mannen. PHIL. HECQUET, *de l'indécence aux hommes d'accoucher les femmes etc.* Paris 1708.

DE LA MOTTE, *Reponse au livre de l'indécence etc.* Paris 1718. 12.

1710.

Guillaume Mauquest, gewoonlijk *de la Motte* genaamd, heelmeester te Valogna, tracht de keering te verbeteren, schrijft :

DE LA MOTTE, *de la generation.* Paris 1718.

DEZELFDE. *Traité complet des accouchemens naturels, non naturels et contre nature.* Paris 1765.

1713.

Pierre Amand, heel- en vroedmeester te Parijs, levert eene verzameling van merkwaardige waarnemingen.

Nouvelles observations sur la pratique de accouchemens, par P. AMAND, Maître Chirurg. Paris 1715. 8. m. pl.

1719.

Collegium Obstetricium te Leiden.

- Jaar.
1720. *Frederik Ruysch* beweert in den bodem der baarmoeder eene cirkelvormige spier, tot uitdrijving der nageboorte ontdekt te hebben.
Deszelfs *ontleedkundige verhandelingen over de vinding van een spier in den grond des baarmoeders, enz.* Amst. 1725.
Vervolg van de ontleedkundige verhandelingen, enz. 1726.
ABRAHAM VATER, *Brief aan den heer F. RUYSCH, aangaande de kringwijze spier in den bodem van de baarmoeder ontdekt.*
Antwoord op vorenstaanden brief. — Alle te vinden in F. RUYSCH, *alle de ontleed- en heelkundige werken.* Amst. 1744. 4. D. III. bl. 1091—1138.

§. 19.

DERDE TIJDVAK.

Van de bekendmaking der verloskundige tang in 1723, tot op de nieuwste tijden.

1723. *Johannes Palfyn*, heelmeeester en ontleedkundige te Gent, († 1730), tracht het geheim van Chamberlaine te ontdekken, en biedt de akademie der wetenschappen te Parijs zijne, uit twee stalen lepels bestaande, *tire tête* aan, die als verloskundige tang, kort daarna door *Gilles de la Doux, Heister, Dusee*, enz. op velerleie wijze veranderd werd; daarenboven schrijft hij:
Description anatomique des parties de la femme, qui servent à la génération etc. Leid. 1708. 4. avec fig.
1725. *John Mawbray* maakt de grondstellingen van *van Deventer* in Engeland bekend.
J. MAWBRAY, *Midwifery brought to perfection by manual operation.* Lond. 1725. 8.
1728. Oprigting van het *kraamvrouwengesticht te Straatsburg.*
I. D. C

Edw. Hody maakt de waarnemingen van *Giffards* en *Preke*, alsmede eene kruiselingfche, met vensters voorziene tang bekend.

Cazes in midwifery written by the late W. GIFFARDS etc. published by EDW. HODY. Lond. 1734. 8.

Jaar.
1733.

Edmund Chapman ijvert sterk tegen het gebruik van fcherpe werktuigen.

A Treatise on the improvement of midwifery chiefly with regard to the operation etc. by E. C. Lond. 1739. 8.

Ook in het Hoogd. *Abhandl. zur Verbesserung der Hebammenkunst. Copenhagen 1748.*

Jacob Denys, een vele ervaring bezittend vroedmeester, fchrijft:

Verhandeling over het ambt der vroedmeesters, vroedvrouwen, enz. Leid. 1734. 8.

1734.

Zeer bijzondere denkbeelden, volgens welke hij het gebruik van allerlei werktuigen verwerpt, draagt *Johannes Huwé* voor.

Onderwijs der vrouwen aangaande het kinderbaren enz. Haarl. 1737. 8.

Martin Schurig, een geleerd arts, maakt zich ook voor de verloskunde verdienstelijk.

Ej. Embryologia historico-medica, h. e. infantis humani consideratio physico-medico-forensis etc. Dresd. 1732.

Ej. Muliebria etc. Ibid. 1728. 4.

— *Parthenologia etc. Ibid. 1729. 4.*

— *Gynaecologia etc. Ibid. 1730.*

— *Syllepsilogia etc. Ibid. 1731. 4.*

1736.

Joh. Douglas fchildert den toestand der toenmalige verloskunde.

A short account on the success of midwifery in London and Westminster. Lond. 1736.

1739.

Richard Mauningham flicht te London een privaat kraamvrouwengeficht, en fchrijft:

Ej. artis obstetriciae compendium tam theoriam quam

praxin complectens. Lond. 1739. 4. *Duabus disquisitionibus auctum, tabulisque ornatum, auctore PH. AD.*

BOEHMER, *Med. et Anat. Prof.* Halae 1746.

Jaar. 1740. Philip Adolph Boehmer maakt de tang van Gregoire bekend, en schrijft tevens merkwaardige gevallen bevattende:

Observationum anatomicarum rariorum fasciculus I et II.

Halae Magd. 1752. 56. fol.

Ej. Disquisitio altera, de usu et praestantia forcipis Anglicanae in partu difficili, ex situ nascendi capitis, intra ossa pubis immobiliter haerentis. Halae 1746. 4.

De „kinderen- en vrouwenflagter.” J. Andr. Deisch, te Augsburg schrijft:

Kurze und in der Erfahrung gegründete Abhandlung, dass weder Wendung, noch Englische Zange in allen Geburtsfällen vor Mutter und Kind sicher gebraucht, noch dadurch Instrumente vermeidet werden können. Augsb. 1766.

Diss. de usu cultrorum atque uncinorum exinio. Suobaci, 1759. 4.

Vernünftige Bedenken über mancherlei aus Unwissenheit etc. durch Missbrauch stumpfer und scharfer Instrumente verunglückter Geburten, von G. F. GUTERMANN. Franckf. u. Leipz. 1761. 2 theile.

1741. Willem Noordwijk, geneesheer te Leiden, onderzoekt het lijk eener, in de vijfde maand zwangere vrouw, en maakt zijne gedane ontdekkingen bekend.

Uteri humani gravidati anatome et historia. L. B. 1743.

1742. Fielding Ould, in Ierland, geeft, in zijn niet onbelangrijk werk, het allereerst een klaar denkbeeld van den doortogt van het hoofd door het bekken.

R. O. *A treatise of midwifery.* Dublin 1742. 8.

1743. Jacques Mesnard, vroedmeester te Rouaan, heeft eene eigene theorie der bevruchting, (namelijk door opslorping) en vindt onderscheidene instrumenten uit.

Le guide des accoucheurs ou le maitre dans l'art d'accoucher les femmes etc. Le tout en forme d'examen par J. MESNARD etc. Paris 1734.

Jaar.

1743-

1781.

Andreas Levret, te Parijs, vroedmeester der dauphine en der koningin van Frankrijk, tracht de verloskunde geheel naar wiskundige grondbeginselen en regelen te verklaren, verwaarloost daardoor het letten op den gang der natuur, vindt onderscheidene instrumenten uit, laat eene menigte van leerlingen na, en schrijft de volgende werken:

Observations sur les causes et les accidens de plusieurs accouchemens laborieux etc. Paris 1748. 8. m. pl.

Suite des observations sur les causes etc. par Mr. LEVRET etc. Paris 1751. 8. m. pl. Hoogd. Mr. LEVRET's *Wahrnehmungen von den Ursachen etc. von Dr. WALLBAUM. Lubeck en Altona 1758.*

Ej. Explication de plusieurs figures sur le mechanisme de la grossesse et de l'accouchement etc. Paris 1753.

Ej. L'art des accouchemens, démontré par des principes de physique etc. Paris 1766. Hoogd. door Dr. HELD, Hrn. LEVRET's etc. Kunst der Geburtshülfe nach den Gesetzen der Bewegung und Naturlehre. Gera 1772.

Ej. L'essai sur l'abus des règles générales et contre les préjugés, qui s'opposent aux progrès de l'art des accouchemens. Paris 1766. Hoogd. Herrn LEVRET's Versuch über den Missbrauch der allgemeinen Grundsätze etc. von Dr. BURDACH. Leipz. 1776. 8.

Joh. Jac. Fried, eerste leeraar en verloskundige bij het verloskundig instituut (†1769.) te Straatsburg, laat bekwame leerlingen en eenige uitvindingen voor de verloskunde na.

1745. Stichting van het hospitaal voor kraamvrouwen te Dublin.

N. Jenty, geneesheer te Londen, geeft afbeeldingen der zwangere baarmoeder in het licht, die in zijnen tijd zeer geacht werden.

Explicatio demonstrationis uteri praegnantis. Lond. 1757.

In het Hoogd. door SCHMIEDEL, Nürnberg. 1761.

Joh. Jac. Müller, geb. te Wattwyl, in het graaffschap Toggenburg, in Zwitserland, een leerling van *Friedl*, maakt ter verklaring zijner denkbeelden van de helling van het bekken, het eerst gebruik van de bekkenas.

Diss. sistens casum rarissimum uteri in partu rupti.

Basiliae 1745. 4. — NAEGELE, *das weibliche Becken etc.* S. 51.

Jaar.
1746.

Afkondiging eener wet in Holland, waarbij bepaald wordt, dat een ieder die de vroedkunde wil uitoefenen, vooraf bij het apothekers-gild een examen afleggen en het Roonhuysiaansch geheim koopen moet.

1747.

Joh. Dan. Schlichtingh, geneesheer en vroedmeester te Amsterdam, maakt, naar hij beweert, het geheim van *Chamberlaine* en *Roonhuysen* bekend, geraakt echter over hetzelfde met het apothekers-gild in twist, en schrijft:

Embryulcia nova detecta, of eene heel nieuwe en onbekende, dog nuttige behandeling, in de meeste moeilijke baaringen op het spoedigste te helpen, eertijds gelukkig geoeffend door ROONHUYSEN in Amsterdam. — Appendix embryulciae detect. etc. door J. D. SCHLICHTINGH. Amst. 1747.

J. P. Rathlauw bevestigt de waarheid van het door *Schlichtingh* bekend gemaakte en schrijft:

Het berugt geheim in de vroedkunde van ROGIER ROONHUYSEN ontdekt en uitgegeven op hooge order, door JAN PIETER RATHLAUW, vroedmeester. Amst. 1747. 8.

De Amsterdamsche vroedmeesters *A. Boekelman*, *G. Plaatman*, *A. Titsingh*, *R. Boom* en *J. van Diden*, bewaarders van het geheim van *Roonhuysen*, trachten *Rathlauw* te wederleggen, edoch met weinig gevolg.

Zie klare bewijzen dat het geheim in de vroedkunde van ROGIER ROONHUYSEN ontdekt en uitgegeven door J. P. RATHLAUW, vroedmeester, volstrekt vals, en het

instrument, daarin afgebeeld, in ordinaire gevallen absolut onnut, en in de moeilijkste baringen ten uitersten gevaarlijk voor de moeder en doodelijk voor 't kind is. Amst. 1747. 8.

Replieq, dat is ontwijfelbaare egtheid en veiligheid van het berugt geheim van R. ROONHUYSEN, op hooge order door J. P. RATHLAUW enz. tegen het lasterschrift van de vijf heeren vroedmeesters, geëntituleerd; klare bewijzen enz. Amst. 1747. 8.

Men begint in Duitschland meer en meer de noodzakelijkheid van een welingerigt onderwijs voor vroedvrouwen in te zien.

Dr. J. STORCHENS, (*alias Pelargi*) *Unterricht vor Hebammen*. Gotha, 1747. 8.

J. C. THEMEL'S *Hebammenkunst*, onder gründliche Unterweisung wie eine Hebamme in ihren verrichtungen vernünfftig verfahren soll. Leipz 1747. 8

Jaar.
1748.

Benj. Pugh, heelmeeſter te Chelmsford, een der beste verloskundigen van Engeland, ſchrijft:

A treatise of midwifery chiefly with regard to the operation etc. Lond. 1754.

1749.

Bernard Siegfried Albinus, prof. te Leiden, († 1770), vereeuwigt zijnen, buiten dat onvergetelijken naam, door zijne voortreffelijke werken:

B. S. A. *Tabulae uteri mulieris gravidae*. L. B. 1749. fol.

EJUSD *Icones ossium foetus humani etc.* L. B. 1737. 4.

Stichting van eenige hospitalen voor kraamvrouwen te London.

1750.

Abraham Titsing, vroedmeester te Antwerpen, ſchrijft tegen verschillende, in de verloskunde plaats hebbende, verkeerde praktijken:

Diana ontdekkende het geheim der dwaasen enz. Amst. 1750. 4.

Corn. Plevier, geneesheer en een zeer goed vroedmeester te Amsterdam, ſchrijft:

De gezuiverde vroedkunst enz. door CORNELIUS PLEVIER enz., en met een nader voorberigt door J. D. SCHLICHTINGH. Amst. 1751. 4. met pl.

Nicol. Puzos, vroedmeester te Parijs, (geb. 1686. gest. 1763.) doet zich als een goed waarnemer kennen in zijne: *Traité des accouchemens contenant observations sur la pratique de cet art. Corrigé et publié par Mr. MORISOT DESLANDES etc.* Paris, 1759. 4.

J. H. Janke, prof. te Leipzig, beschrijft de tang van Bing, en bevordert daardoor de meer algemeene verspreiding der tang.

J. H. J. *De forcipe et forfice, ferramentis a BINGIO, chirurgo Hafniensi inventis.* Lips 1750. 4.

Fried. Mohr beschrijft het Fantome en prijst deszelfs gebruik aan.

Ej. *die gebährende Frau, sammt ihres Leibesfrucht in Lebensgrösse, sowohl durch Kunst abgebildet, als auch von einem todten Gerippe genommen etc.* Franckf. en Leipzig 1750. 8.

G. H. LANGSDORF, *Diss. sistens historiam phantasmatum etc.* Gött. 1797. 8.

Joh. Dav. Mittelhäuser, physicus te Weissenfels, toont door zijne gruwzame kunstbewerkingen den jammerlijken toestand, waarin zich de verloskunde nog in het midden der achttiende eeuw op onderscheidene plaatsen van Duitschland bevond.

Ej. *practische Abhandlung vom Accouchieren.* Leipzig 1754. 8.

Jaar.
1750.

Ant. Petit, verloskundige te Parijs (geb. 1723 † 1794); zijne thans grootendeels onbruikbare en verouderde leerstellingen zijn lang na hem uitgegeven.

Traité des maladies des femmes enceintes, des femmes en couche et des enfans nouveau nés etc. publié par les G. C. BAIGNEUX et PERRAULT. Paris, an VII. II vol.
Theoretisch-practische Abhandlung über die Geburts-

hülfe , mit Anmerkungen und Vorrede von Hofrath STARK. Erfurt 1801. 2 Bände.

Jaar.
1751.

Will. Smellie, te Londen, († 1763) een der uitmuntendste verloskundigen en waarnemers, die ooit bestaan hebben, maakt zich door zijne geschriften onvergetelijk.

A treatise on the theory and practice of midwifery, by W. SMELLIE, Lond. 1752. nieuwste uitgave 1779. 8. In het Hoogd. door Dr. ZEHER, Hr. W. SM. *theoretische und praktische Abhandlung von der Hebammenkunst*. Altenb. 1755. — *Verhandeling over het bespiegelen en bewerkend deel der Vroedkunde*, vertaald door M. VAN DER HAAGE. Amst. 1765. gr. 4.

A collection of cases and observations of midwifery by W. SM. Lond. 1754 en 1779. 2 vol. — *Eine sammlung besonderer Fälle und Anmerkungen etc. aus dem Englischen von Dr. KONIGSDÖRFER*. Altenburg 1760. *Verzameling van tegennatuurlijke gevallen en waarnemingen in de Vroedkunde*, door W. SM. vert. door M. V. D. HAAGE, Amst. 1766. 4.

A set of anatomical tables with explanations etc. Lond. 1754. en ed. altera 1787. GUILL. SMELLIE, *tabulae anatomicae*. Aus dem Englischen von Dr. HUTH, mit 39 Taf. fol. maj. Nürnberg 1758. 4. — *Verzameling van ontleedkundige afbeeldingen, met derzelver uitleggingen, benevens een kort begrip der Vroedkunde*, door W. SM. in 't Hollandsch gebragt door M. V. D. HAAGE, Amst. 1765. 4.

Het verloskundig instituut in de Charité te Berlijn, wordt onder *J. F. Meckel* gesticht.

Stichting van het verloskundig instituut te Gottingen.

Het kraamvrouwengesticht te Weenen, in het St. Marcus hospitaal, wordt voor het onderwijs ingerigt.

Joh. Georg. Röderer, prof. en bestuurder van het verloskundig instituut te Gottingen, (geb. 1728. gest. 1763.)

een zeer werkzaam man en voortreffelijk verloskundige ,
schrijft :

RÖDERER, *Elementa artis obstetriciae , in usum praelectionum academicarum.* Goetingae 1753. *Denuo edidit*
HENR. AUG. WRISBERG, Goett. 1766. — In het Hoogd.
door Dr. HENKEL, met eene voorrede en met aanteeke-
ningen van Dr. STARK, Jena 1793. 8.

Ejusd. Icones uteri humani observationibus illustratae.
Goett. 1759. fol. m. pl.

*Opuscula medica sparsim prius edita , nunc demum col-
lecta , aucta et recusa edidit* JOH. G. RÖDERER, Goett.
1763. m. pl.

G. Fr. Henkel, prof. in de heilkunde, bestuurder van
het verloskundig instituut te Berlijn, levert onderscheidene
echter niet zeer belangrijke geschriften.

HENKEL's *Anmerkungen von widernatürlichen Geburten
zur Verbesserung der Hebammenkunst.* Berlin 1751. 4.

Ejusd. Abhandlung von den Geburtshülfe. Berl. 1751
en 1774. 8.

*Ejusd. Abhandlung von den Fussgeburten , worinnen eine
Hebamme grosse Geschicklichkeit besitzen muss.* Berl.
1776. 8.

Jaar.
1752. John Burton, verloskundige te York, een tegenstander
van Smellie, welke de in Engeland gebruikelijke ligging
der barende vrouwen op de zijde ingevoerd heeft, schrijft:
*An essay towards a complete new system of midwifery
theoretical. and practical. etc. by* J. BURTON, M. D.
Lond. 1757. m. 18 pl. 8.

A letter to W. SMELLIE, *containing critical and practical
remarks upon his treatise on the theory etc.* Lond.
1753. 8.

Brudenell Exton, M. D. verloskundige aan het Middlesex
hospitaal, schrijft een niet zeer aanbevelerswaardig werk:
A new and general system of midwifery. Lond. 1755.

Georg Councell, heel- en vroedmeester te Londen, schrijft een belangrijk handboek voor vroedvrouwen.

The art midwifery etc. by G. C. Lond. 1752. m. pl.

Paulus de Wind, vroedmeester in Zeeland, maakt omtrent sommige instrumenten belangrijke narigten bekend.

Het geklemd hoofd gered, door P. DE WIND, Middelb.

Jaar. 1752. 8.

1754. *Jacob de Visscher en Hugo van de Poll*, koopen van de erven, het geheim van het door *Roonhuysen* verborgen gehonden instrument, en maken als zoodanig den *hufboom* bekend.

Het Roonhuysiaansch geheim in de vroedkunde ontdekt enz. Tweeledige verhandeling enz. door J. DE VISSCHER en H. VAN DE POLL, Leyd. 1734. 8.

Zie ook: *Brief aan den Heere ****, bevattende eenige aanmerkingen en wederlegging op en van het werk uitgegeven door de Heeren J. DE VISSCHER en H. VAN DE POLL geïntituleerd: *Tweeledige verhandeling enz.* door J. F. RATHLAUW, Amst. 1754. 8.

Petrus Camper, prof. in de ontleed- en heelkunde te Amsterdam, († 1789) met de nieuwste vorderingen der wetenschappen gemeenzaam bekend, bezorgt eene nieuwe Nederduitsche uitgaaf van het werk van *Mauriceau*, en voorziet hetzelfde met uitmuntende aanmerkingen.

MAURICEAU, *over de ziekten der zwangere vrouwen, met eenige verhandelingen en voorrede van P. CAMPER*, Amst. 1759 met pl. — De bij MAURICEAU gevoegde verhandelingen zijn afzonderlijk overgezet in het Hoogd. onder den titel: *Betrachtungen über einige Gegenstände der Geburtshülfe und über die Erziehung der Kinder*, von P. CAMPER. Leipz. 1777. 8.

P. CAMPER, *Diss. decem, quibus ab illustribus academiis palma adjudata est.* edit HERBELL. Lingae 1798. 8. In het Hoogd. overgezet in *Samml. auserl. Abhandl. für pract. Aerzte*. Band XVIII. f. 58. f.

Jaar.

1756. *Joh. Heinr. Nepom. Crantz*, een leerling van *Levret* en *Pugh*, verdienstelijk hoogleeraar in de verloskunde te Weenen, een vijand van scherpe instrumenten, maakt voornamelijk op de kennis van de verschillende ligging des kinds opmerkzaam, schrijft:

Einleitung in einer wahre und gegriündete Hebammenkunst. Wien 1770.

Ej. Adversaria de praecipuis artis obstetriciae auxiliis. Lipsiae 1760. Ook te vinden in *Nov. Act. Acad. Nat. Curios.* Vol. I.

1759. *Ambrosius Bertrandi*, hoogl. in de heilkunde te Turin, laat belangrijke waarnemingen na.

Opere anatomiche e Cerusiche de Ambrosio Bertrandi, publicate dai Chirurghi PENCHIENATI E BRUGNONE, Turino 1790. 8. T. VIII.

1760. *Georg. Willh. Stein*, (geb. 1737. gest. 1803.) opperhofraad en hoogleeraar te Marburg, een leerling van *Röderer* en *Levret*, en een getrouw aanhanger des laatsten, tracht insgelijks de verloskunde, die hem zeer veel dank verschuldig is, wiskundig te behandelen, vindt eene menigte van instrumenten uit en schrijft:

G. W. STEIN'S, *Anleitung zur Geburtshülfe.* Marburg 1805 met pl.

G. W. STEIN'S etc., *kleine Werke zur praktischen Geburtshulfe.* Marburg, 1798. 8. met 13 pl.

DEZELFDE, *nachgelassen Geburtshülfliche Wahrnehmungen, herausgegeben von G. W. STEIN, Professor zu Marburg*, 2 theilen. Marb. 1807—1809. 8.

1771. De epidemiën van kraamvrouwenkoorts te Londen geven
1770. aanleiding tot naauwkeuriger onderzoek dezer ziekte.

1760. *Gius. Vespa* schrijft:

Tratato delle arte obstetricia. Firenze 1761. 4.

- 1762- *Joh. Carl. Gehler*, hoogl. te Leipzig, draagt door eene
1792. menigte verhandelingen veel tot volmaking der verloskunde bij.

- C. GEHLER's *kleine Schriften, die Entbindungskunst betreffend, aus dem Lat. von C. G. KUHN*. Leipz. 1798. 8.
- Jaar. 1764. *Jens Bang*, (geb. 1737. †1808.) een zeer verdienstelijk leeraar te Koppenhagen.
1765. *Franc. Louis Joseph Solayrez de Renhac*, hoogleeraar te Parijs, een voor de wetenschap te vroeg verstorven verloskundige, († 1772), schrijft:
Elementa artis obstetriciae. Monspcl. 1765. 4.
Heinr. Aug. Wrisberg, hofraad en hoogleeraar te Göttingen, gedurende eenigen tijd bestuurder van het verloskundig instituut aldaar, verandert de tang, en schrijft belangrijke, tot de verloskunde betrekkelijke verhandelingen, welke bijeenverzameld zijn in
Commentationum anatomici, medici, physiologici, obstetricii argumenti etc. Vol. I. Goettingae 1800.
1767. Oprigting van het Westminster's New Lijgingin-hospitaal.
1768. *Joh. Christ. Sommer*, hofraad en hoogleeraar in de verloskunde te Brunswijk, schrijft:
Die Axe des weiblichen Beckens, von SOMMER, 1791. 2te Aufl. Weissenfels 1797.
Praenotionum obstetriciarum. Pens. I. 1794. *Pens. II.* 1800. Brunsv.
1768. *J. J. Plenck*, hoogleeraar te Weenen, een leerling van Crantz, levert als de slotsom zijner ervaring en overdenkingen:
Anfangsgründe der Geburtshülfe, 5te Aufl. Wien 1792. 8.
Joh. Astruc, hoogleeraar te Parijs, geeft in het twee en tachtigste jaar zijns levens een vrij middelmatig handboek der verloskunde uit.
J. A. L'art des accouchemens réduit a ses principes etc. à Paris, 1766. 12.
Traité des maladies des femmes etc. Tom. VI. Par. 1761—1765. *Theoretisch-praktische Abhandlung von den Frauenzimmerkrankheiten. Aus dem Franz. von C. F. OTTO*, Dresden, 1768—1776. m. pl.

- Jaar.
1768. *Pietro Paoli Tanaron*, hoogl. te Pisa, schrijft een, naar hij verzekert, uit de beste schrijvers over de verloskunde getrokken, werk:
L'obstetricia ovvero l'arte di raccogliere i parti etc.
Tweede uitgave: *Il Chirurgo raccogliatore moderno, che assiste le Donne nei parti etc. di P. P. TANARON.*
T. I. II. III. m. pl.
- 1768-
1770. *Matthias Saxtorph*, (geb. 1740. gest. 1801.) een leerling van *Fried en Levret*, hoogleeraar en bestuurder van het verloskundig hospitaal te Koppenhagen, een zeer goed verloskundige, vestigt vooral zijne opmerkzaamheid op het werktuigelijke der regelmatigge geboorte, verzint en verandert onderscheidene instrumenten, en schrijft:
Umriss der Geburtshülfe für Wehmütter. Aus dem Dänischen übersetzt von C. F. SCHRÖDER, Copenh. und Leipz. 1783. 8.
Umriss der Entbindungskunst, in 's Deutsche übersetzt von C. TODE, Copenh. und Leipz. 1792. 8.
SAXTORPH'S gesammelte Schriften, geburtshülflichen, praktischen und physiologischen Inhalts, herausgegeben von P. SCHEEL, Copenh. 1803—1804. 2 Bde. 8. m. pl.
- 1768-
1780. Men twist vooral in Engeland over den voorrang van de uitoefening der verloskunde door mannen of door vrouwen, en over de geoorloofdheid der instrumentale hulp.
On the danger and immodesty of the custom of unnecessarily employing man-midwives. Lond. 1772. 8.
LA PEYNE, Inquiries whether women with child ought to prefer the assistance of their own sex to that of man-midwives. Lond. 1772. 8.
The modern practice of midwifery considered. Lond. 1773. 8.
1769. *Robert Wallace Johnson*, te Brentford, vindt de bilnaadskromming der verloskundige tang uit, en levert volgens *Hunter's* grondstellingen:
A new system of midwifery by R. W. JOHNSON, Lond.

1768. 4. m. pl. — In het Hoogd. *Neues System der Entbindungskunst*, herausgegeben von Dr. J. CHR. LODER. I und II Th. Leipz. 1782. 8.
- Jaar. 1769. J. Albrecht Fried, zijnen vader als tweede leeraar in de verloskunde bij het hospitaal te Straatsburg toegevoegd, vindt eenige instrumenten uit, schrijft zijne weinig eigendommelijks bevattende *Anfangsgründe der Geburtshülfe zum Gebrauch seiner Vorlesungen*. Strassb. 1769. 8. m. pl.
1770. William Hunter, vroedmeester der koningin van Engeland, de voornaamste tegenstander van het gebruik der verloskundige tang, sleet het uitmuntendste werk dat wij over de bezwangerde baarmoeder bezitten. *Anatomia uteri humani gravidi, tabulis illustrata, auctore GUIL. HUNTER etc.* Lond. 1774. gr. fol. 34 tab. overgenomen in LODER's anatomische Tabellen.
- An anatomical description of the human gravid uterus by the late W. HUNTER*, Lond. 1794. 4. Ook in het Hoogd. met aanmerkingen van Dr. L. F. FRORIEP, Weimar 1802. 8.
1770. Mevrouw Bicheron vindt de zoogenaamde hysteroplasmata uit.
- F. A. Deleurye, heelmeeester bij Chatelet, een niet zeer uitstekend leeraar in de verloskunde te Parijs, schrijft: F. A. D. *Traité des accouchemens en faveur des élèves*, à Paris, 1770. 8. — DELEURIE, *Abhandlung über die Geburten etc. übersetzt von FLEMMING*, Breslau 1778. 8. *La mère selon l'ordre de la nature etc. par Mr. DELEURYE*. à Paris, 1762. 8. Hoogd. Nürnberg. 1774. 8.
- Joh. Raulin, eerder als schrijver over de gezondheidsleer dan over de verloskunde aanbevelenswaardig, schrijft: *Instructions succinctes sur les accouchemens en faveur des sages femmes*. Yverdon 1770. 8. — *Anweisung zur Heilammenkunst, a. d. Fr. übers. von ALIX*. Fulda 1775. 8.

Traité des maladies des femmes en couche etc. à Paris, 1771. 8. — *Abhandlung von den krankheiten der Sechswöchnerinnen, a. d. Fr. von Dr. BURDACH, Leipz.* 1773. 8.

Traité de la conservation des enfans etc. 2 vol à Paris, 1768. *Von Erhaltung der kinder von dem ersten Augenblicke ihres Entstehens etc. a. d. Franz. Leipz.* 1769 en 1770. 8.

Minder belangrijk zijn de geschriften van *Berdot, Eloy, Lebas* en *Barbault*.

Abregé de l'art d'accoucher etc. par M. BERDOT, fils. à Basle, 1774. 8.

Cours élémentaire des accouchemens etc. par Mr. ELOY, à Montp. 1773. 8.

Précis de la doctrine sur l'art d'accoucher, par J. LE BAS. à Paris, 1779. 8.

Cours d'accouchemens etc. par BARBAULT, 2 vol. à Paris, 1775 et 1776. 8.

Jaar.
1771. *Jan de Reus* levert eenige belangrijke waarnemingen.

Naauwkeurig onderwijs in de vroedkunde, door JAN DE REUS enz., met eene voorrede van P. CAMPER, Amst. en Harlingen 1771. 8.

1772. *John Leake*, een zeer goed verloskundige aan het Westminster verloskundig hospitaal, levert voortreffelijke aanmerkingen over de ziekten der kraamvrouwen, en maakt eene eigene, met drie takken of lepels voorziene tang bekend.

Practical observations on the childbedfever, on uterine haemorrhagies etc. by J. LEAKE, Lond. 1771. 8. —

Praktische Bemerkungen über verschiedene Krankheiten der Kindbetterinnen und Schwangern etc. von J. L. Leipz. 1775.

A lecture introductory to the theory and practice of midwifery etc. by J. L. Lond. 1774. 4.

- Introduction to the theory and practice of midwifery etc.*
by J. L. ibid. 1787.
- Jaar.
1773. *Jodocus Ehrhard*, te Memmingen, levert eene niet onbelangrijke
Sammlung von Beobachtungen zur Geburtshülfe. Frankf. en Leipz. 1783. 8.
- 1773-
1779. *Jean Louis Baudelocque*, († 1810.) hoogleeraar aan de geneeskundige school en eerste verloskundige aan het hospitaal *de la maternité* te Parijs, een der beroemdste Fransche verloskundigen, een goed, echter al te breedvoerig schrijver, en uitvinder van onderscheidene instrumenten, schrijft :
Principes sur l'art d'accoucher, par demandes et réponses en faveur des sages-femmes. Paris 1787. 12. — Hoogd. *Anfangsgründe der Geburtshülfe etc. a. d. Fr. nach der 3 Augsb. übers. von L. G. MOREL*, Colmar, 1801. 8. — *Grondbeginselen der verloskunde, in vragen en antwoorden*. Amst. 1790. 8.
L'art des accouchemens, par Mr. BAUDELOCQUE etc. 5me edition. 2 vol. Paris 1815. 8. — B's *Anleitung zur Entbindungskunst, übersetst vom Prof. MECKEL* in Halle. Leipz. 1791. 8. — BAUDELOCQUE, *Verloskunde, met aantekeningen door A SOEK*, Utr. 1790. 4 deelen, 5 stukken, met pl. gr. 8.
1774. *Joh. Raph. Steidele*, hoogleeraar te Weenen, munt niet bijzonder uit, vindt onderscheidene instrumenten uit, en schrijft :
J. R. ST. *Lehrbuch von der Hebammenkunst etc.* Wien 1779. m. pl.
J R. ST. *Lehrbuch von dem unvermeidlichen Gebrauch der Instrumente in der Geburtshülfe*. Wien 1774. 2te Aufl. 1785. 8.
Dezelfde. *Sammlung verschiedener Beobachtungen etc.* Wien 1787. 8.

Verhaltensregeln für Schwangere , Gebärende und Kindbetterinnen etc. von R. ST. Wien, 1787. 8.

Jaar.
1775. Alexander Hamilton , hoogleeraar in de verloskunde te Edinburg , schrijft :

Elements of the practice of midwifery. Lond. 1775. 8.

ALEX. HAMILTON'S *Abhandlung über die Hebammenkunst etc. a. d. Engl.* von Dr. EBELING , Leipz. 1782. 8.

Outlines on the theory and practice of midwifery. Lond. 1783. 8.

Letter to Dr. OSBORN on certain doctrines etc. from A. HAMILTON. Edinb. 1792. 8.

1777. Jean René Sigault en Alphonse le Roi verrigten het eerst de schaambeensnede aan de vrouw van zekeren Souhot. *Recit, de ce que s'est passé à la faculté de médecine à Paris, au sujet de la section de la symphise des os pubis, pratiquée sur la femme Souhot.* Paris 1777.

1779. Alph. le Roi , hoogleeraar aan de geneeskundige school te Parijs , tegenstander van Levret en Baudelocque , een zeer roemzuchtig man , schrijft :

Recherches historiques et pratiques sur la section de la symphise du pubis. à Paris, 1778. 8.

Recherches sur les habillemens des femmes etc. Paris 1772. 8.

Essai sur l'histoire naturelle de la grossesse et de l'accouchement. Paris 1787. 8. (vergelijk §. 15.)

1779. Just. Christ. v. Loder , hoogleeraar te Jena (later te Halle , thans Russ. keiz. staatsraad te Moskau) , bewerkt de oprigting van het verloskundig instituut te Jena , verrijkt de verloskunde niet alleen door belangrijke verhandelingen en redevoeringen , maar wel voornamelijk door zijn *Journal für Chirurgie , gerichtliche Medizin und Geburtshülfe.* Jena 1798—1804. 4 Bde.

1780. Robert Bland , verloskundige te Londen , een tegenstander van Osborn , schrijft zeer middelmatige

I. D,

D

Observations on human and comparative parturition, by R. BLAND, Lond. 1794.

Edward Forster, leeraar in de verloskunde te Dublin, schrijft in korte maar bondige stellingen:

The principles and practice of midwifery etc. by E. F. completed and corrected by JAMES SIMS. Lond. 1781. 8.
E. FORSTER, theoretische und praktische Anweisung zur Geburtshülfe. Leipz. 1786. 8.

William Dease, een bekwaam verloskundige te Dublin, levert bruikbare

Observations on midwifery etc. by W. DEASE, Dublin 1783. 8. — DEASE'S Bemerkungen über die Entbindungskunst, im langwierigen und schweren Geburten, übersetzt von Dr. MICHAELIS, Leipz. 1788. 8.

Jaar.

1783. Stichting van het verloskundig instituut te Edinburg.

1784. *John Aitken*, hoogl. te Edinburg, munt door zijne zonderbare voorstellen en uitvindingen uit.

Principles of midwifery or puerperal medicine, by J. AITKEN etc. Lond. 1784. 85 en 86. — J. AITKEN, Grundsätze der Entbindungskunst. a. d. Engl. von Dr. SPOHR. Nürnberg. 1789. 8.

David Spence, verloskundige te Edinburg (?), schrijft: *System of midwifery by D. SPENCE, 2 vol. Lond. 1784. 8.*
DAV. SPENCE'S system der theoretischen und practischen Entbindungskunst. a. d. Engl. Schweinfurt 1787. 8.

Pio Urbano Galeotti, verloskundige te Napels, schrijft: *U. G. L'ostetricia pratica. Napoli, 1787.*

Thomas Denman († 1815), een zeer verdienstelijk verloskundige aan het Middlesex-hospitaal te Londen, maakt zeer belangrijke aanmerkingen bekend.

An essay on natural labours. Lond. 1786.

An essay on praeter natural labours. ibid. 1787.

Aphorismes on the application and use of the forceps and sectis on praeter natural labours etc. ibid. 1817. 8.

Hoogd. in *Journal für Geburtshelf.* 2 St. S. 39.
Frankf. en Leipz. 1787 en 1788. m. pl.

An introduction to the practice of midwifery, by TH. DENMAN etc. 5 edition considerably improved. London 1816. 8. met pl. — Eene met verbeteringen voorziene uitgave is door JOHN W. FRANCIS, hoogleeraar in de verloskunde te Newjork bezorgd geworden. Newjork 1821. 8.

DENMAN'S *Anleitung zur praktischen Geburtshülfe. a. d. Engl. von Dr. RÖMER.* Zurich, 1791. 8.

Collection of engravings tending to illustrate the generation and parturition of animals. Lond. 1815.

W. Osborn, verloskundige en leeraar te Londen, in Engeland zeer beroemd, levert als de slotsom zijner ervaring en overdenkingen

Essay on laborious parturitions by W. OSBORN. Lond. 1783.

Essays on the practice of midwifery in natural and difficult labours. ibid. 1792. — W. OSBORN'S *Versuch über die Geburtshülfe in natürlichen und schweren Geburten*, uebersetzt von Dr. MICHAELIS. Liegn. 1794.

Het kraamvrouwengesticht te Weenen wordt met het groote hospitaal vereenigd.

Jaar. 1785. C. T. Vermont, vroedmeester der koningin van Frankrijk (gest. 1801.), bewerkt eene jaarlijksche prijsuitdeeling voor de beste, aan de akademie der heekunde aangebodene verloskundige verhandeling.

Trattato di ostreticia e di lei rispettive operatione, di L. N. Siena 1785. 8. 2 vol.

Joh. Phil. Hagen, verloskundige en onderwijzer aan de vroedvrouwenschool te Berlijn, doet zijn best om de grenzen der lagere (tot het gebied der vroedvrouwen behoorende) en hoogere verloskunde (het veld van den eigenlijk verloskundigen arts,) vast te stellen, en vindt tevens eenige instrumenten uit.

Versuch eines neuen Lehrgebäudes der praktischen Geburtshülfe etc. 2 Theilen. Berlin, 1781 en 1782. 8.

Erläuterung seines neuen Lehrgebäudes etc. ibid. 1787. 8.

Zeichenlehre für Geburtshelfer. Hannov. 1795.

J. B. Jacobs, heelmeeſter en lector in de verloskunde te Gent, ſchrijft:

Ecole pratique des accouchemens par J. B. JACOBS, à Paris, Bruxelles et Gand, 1785. 4. m. pl.

J. B. J. praktiſcher Unterricht in der Entbindungskunst. a. d. Franz. vom Prof. BUSCH. Marb. 1787.

Jaar.
1786.

Giuseppe Nessi, hoogleeraar in de verloskunde te Pavia, ſchrijft een beknopt doch goed handboek.

G. N. *Arte ostetricia teorico-pratica etc.* in Venezia, 1797. 8.

Herman Schitzererantz.... ſchrijft:

Om Förrlossnings vetenskapen theoretiska Del. in systematik ordning. Stokholm 1786. 8.

1787.

J. Christ. Stark, († 1811) hofraad en hoogleeraar te Jena, een beroemd verloskundige, verrigt met gelukkig gevolg de keizerlijke ſnede, vindt onderscheidene instrumenten uit, en bezorgt de uitgave van het veel uitmuntends bevattende

Archiv für Geburtshülfe, Frauenzimmer- und neugeborner Kinder-krankheiten. 6 Bde. Jena, 1787—97.

Neues Archiv etc. 2 Bde. ibid. 1798—1803.

1788.

Theob. Etienne Lauerjat verzint eene nieuwe manier van de keizerlijke ſnede te verrigten. (zie verder beneden.)

1789.

Cornelis van den Ende, genees- en vroedmeester in den Oudenbosch, ſchrijft belangrijke

Verloskundige waarnemingen en aanmerkingen. Utrecht en Amst. 1789. 8.

1790.

Simon Zeller, K. K., lijf-heelmeester, eerste geneesheer en verloskundige aan het kraamvrouwengesticht voor de betalende vrouwen te Weenen, laat het allereerst onderscheidene geboorten, die voorheen steeds door middel der kunst

ten einde gebragt werden, aan de natuur over, en met regt. s. z., *Bemerkungen über einige Gegenstände der praktischen Entbindungskunst etc.* Wien 1789. 8.

Lehrbuch der Geburtskunde. 2te Aufl. Wien 1802. 8. met pl.

Luc. Joh. Boër, hoogleeraar in de theoretische en praktische verloskunde te Weenen, een der *uitmuntendste thans levende verloskundigen*, dringt er bijzonder op aan, om de natuur weder meerdere regten in te willigen; hij vereenvoudigt de aanwijzingen tot het doen van operatiën, is evenwel zelf een bekwaam operateur.

Dr. L. J. B. naturliche Geburtshülfe und Behandlung der Schwangern, Wöchnerinnen und neu-geborenen Kinder. 3. Aufl. 3 Bde. Wien 1810. 8. — *Supplement zur naturlichen Geburtshülfe etc. von L. J. BOER.* Wien 1826. 8. — Ook in het Latijn onder den titel *L. J. BOËRI, naturalis medicinae obstetriciae libri VII.* Viennae 1812. 8. — *Supplementa in L. J. BOËRI, naturalis medicinae obstetriciae libros VII.* ibid. 1826. 8.

Weissenborn, bestuurder van het verloskundig instituut te Erfurt, een, zeer uitmuntende grondregels bezittend, praktisch arts.

Sacombe, verloskundige te Parijs, een oorspronkelijk doch tevens vele buitensporige denkbeelden bezittend man, wil eene geheele omwenteling in de verloskunde bewerken, en voornamelijk de keizerlijke- en schaambeensnede afschaffen. Hij sticht eene *école antecésarienne*, begaat vele kwakzalverijen en schrijft:

Le médecin accoucheur etc. par Mr. s. Paris 1791. 8. —

Der Arzt als Geburtshelfer; aus dem Franz. von Dr. KRAMP. Manheim 1796. 8.

Avis aux sages femmes. Paris 1792. 8.

La Luciniade ou l'art des accouchemens, poëme didactique. ibid. 3. edit. an IX.

Observations medico-chirurgicales sur la grossesse, le

travail , et la couche etc. par Mr. s. ibid. 1793. 8 —
Neue Theorie der Geburtshülfe. Frankf. a M. 1797.

Les douze mois de l'ecole antecésarienne etc. à Paris ,
 1797. 8.

Elemens de la science des accouchemens par le Dr. s.
 ibid. 1797. 8.

Lucine française , ouvrage periodique 1. et 2. année.
 ibid. an XI. 1802—1804. 8.

Examen critique de la doctrine , et des procédés du cit.
 SACOMBE. ibid. an VII. 8.

BAUDELOCQUE'S und SACOMBE'S *Streitschriften , eine Ent-*
bindung , wobei ein Gebärmutterriss entstand betref-
fend , an Dr. F. mit Vorrede und Anmerkungen von
 G. CH. SANDER, Nordhausen, 1804. 8.

Fr. Benj. Osiander , hoogleeraar en bestuurder van het
kraamvrouwen-geslacht te Gottingen , een geleerd en ge-
schikt , maar bovenmate met zijne eigene gevoelens voor-
ingenomen man , beoefent voornamelijk het kunstmatige
gedeelte der verloskunde , denkt onderscheidene instrumen-
ten uit , en schrijft :

Beobachtungen , Abhandlungen und Nachrichten etc.
 Tübingen 1787. 8.

Denkwürdigkeiten für die Heilkunde und Geburtshülfe ,
 2 Bde. Gött. 1794 en '95. 8.

Neue Denkwürdigkeiten für Aerzte und Geburtshelfer.
 1 Bd. ibid. 1798. 8.

Annalen der Entbindungslehranstalt. 2 Bde. ibid. 1801
 —1804. 8.

Grundriss der Entbindungskunst zur Leitsaden bei seinen
Vorlesungen. ibid. 1802. 2 Bde. (vergelijk §. 15.)

Handbuch der Entbindungskunst , 1 Bd. 1. 2. Abtheil.
 Tübingen 1818 en 1819. 2 Bandes 1. Abtheil. 1820.
 2. Abtheil. 1821. 8.

Dritter Band , 1825. (Die Anzeigen zur Hülfe bei un-

regelmässigen und schweren Geburten, von Dr. JOH. FRIED. OSIANDER, prof. te Göttingen.)

Joh. Phil. Vogler († 1816.), hofraad en lijfarts te Weilburg, een vijand der werktuigelijke, beminnaar der geneeskundige verloskunde, levert belangrijke waarnemingen.

Erfahrungen über Geburt und Geburtshülfe, von VOGLER. Marburg 1797. 8.

Ph. F. Meckel, geheimraad en hoogleeraar te Halle, draagt, door de vorming van uitmuntende kweekelingen, veel tot volmaking der verloskunde bij.

Dr. *J. G. Bernstein*, hoogleeraar te Berlijn, een goed verzamelaar, schrijft volgens het alphabet:

J. G. B. praktisches Handbuch der Geburtshülfe. Leipz. (nieuwste uitgave) 1798. 8.

J. G. B. Zusätze zur praktischen Handbuche. ib. 1803. 8.

Franz. Jos. Hofer en *Joh. Georg von Höfle*, hoogleeraren en physici te Dillingen, geven onvoltooid geblevene handboeken uit.

Dr. *F. J. Hofer's etc. Lehrsätze der praktischen Geburtshülfe, Manual-Operationen betreffend*. Augsb. 1788. 8.

Dr. *G. v. Höfle etc. Lehrsätze der Geburtshülfe*. ibid. 1794. 8.

Lehnhart in Quedlinburg († 1811), met zijnen gezondheidsdrank voor zwangere vrouwen, is een schandelijk geldgierig kwakzalver.

Jaar. 1791. *Joseph von Mohrenheim*, vroedmeester der grootvorstin van Rusland, een man die weinig heldere denkbeelden bezit, schrijft:

Wienerische Beiträge zur Arzneykunst, Wundarzneykunst und Geburtshülfe. 1 Bd. Wien, 1791. 2 Bde. Dessau, 1793. 8.

Abhandlungen für die Entbindungskunst, verfasst zum Nutzen (!) des Russischen Reiches, von J. V. MOHRENHAIM, Petersb. 1792. Reg. fol. met pl.

Aug. Heimbert Hinse, lijfarts van den graaf van Hochberg, munt evenmin als voortreffelijk schrijver uit.

Versuch eines systematischen Grundrisses der theoretischen und praktischen Geburtshülfe. Stendal, 1791.

Versuch einer chronologischen Uebersicht aller, für die Geburtshülfe erfundenen Instrumente. Liegn. en Leipz. 1794.

Deszelfs *kleinere Schriften, medicinischen, chirurgischen und hebärztlichen Inhalts*. 1 Bd. ibid. 1802. 8.

J. Melitsch, een zeer bekwaam verloskundige, maakt zich bij het kraamvrouwen-geslacht te Praag zeer verdienstelijk.

Deszelfs *vier Abhandl. über die Geburtshülfe*. Prag. 1793.

Jaar.

1792. *Francesco Valle*, leeraar in de verloskunde te Florence, volgt grootendeels *Lavret* en *Baudelocque*, heeft echter ook veel eigendommelijks.

Opera d'ostetricia etc. in Firense 1792. III. Tom. met pl.

F. Snip en *A. Soek* geven uit:

F. SNIP, vroedkundige afbeelding eener bezwangerde baarmoeder, in vier heele vels platen, met eene beschrijving van *D. VAN GESSCHER*, in folio. Amst. 1792.

A. SOEK, verloskundige waarnemingen van zware en zeldzame verlossingen, met pl. Leid. 1792. 8.

1793. *Joh. Günth. Eberhard*, geneesheer en vroedmeester te Zeist, maakt belangrijke waarnemingen over het verlossen der koeijen bekend.

Verhandeling over het verlossen der koeijen, door *J. G. E.* Amst. 1793. 8. met pl.

1795. *Francesco Asdrubali*, hoogleeraar in de verloskunde te Rome, en bestuurder van een, door *PIUS VI* in het jaar 1789 gesticht verloskundig instituut, vindt eenige instrumenten uit, en schrijft met vele belezenheid:

Elementi di ostetricia. Schritti da FR. ASDRUBALI. II. Tom. in Roma, 1795 en 1797.

FR. ASDRUBALI, *elementi di ostetricia, con note di Scatigna*. Napoli, 1811. 4 vol. 8.

De bekendmaking van het stelsel van *Brown*, en nog meer de bearbeiding van de zoogenaamde theorie der opwekking (*erregungs-theorie*), heeft grooten invloed op de geneeskundige verloskunde in Duitschland.

Bodin, verloskundige te Parijs, levert eenige belangrijke bijdragen in zijn

Essai sur les accouchemens. à Paris, 1797. 8.

Jaar.
1797.

De keizerin *Maria Federowna* van Rusland laat te Petersburg een nieuw kraamvrouwen-gesticht, benevens eene vroedvrouwen-school oprigten.

1798.

A. E. von Siebold, († 1827.) een zeer bekwaam hoogl. in de verloskunde, treedt te Würzburg in de plaats van zijnen, voor de wetenschappen te vroeg verstorvenen, broeder *Georg. Christoph. Siebold*, komt in 1816 als hoogleeraar aan de universiteit te Berlijn, en schrijft:

Einige Worte an meiner Herrn Zuhörer. Würzb. 1798.

Lucina, eine Zeitschrift zur Vervollkommnung der Entbindungskunst. Leipz. 1803—12. 6 Bde. 8.

Lehrbuch der theoretischen Entbindungskunde. 2 Bde. (Leipz. 1803 u. 1804.) 4. Aufl. Nurnb. 1824. 8. —

Lehrbuch der praktischen Entbindungskunde, 3. Aufl. Nurnb. 1821. 8. (vergelijk §. 11 en 12.)

Journal für Entbindungskunst, Frauenzimmer und Kinderkrankheiten, 6 Bde. Frankf. 1813—1826.

Ueber den praktischen Unterricht in der Entbindungskunst, nebst einer systematischen Uebersicht seiner Uebungen am Phantom. 2. Ausg. Leipz. 1818. 8.

Ludw. Vogel, praktisch geneesheer te Arnstad, vervaardigt een tamelijk bruikbaar

Taschenbuch für angehende Geburtshelfer etc. Erfurt 1798—1802. 8. (ook onder den titel: *volständiges Lehrbuch der medizinischen und chirurgischen Geburtshülfe*).

J. H. Wigand († 1817.), praktiseerend verloskundige te Hamburg, deelt ons zeer belangrijke waarnemingen en aanmerkingen mede.

Beiträge zur theoretischen und praktischen Entbindungskunst, 1tes und 2tes Heft. Hamb. 1798 en 1800.

Hamburgisches Magazin für die Geburtshülfe, herausgegeben von J. J. GUMPRECHT und J. H. WIGAND. 1 B. 1807—1809. 8. 2 Bd. 1810.

Drei, den medizinischen Facultäten zu Paris und Berlin zur Prüfung übergebene, geburtshülflliche Abhandlungen von Dr. WIGAND. Hamb. 1812. 4. met 1 pl.

Dr. J. H. WIGAND, *die Geburt des Menschen, in physiologisch-diaetetischer und pathologisch-therapeutischer Beziehung etc.* 2 Bde. Berlin 1820. 8. — J. H. W., *de geboorte van den mensch, enz., uit het Hoogd.* door C. VAN ELDIK, 3 deelen. Amst. 1822—1826. 8.

Immanuel Gottlieb Knebel, geneesheer te Görlitz, († 1806.) levert twee voor de beoefening der verloskunde zeer belangrijke geschriften.

Grundriss zu einer Zeichenlehre der Entbindungswissenschaft. Breslau 1798. 8. (vergelijk §. 11.)

De beroemde ontleedkundige, Sam. Thom. Soemmering, levert ons de beste afbeeldingen der menschelijke vrucht.

S. TH. S., *Icones embryonum humanorum*. Frankf. a. M. 1799. fol.

Ejusd. Tabula sceleti foemini. Frankf. a. M. 1796. fol.

Jaar.
1799.

B. N. Schreger, verdienstelijk leeraar in de heel- en verloskunde te Erlangen, († 1825.) geeft in het licht:

Die Werkzeuge der ältern und neueren Entbindungskunst. Erlangen 1799. fol.

Uebersicht der geburtshülfllichen Werkzeuge im Apparate. Erlangen 1810. 8.

John Burns, heelmeeester te Glasgow, schrijft eene niet onbelangrijke bijdrage tot de kennis der zwangere haar-

moeder en een, vele ervaring bevattend verloskundig handboek.

The anatomy of the gravid uterus with practical inferences relative to pregnancy and labour. Glasgow 1799. 8.

The principles of midwifery, including the diseases of women and children, by JOHN BURNS. Lond. 1809. 6. edition, 1826. 8. *Grundsätze der Geburtshülfe, a. d. E. von D. F. H. KÖLPIN.* Berlin, 1820. 8.

Handb. der Geburtshulfe, mit Innbegrif der Weiber- und Kinderkrankheiten, nach der 6. Ausg. bearbeitet von H. F. KILIAN, Heidelb. 1828—1830.

Georg Thom., geheimraad, geneesheer en verloskundige te Darmstad, († 1808.) levert eenige merkwaardige waarnemingen in zijne

Erfahrungen und Bemerkungen aus de A. W... W. A. W. und Erbindungswissenschaft, etc. Frankf. 1799.

1800. Christ. Ludw. Mursinna, koninkl. Pruiss. opperste chirurgijn, zeer verdienstelijk bestuurder van het verloskundig instituut bij het hospitaal *la Charité*, († 1823.) reeds door zijn werk over de ziekten der vrouwen bekend, begiftigt ons ook nog met een

Journal fur Chirurgie Arzneikunde und Geburtshülfe. Berlin, 1800. 2 Bde. 8.

Neues Journal etc. 1 Bd. 1803. 8.

Neuestes Journal etc. 1817. 8.

A. van Solingen, lector in de verloskunde te Middelburg, naderhand hoogleeraar der geneeskunde te Leuven, tracht het werktuigelijke der verlossing tot een algemeen grondbeginsel te herleiden.

A. v. s., *het werktuigelijke der verlossing verklaard, betoogd en herleid tot een algemeen grondbeginsel.* Leid. 1799. 8.

Dezelfde, *over de onregelmatige weeën bij misvormd bekken.* 1827. 8.

J. H. GALLANDAT, *Precis de la doctrine de Mr. VAN SOLINGEN*, Leuven, 1823. 8.

1801. Dr. A. F. Nolde, hoogleeraar te Halle, († 1814.) onderwerpt in het bijzonder de stelselmatige voordragt der verloskunde, aan een meer grondig en nauwkeurig onderzoek.

Beiträge zur Geburtshülfe, von Dr. A. F. N. 1ster Stück, Rostock 1801. *2ter Stück*, Erfurt, 1803—1810. *3ter Stück*, Erfurt, 1811. 8.

Notizen zur Cultergeschichte der Geburtshülfe in dem Herzogthum Braunschweig. Erfurt, 1807. 8.

Onder den naam van Dr. Kentisch, schrijft een onbekende (Millot?) eenige belangrijke aanmerkingen over de grondstellingen van Baudelocque.

Lettres du Dr. W. K. au cit. BAUDELOCQUE sur quelques passages de son traité d'accouchemens. Paris, an VIII. (1799) 8. In het Hoogd. vertaald met een aanhangsel van Dr. MARTENS. Leipz. 1801. 8.

Jaar.

1801.

Jacob Friedr. Schweighäuser, praktiseerend genees- en verloskundige te Straatsburg, voormaals verloskundige van het gemeente-hospitaal aldaar, maakt den Franchen en Duitschers een nuttig geschenk door zijne

Archives de l'art des accouchemens etc. à Strasbourg, An IX—XI. 1801—1802. Vol. II. 8.

Aufsätze über einige physiologische und praktische Gegenstände der Geburtshülfe, von Dr. J. F. S. Nürnberg. 1817. 8. (vergelijk §. 15.)

Das Gebären nach der beobachteten Natur und die Geburtshülfe nach dem Ergebnisse der Erfahrung. Straatsburg 1825. 8.

1802. F. H. Martens, praktiseerend geneesheer te Leipzig, († 1805.) schrijft ten deele naar een geheel nieuw plan.

Versuch eines vollständigen Systems der theoretischen und praktischen Geburtshülfe. Leipz. 1802. 8.

Tabellarische Uebersicht der praktischen Entbindungskunst in Hinsicht auf die verschiedenen Lagen der Kinder und die wichtigsten Manuale und Instrumental-Operationen. Jena 1805. fol.

Jaar.
1803.

W. G. v. Herder, praktiseerend geneesheer en provinciaal verloskundige te Weimar, († 1806.) levert zeer lezenswaardige waarnemingen.

Zur Erweiterung der Geburtshülfe, diagnostisch praktische Beiträge. Leipz. 1803. 8. met pl.

1804.

J. A. Millot, belooft bijvoegfels en verbeteringen voor alle verloskundige geschriften, offchoon hij onder de Duitse en Engelsche schrijvers geene nieuweren kent, of althans geene anderen in aanmerking neemt, dan *Roederer* en *Denman*.

Supplément à tous les traités tant étrangers que nationaux, anciens et modernes sur l'art des accouchemens. Seconde edition. 2 vol. Paris, 1809. 8. met pl.

W. Schnitt, K. K., raad en hoogleeraar aan de Josepfs-akademie te Weenen, betoont zich als een, met een goed denkvermogen en verstand begaafd verloskundige:

Ueber obstetricische Kunst und Kunstelei. Frankf. 1816. 8.
Geburtshülflche Fragmente. Wien, 1816. 8.

Sammlung zweifelhafter Schwangerschaftsfälle, nebst einer kritischen Einleitung über die Methode des Untersuchens zum gebrauch für angehende Geburtshelfer. Wien. 1818. 8.

Gesammelte obstetricische Schriften mit einem Anhang über die herrschenden Lehrbegriffe des Mutterkuchens. Wien 1819. 8.

Fr. Collard, hoogleeraar te Krakouw, levert daarentegen een, voor den tegenwoordigen toestand der verloskunde, middelmatig handboek.

FR. COLLAND, Fundamenta artis obstetriciae. Viennae 1804. 8.

- Jaar.
1805. *J. C. Ebermayer*, geneesheer en verloskundige te Rheede, schrijft voor de door hem met *Consbruch* gezamenlijk uitgegevene *Encyclopedie* voor praktiseerende genees- en heelkundigen ook een *Taschenbuch der Geburtshülfe*, 1 Bd. Leipz. 1805.
1806. Oprigting van het kraamvrouwengesticht te Halle, onder *Froriep*, dat naderhand onder *F. Senf* vergroot is.
C. F. SENF, ueber die *Vervollkommnung der Geburtshülfe von seiten des Staates etc.* Halle, 1812. met pl.
H. A. Bake, geneesheer en lector in de verloskunde te Rotterdam, geeft eene geachte handleiding der verloskunde uit.
H. A. B. Leerboek der Verloskunde. Leid. 1806. m. pl.
1807. *J. A. Schmidtmüller*, hoogleeraar in de verloskunde aan de universiteit te Landshut, († 1809.) schildert als een wijsgeerig denker den toestand der verloskunde van zijnen tijd.
Der Stand der Geburtshülfe der neuesten Zeit, kritisch beleuchtet von J. A. S. Erlang. 1807. 8.
C. M. Gardien, een zeer geacht privaat-onderwijzer der verloskunde te Parijs, schrijft :
Traité d'accouchemens, des maladies des femmes etc. 4 vol. Paris, 1807. 3. edit. Paris 1823. 8. met pl.
C. W. Hazelberg, koninklijk lijfarts en hoogleeraar te Greifswalde, verklaart zich voor de betere, nieuwere grondstellingen der verloskunde.
Untersuchungen und Bemerkungen über einige Gegenstände der praktischen Geburtshülfe. Berlin en Straalsund 1807. 8.
Joh. Christ. Gottfr. Joerg, leeraar aan de universiteit en praktiseerend genees- en verloskundige te Leipzig, een werkzaam, vooroordeelvrij man, schrijft :
Versuche und Beiträge geburtshülftlichen Inhalts, zur Verbreitung einer naturgemässen Entbindungsmethode

und Behandlung der Schwangeren und Wöcherinnen,
von Dr. J. CH. G. J. Leipz. 1806. 8.

Handbuch der Geburtshülfe für Aerzte und Geburtshelfer etc. met 1 pl. Leipz. 1807. 2de uitgave. Leipz. 1820. 8.

Ueber das Gebärorgan der Menschen und der Säugethiere, im swangeren und nicht schwangeren Zustände, Leipz. 1808. met pl. fol.

Handbuch der Krankheiten des menschlichen Weibes, nebst einer Einleitung in die Physiologie und Psychologie des weiblichen Organismus, Leipz. 1809. 8.

Schriften zur Beförderung der Kenntniss des menschlichen Weibes im allgemeinen, und zur Bereicherung der Geburtshülfe in's besondere, 1. Th. Leipz. 1812. 2. Th. 1818. 8.

Taschenbuch für gerichtliche Aerzte und Geburtshelfer bei gesetzmässigen Untersuchungen des Weibes, von Dr. J. CH. G. J. Leipz. 1814. 8.

J. CH. G. J. *Was hat eine Entbindungsschule zu leisten und wie muss sie organisirt sein?* Leipz. 1828. 4.

Anleitung zu einer rationellen Geburtshülfe landwirthschaftlicher Thiere, 2te Aufl. Leipz. 1818. 8. m. pl.

Jaar.
1807.

Frans May, geheim hofraad en verdienstelijk leeraar in de heilkunde te Heidelberg, († 1814.) schrijft zijne, uit de ervaring ontleende, leerzame

Stolpertus, ein junger Geburtshelfer am Kreissbette, von einem patriotischen Pfälzer. Manheim 1807. 8.

1808.

Joh. Peter Weidmann, een zeer verdienstelijk leeraar in de heel- en verloskunde te Mentz, († 1820.) schrijft: *Entwurf der Geburtshülfe für seine Vorlesungen*, von Dr. J. P. WEIDMANN. Mainz, 1808. 8.

J. G. Walter, hoogleeraar in de ontleedkunde, en lid van de koninklijke akademie der wetenschappen te Berlijn, schrijft het, zijnen overigens zoo roemrijk bekenden naam, onwaardige werkje:

Was ist Geburtshülfe? Berlin, 1808. 8.

G. W. Stein, Junior, volgt (in 1804) zijnen oom in het hoogleeraarsamt te Marburg op, onderwijst naderhand te Bonn, en schrijft:

Annalen der Geburtshülfe überhaupt, der Entbindungsanstalt zu Marburg in's besondere. 5 St. Marb. 1808—1811. 8. —

Was war Hessen der Geburtshülfe etc. Bonn, 1819. 4.

Die Lehr-Anstalt der Geburtshülfe zu Bonn; ihr Anfang und Fortgang, ihre wissenschaftliche Hülfsmittel, ihre Ausdehnung etc. von G. W. ST. Elberfeld, 1823. 8.

Die Lehre der Geburtshülfe, als neue Grundlage des Faches, insonderheit als Leitfaden bei Vorlesungen. Verfasser: G. W. STEIN, *Erster Theil.* Elberfeld, 1825. 8. met 18 afb. op 5 pl. *Zweiter Theil.* Elberfeld, 1827. 8.

Jaar.

1810.

Jean Baptiste Gasc..... geeft uit:

Recueil de plusieurs mémoires et observations sur divers points de doctrine de l'art et de la science des accouchemens. Paris 1810. 8.

1811.

Oprigting van een voor het onderwijs bestemd kraamvrouwengesticht te Leipzig, onder het opzigt van Joerg, en uitbreiding van het, voor het verloskundig onderwijs dienende gesticht, in het ziekenhuis te Tübingen, onder Froriep.

J. Capuron, privaat-onderwijzer der verloskunde te Parijs, schrijft, meestal overeenkomstig Baudelocques grondstellingen.

Cours théorique et pratique d'accouchemens, dans lequel on expose les principes de cette branche de l'art, les soins que la femme exige pendant et après le travail etc. Paris 1811. 8.

La médecine légale relative a l'art des accouchemens etc. Paris 1821. 8.

Jaar.
1811.

P. Dufay, insgelijks privaat-onderwijzer in de verloskunde te Parijs, houdt zich onledig met eene nieuwe zinnebeeldige voorstelling van de verschijnselen der zwangersheid en verlossing, en schrijft:

Essai sur la théorie et la pratique des accouchemens. Paris, 1811. 8.

A. F. Jungman, hoogleeraar te Praag, schrijft insgelijks een

Lehrbuch der Geburtshülfe, 1ster und 2ter Theil. Prag, 1812. 8.

1812.

Franz. Carl Naegele, gewoon hoogleeraar in de geneeskunde te Heidelberg, geeft zijne zoowel voor de theorie als praktijk belangrijke waarnemingen en verhandelingen in het licht.

Erfahrungen und Abhandlungen aus dem Gebiete der krankheiten des weiblichen Geschlechts. Nebst Grundzüge einer Methodenlehre der Geburtshülfe. Mannheim, 1812. 8. m. pl.

Mevr. *Boivin*, eerste vroedvrouw van, en het opzigt hebbende over het hospitaal *de la maternité*, voor zoo verre het zogen betreft, schrijft overeenkomstig de grondstellingen van *Baudelocque*, een met 133 afbeeldingen voorzien

Memorial de l'art des accouchemens etc. à Paris, 1812. 8. 3 edit. 1817. 8.

Moritz. Heinr. Mendel (†1813.), hoogleeraar in de verloskunde te Breslau, levert belangrijke

Versuche und Beiträge geburtshülfflichen Inhalts, 1. Heft. Breslau, 1812. 8.

James Hogben, heel- en vroedkundige te Londen, (†1816.) schrijft:

Obstetric studies. Lond. 1812. 4. (hoogst middelmatig.)

Anatomical tables of the human gravid uterus illustrative of his treatise on midwifery intituled: obstetric studies.

2. Afdeelingen, Imp. fol. 1812. (schoone, in reijen

geplaatste, voorstellingen van het onderlijf bevattende
at beeldfels.)

Jaar.
1814.

Samuel Merriman, leeraar der verloskunde en verloskundige bij het Middlesex-hospitaal te Londen, levert:

A synopsis of the various kinds of difficult parturition with practical remarks on the management of labours.
Lond. 1814. 8.

Die regelmässigen Geburten und ihre Behandlung von Dr. SAM. MERRIMAN etc. A. d. Engl. übersetzt von Dr. H. F. KILIAN, met 5 steendruk pl. Mannheim en Leipzig, 1826. 8.

Samuel Bard, hoogleeraar aan de universiteit te New-York, schrijft voor vroedvrouwen en eerstbeginnende verloskundigen

A compendium of the theory and practice of midwifery.
New-York, 1815. 8. m. pl.

1815.

Maygrier, een verdienstelijk en ervaren praktiseerend verloskundige te Parijs, schrijft zeer bruikbare

Nouveaux élémens de la science de l'art des accouchemens. Paris, 1815. 8. seconde édition. 1817. 8.

Nouvelles démonstrations d'accouchemens, avec des planches en taille douce, accompagnées d'un texte raisonné propre à en faire l'explication. Paris, 1822—1827. fol.

Abbildungen aus dem Gesamtgebiete der theoretischen und praktischen Geburtshülfe, nebst beschreibende Erklärung derselben. Nach d. Franz. des MAIGRIER bearbeitet und mit Anmerkungen versehen von E. C. J. V. SIEBOLD. Berl. 1828—1829. fol.

Johann. Phil. Horn, hoogleeraar aan de K. K. school, en verloskundige aan het algemeene K. K. kraamvrouwen-gesticht te Grätz, wil te gelijk voor verloskundigen en voor vroedvrouwen schrijven, voldoet echter noch voor de eersten, noch voor de laatsten door zijn

Theoretisch - praktisches Lehrbuch der Geburtshülfe.
Grätz 1815. 2 Theile. 8.

J. P. HORN, *Bemerkungen und Erfahrungen über einige Gegenstände der Geburtshülfe, als wezentlicher Anhang zu seinem theoretisch-praktischen Lehrbuch.* Wien, 1826. 8. m. 2. pl.

Jaar.
1816. Joh. T. Lobstein, hoogleeraar in de verloskunde te Straatsburg, roemvol bekend als ontleed- en natuurkundig schrijver, deelt ons lezenswaardige waarnemingen mede.

Observations d'accouchemens recueillies à la salle des accouchées de l'hôpital civil de Strasbourg. Str. 1816. 8.
Remarques sur la critique de ses observations d'accouchemens. Paris, 1817. 8.

G. Bakker, hoogl. te Groningen, verzinnelijkt het be-
loop der verlossing, de verschillende plaatsingen van het
hoofd en de aanwending van instrumenten, door zijne
*Afbeelding van een vrouwelijk bekkenprofiel, benevens
twee beweegbare kinderhoofden*, fol. — *Descriptio
iconis pelvis femineae et schematum infantis etc.*
Gron. 1816. gr. fol.

1817. Gottlieb Salomon, geneesheer en lector in de vroed-
kunde te Leiden, schrijft een, grootendeels uit de werken
van Froriep en Siebold ontleend, echter ook veel eigen-
dommelijks bevattend

Handboek der Verloskunde, Amst. 1817. 2 deelen. 8.
met pl. tweede verm. verbet. druk, 1826. 2 deelen. 8.
met platen.

J. D. Busch, hoogleeraar te Marburg, geeft uit:
*Sammlung auserlesene Beobachtungen aus der techni-
schen Geburtshülfe.* Marburg, 1817. 4. met pl.

Andrew Blake schrijft:

*Aphorisms illustrating natural and difficult cases of ac-
couchement, uterine hemorrhage and puerperal peri-
tonitis.* Lond. 1817. 4.

1819. John Power, praktiseerend geneesheer en verloskundige
te Market Bosworth, (Leicestershire) in Engeland, een
verstandig waarnemer, tracht voornamelijk de oorzaken van

de pijnlijkheid der weeën op te sporen en weg te nemen, en schrijft eene belangrijke:

Treatise of midwifery; developping new principles which tend materially to lessen the sufferings of the patient and shorten the duration of labour. Lond. 1819. 8.

Jaar.

1820.

Ferdinand August Ritgen, regeringsraad en zeer verdienstelijk leeraar te Giesfen, schrijft:

Jahrbücher der Entbindungsanstalt zu Giessen. Giesfen, 1820. 2 Bde. fol. m. pl.

Die Anzeigen der mechanischen Hülfen bei Entbindungen, nebst Beschreibung einiger, in neueren Zeiten empfohlenen geburtshülflichen Operationen und einer verbesserten Geburtszange. Giesfen, 1820. 8. m. pl.

E. G. Carus, hoogleeraar te Dresden, schrijft een veelbevattend

Lehrbuch der Gynäkologie oder systematische Darstellung der Lehre von Erkenntniss und Behandlung der eigenthümlichen gesunden und kranken Zustände, sowohl nicht schwangerer, schwangerer und gebärender Frauen, als der Wöchnerinnen und neugeborenen Kinder. Leipz. 1820. 2ter Bd. 1821. 8. m. pl. 2te verm. u. verb. aufl. Leipz. 1828—29. 8.

Zur lehre von Schwangerschaft und Geburt, physiologische, pathologische und therapeutische Abhandlungen mit besonderer Hinsicht auf vergleichende Beobachtungen an Thieren, von Dr. E. G. C. Erste und zweite Abtheilung. Leipz. 1822 en 1824. 8. m. pl.

J. T. Conquest, geneesheer en verloskundige aan het city Lying-in-instituut te London, schrijft eene zeer middelmatige handleiding.

Outlines of midwifery, developping its principles and practice. Lond. 1820. kl. 8vo. met 12 (slechte) steendrukplaten.

1821.

John Ramsbottham, geneesheer en verloskundige bij het Lying-in-charity hospitaal te Londen, deelt de leerrijke slotsom zijner uitgebreide, echter volgens Engelsche grondstellingen verkregene ervaring mede.

Practical observations in midwifery with a selection of cases, by J. R. Londen, 1821. 8.

Madame *Lachapelle* (†1821.), eerste vroedvrouw bij het groote kraamvrouwengesticht te Parijs, maakt zeer belangrijke en leerzame waarnemingen bekend.

Pratique des accouchemens ou mémoires et observations choisies sur les points les plus importants de l'art, par Mad. L. publiés par A. DUGÉS. Vol. I. Paris, 1821. Vol. II en III. Paris, 1825. 8. In het Hoogd. vert. Weimar, 1825. 8.

Dr. *W. H. Busch*, hoogleeraar te Marburg, een voor de verloskunde zeer werkzaam man, geeft uit:

Einrichtung der geburtshülfflichen Klinik in der academischen Entbindungsanstalt zu Marburg. Marb. 1821. 8.

Geburtshülffliche Abhandlungen. Marb. 1826. 8.

Jaar. 1822. Toepassing van het borsthoortuig (de *auscultatie*) op de leer der zwangerheid.

Memoire sur l'auscultation appliquée a l'étude de la grossesse etc. par J. A. LEJUMEAU DE KERGADEDEC. Paris, 1822. 8. In het Hoogd. in FRORIEP's *Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde*. N°. 35 en 36, en uit dat tijdschrift afzonderlijk afgedrukt. Weimar, 1822. 8.

1822. *Joseph d'Outrepoint*, Medicinaalraad, hoogleeraar en bestuurder van het verloskundig instituut te Wurzburg, geeft zeer belangrijke verhandelingen uit.

Abhandlungen und Beiträge geburtshülfflichen Inhalts. Erster Theil. Würzburg, 1822. 8.

L. Mende, treedt als hoogleeraar en bestuurder van het koninklijk verloskundig instituut te Göttingen, in de plaats van *Fr. B. Oslander*, en betoont zich even onpartijdig als vooroordeelvrij in zijne

Beobachtungen und Bemerkungen aus der Geburtshülfe und gerichtlichen Medicin, nebst fortlaufenden Nachrichten über die Ereignisse der K. Entbindungsanstalt zu Göttingen. Eine Zeitschrift herausgegeben von

- Dr. L. MENDE *et c.* I. *Bdchen.* Gött. 1824. 8. m. pl.
 II. *Bdchen.* 1825. 8. met pl. III. *Bdch.* 1826. 8. m. pl.
- Jaar. 1824. William P. Dewees, hoogleeraar in de verloskunde te Philadelphia, levert een kennisvol en ervaringrijk werk.
- A compendious system of midwifery chiefly designed to facilitate the inquiries of those who may be pursuing this branch of study, illustrated by occasional cases, by W. P. D.* Philadelphia, 1824. 8. m. pl. *The third edition.* Philadelphia, 1828. 8. — Eene nadruk van hetzelfde werk. London, 1825. 8. m. pl.
- Treatise on the diseases of females, by W. E. DEWEES,* Philadelphia, 1827. 8.
1825. David D. Davis, leeraar in de verloskunde en praktiseerend verloskundige te Londen, geeft een, voor de kennis van den tegenwoordigen toestand der verloskunde in Engeland, belangrijk werk uit.
- Elements of operative midwifery; comprising a description of certain and improved powers for assisting difficult and dangerous labours; illustrated by plates: with cautionary strictures on the improper use of instruments. By D. D. D.* London, 1825. 4to. met 20 steendrukplaten in folio.
1826. Vereeniging van onderscheidene Duitsehe verloskundigen tot het uitgeyen van een
- Gemeinsamen Deutschen Zeitschrift für Geburtskunde.* Weimar, 1826—1830. 8. — Van dit tijdschrift, waarvan de redactie aan W. H. Busch, L. Mende en F. A. Ritgen is opgedragen, zijn tot nu toe vier deelen in het licht verschenen. Hetzelve bevat de nieuwste en belangrijkste verloskundige verhandelingen.
- Antoine Dugés, hoogleeraar te Montpellier, schrijft:
Manuel d'obstetrique ou précis de la science et de l'art des accouchemens; suivi de l'exposition des principales maladies des femmes et des enfans nouveau nés et

contenant un précis sur la saignée et la vaccination.
Montpellier, 1826. 8. — *Handboek der verloskunde*
enz. met platen. Brusfel, 1828. 8.

Ch. R. W. Wiedeman, leeraar in de verloskunde te
Kiel, levert een zeer doelmatig

Lesebuch für Hebammen, enthaltend geschichten von
schweren Geburten, und belehrende Gespräche darüber
nebst einen Schwangerschaftskalender etc. Kiel, 1826. 8.
tweede vermeerderde uitgave. 1827. 8.

Fr. Ludw. Meissner, hoogleeraar in de verloskunde aan
het polyklinisch instituut te Leipzig, schrijft een zeer nut-
tig en leerzaam overzicht der vorderingen, welke de ver-
loskundige wetenschappen in de negentiende eeuw gemaakt
hebben.

Forschungen der 19ten Jahrhunderts im Gebiete der Ge-
burthülfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten, I. Th.
onder den titel: *Was hat das 19ten Jahrhundert für die*
Geburthülfe gethan? van 1801—1825. — II. Th. onder den
titel: *Was hat das 19ten Jahrhundert für die Erkennt-*
niss und Heilung der Frauenzimmerkrankheiten gethan?
1801—1825. — III. Th. onder den titel: *Was hat das*
19ten Jahrhundert für die Erkenntniss und Heilung der
Kinderkrankheiten gethan? 1801—1825. Leipz. 1826. 8.

Jaar.
1827. *R. T. Hussian* en *Will. Maclure* leveren zeer doel-
matige verloskundige handboeken.

R. T. HUSSIAN, *Handbuch der Geburtshülfe. Nach den*
beste Werken und neuesten Grundsätzen mit vorzug-
licher Berücksichtigung der Boer'schen Erfahrungen
für angehende Geburtshelfer bearbeitet. II. Theile.
Wien, 1827. III. Theil. 1828. 8.

A manuel of midwifery for the use of young practitioners
of both sexes by *W. MACLURE*. Lond. 1827. 8.

Jules Hatin, verloskundige te Parijs, schrijft een kort,
weinig belangrijk werk over de tegennatuurlijke verlos-
singen.

La manoeuvre de tous les accouchemens contre nature , reduite a sa plus grande simplicité et précédés du mecanisme de l'accouchement naturel. Paris, 1827. 12.
Hodgd. *Tasschenbuch der Geburtshülfe , in allen schweren und naturwidrigen Fällen ,* vertaald door C. FITZLER. Ilmenau, 1828. 8. — *De behandeling der tegennatuurlijke verlossingen ,* uit het Fransch, door M. J. RUYCHAUER. Rott. 1830. 8.

Belangrijke bijdragen tot de verloskunde leverde *V. A. Riecke*, geneesheer en verloskundige te Wurtemberg.

Uebersicht der während der J. 1821—1825 vorgekommenen Geburten , nach den amtlichen Tagebüchern der sammtl. Geburtshelfer und Hebammen. Stuttgart, 1827. 8.

Jaar.
1828.

Nieuwe goede handboeken der verloskunde bezorgden *Ryan* en *Ashwell*.

A manual of midwifery ; or a summary of the science and art of obstetric medicine ; including the anatomy , physiology , pathology and therapeutics peculiar to females ; treatment of parturition , puerperal and infantile diseases and a exposition of obstetrico-legal medicine by MICH. RYAN. Lond. 1828. 8.

A practical treatise on parturition comprising the attendant circumstances and diseases of the pregnant and puerperal states , by SAM. ASHWELL. To which are appended papers, the one containing some remarks on abdominal surgery, the other on transfusion, presented by BLUNDELL. Lond. 1828. 8. met 13 pl.

Onderscheidene gewigtige, tot de verloskunde betrekking hebbende, afzonderlijke opstellen, waarnemingen en aanmerkingen vindt men in de vervolgwd wordende genees- en heelkundige journalen van *Hufeland*, (sedert 1795), *Horn*, (sedert 1801), *Marless*, *Rust*, *Graefe* en van *Walther*, *Textor*, in de geneeskundige jaarboeken der K. K. Oostenrijksche Staten, in de jaarboeken der verloskundige inrig-

tingen te Berlijn , Breslau , Dantzig , Halle , Göttingen , Keulen , Koningsbergen , Dresden , Heidelberg , Trier , in de tijdschriften van *Arti Salutiferae* , *vis unita fortior* , Hippocrates Magazijn , *Moll* en *Eldik's* practisch tijdschrift , *Logger's* enz. geneeskundige bijdragen en zeer vele anderen , alsmede in de door *Froriep* uitgegevene *Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde* ,

H E T BESCHOUWENDE GEDEELTE.

EERSTE AFDEELING.

Van de deelen der vrouw, welke bij de bevruchting, de zwangerheid, de verlossing en het kraambed het meest in aanmerking komen.

§. 20.

Tot deze deelen behooren *het bekken*, de buiten aan, en binnen in het bekken gevonden wordende *vrouwelijke teeldeelen* en de *borsten*.

EERSTE HOOFDDEEL.

VAN HET BEKKEN.

§. 21.

Het *versche bekken* wordt gevormd door eene verbinding van beenderen en zachte deelen, welke aan het onderste uiteinde van den zoogenoemden tronk van het ligchaam der vrouw eene holte vormen, die niet ongelijk is aan een gewoon bekken, en onmiddellijk op de dijebeenderen rust.

§. 22.

Wanneer men het *beenige* bekken zonder de zachte deelen beschouwt, dan bezit het wel eene geheel bijzondere gedaante en eigenaardige gesteldheid, maakt echter den volkomen grondslag van het versche bekken uit, en bepaalt de geheele gedaante daarvan.

I. *Van de beenderen des Bekkens.*

§. 23.

Het *beenige bekken* bestaat bij volwasfenen uit vier beenderen, twee ongenaamde beenderen (*ossa innominata*), het heiligbeen (*os sacrum*) en het stuit- of staartbeen (*os coccygis*). Bovendien moeten echter de twee laatste lendenen ook nog tot de beenderen des bekken gerekend worden.

§. 24.

Ieder der *ongenaamde beenderen* bestaat bij kinderen uit drie van een gescheiden beenstukken, welke afzonderlijke namen dragen. Naar aanleiding van deszelfs eerste wording en om aan de beschrijving van de deelen dezer beenderen meer juistheid te geven, wordt ieder ongenaamd been bij volwasfenen, waar men echter geen duidelijk spoor der vroegere vaneenscheiding meer vindt, nog in dezelfde drie beenderen verdeeld, te weten: in het *heup-* of *darmbeen*, het *zitbeen* en het *schaambeen*.

§. 25.

Het *heup-* of *darmbeen* (*os ilium*), dat grootendeels schuins ligt, is aan zijne binnenste en bovenste oppervlakte ligt uitgehold en heeft naar achteren eene ruwe,

met een dun kraakbeen bedekte geledingsvlakte, tot geleding met het heiligbeen, en naar beneden eene voorwaarts loopende gladde lijn, de ongenaamde lijn (*linea innominata*) genoemd. De bovenste rand of de kam (*crista ossis ilii*) begint van achteren met twee stompe doorns (*spina posterior superior et inferior*), vormt den knobbel (*tuberositas*), en eindigt in de twee stompe voorste doorns (*spina anterior superior et inferior*).

§. 26.

Het *zitbeen* (*os ischii*), dat het onderste en zijdelingsche gedeelte van het ongenaamde been uitmaakt, bestaat uit het ligchaam en twee takken; den nederdalenden (*ramus descendens*) en den opklimmenden tak (*ramus adscendens*). Aan den nederdalenden tak vindt men eene scherpe punt, den zitbeensdoorn (*spina ossis ischii*), en aan den opklimmenden tak den zitbeensknobbel (*tuberositas ossis ischii*), door welken de beide uitsnijdingen gevormd worden. (*)

§. 27.

Het *schaambeen* (*os pubis*) vormt het middenste en

(*) Deze uitsnijdingen worden weder verdeeld, in eene benedenste kleinere (*incisura ischiadica inferior*), die ter doorlating van den inwendigen stopspier (*obturator internus*) dient, en in eene bovenste grootere (*incisura ischiadica superior*), waardoor de zitbeens zenuw (*nervus ischiadicus*), de heupslagader (*arteria iliaca posterior*) en de zitbeens - slagader (*arteria ischiadica*) buiten het bekken treden. — De naad van vereeniging van het darm- en zitbeen loopt door de heupkom.

voorstede gedeelte van het ongenaamde been en bestaat uit twee takken. De boventak (*ramus horizontalis, superior, transversalis*) heeft bovenwaarts een eenigzins uitspringenden kam (*crista ossis pubis*), in welchen de ongenaamde lijn van het darmbeen overgaat, en die aan zijne uitwendige oppervlakte in een knobbelachtig uitsteeksel (*tuberculum*) uitloopt. De nederdalende tak (*ramus inferior, descendens*), die bovenwaarts breeder en benedenwaarts smaller is en met den opklimmenden tak van het zitbeen ineensmelt, heeft een eenigzins naar voren en buitenwaarts gekeerden rand, en door de nederdalende takken van de beide schaambeenderen wordt het bovenste gedeelte van den schaambeensboog (*arcus ossium pubis*) gevormd.

§. 28.

Door het zit- en schaambeen wordt het *eironde*, grootendeels door een vlies geslotene gat (*foramen magnum ovale*), en door alle drie de deelen van het ongenaamde been te zamen, de buitenwaarts gerigte gewrichtsholte voor het hoofd van het dijbeen, de heupkom (*acetabulum*) genoemd, gevormd.

§. 29.

Het bijna driehoekige *heiligbeen* is als eene wigge tusfchen de twee ongenaamde beenderen ingekneld en heeft bij volwassenen vier en een half duim lengte, drie en een half duim breedte, en van boven twee en een half duim dikte. Het is gewoonlijk uit vijf valsche wervelbeenderen tezamen gesteld, van welchen de bovenste een voorwaarts uitpuilenden dikken rand vormt, het voorgebergte (*promontorium ossis sacri*

sive angulus sacro-vertebralis) genoemd. Onder dezen rand begint de uitholling van de voorste vlakte van het heiligbeen, welke in het midden een half duim diep is, en ter wederzijde met vier of vijf ronde openingen voorzien is. Bovenwaarts vindt men de eenigzins schuins naar achteren loopende vlakte, ter vereeniging van den laatsten lendenwervel, beneden op de punt, de staartbeens-uitsteekfels (*eminentiae coccigeae, cornua sacralia*) genoemd, en de kleine geledingsvlakte voor het staartbeen, en ter wederzijde de kraakbeenige geledingsvlakte ter vereeniging met de ongenaamde beenderen.

§. 30.

Het kleine, slechts een duim lange, driehoekige, naar het benedeneinde puntig toeloopende *staartbeen*, bestaat gemeenlijk uit vier afzonderlijke beenstukjes, die door kraakbeen op eene beweegbare wijze met elkander vereenigd zijn, en waarvan het bovenste altijd grooter is dan het daarop volgende. Het is geplaatst aan de punt van het heiligbeen, en heeft aan den achterrand der gewrichtsvlakte twee opwaartslopende punten of hoornen (*cornua coccigea*). (*)

E. SANDIFORT, *Dissert. de pelvi*. Lugd. Bat. 1765. 4to.
Thesaurus dissertationum. Vol. III. p. 169.

C. C. CREVE, *vom Baue des weiblichen Beckens*. Leipz. 1794. 4to.

ALBINI, *Icones ossium foetus humani*. L. B. 1737. 4to.

J. C. LODER, *Tabulae anatomicae. Osteologia*. Tab. II. IV. en IX.

(*) Daar tot een volkomen bekken ook althans de

II. *Van de vereenigingen der beenderen van het bekken.*

§. 31.

Deze vereenigingen geschieden door banden en kraakbeenderen. De meestal zeer stevige vereeniging der ongenaamde beenderen met elkander, de *schaambeensvereeniging* (*synchondrosis sive symphysis ossium pubis*) wordt bewerkstelligd door kraakbeenige schijfjes en eene band- of vezelachtige zelfstandigheid, die den zoogenaamden boogswijzen band (*ligamentum arcuatum s. annulare*) en alsdus de welving van den schaambeensboog vormen.

A. BONN, *Verhandelingen van het Bataafsche Genootschap te Rotterdam*, D. III. 1777. pl. 2. 3. 4.

SCHWEIGHAUSER. *Archives etc.* 4me livraison. p. 180.

WILH. HUNTER, *in de medical observations and inquiries*. Vol. II.

laatste lendenwervel behoort, had FRORIEP, zoo als te regt door G. SALOMON gedaan is, denzelven hier moeten beschrijven als den achtersten wand van het bekken helpende uitmaken. Deze laatste lendenwervel rust met de beneden-vlakte van zijn, van voren platrond, en omtrent een en een kwart duim hoog ligchaam (*corpus vertebrae*) op de beschrevene (§. 29) bovenste vlakte van het heiligbeen, en is door middel van een tuschenliggend kraakbeen en banden, zoo als die der overige wervelbeenderen verbonden. Hij wijkt bij vrouwen meer achterwaarts dan bij mannen; van voren is hij merkelyk hoger dan van achteren. — Verg. G. SALOMON, *Handleiding tot de Verloskunde*, I. D. §. 39.

P. CAMPER, *de ligamentis, cartilaginibus, ossibus et musculis circa pelvim positis, eorumque affectibus in Demonstr. anat. path. Lib. II.*

§. 32.

Bij de eenigzins meer beweegbare *vereeniging van het darmbeen met het heiligbeen* (*symphysis sacroiliaca*) worden de kraakbeenige, ongelijke, maar in elkander vattende oppervlakten dezer beide beenderen door sterke peesachtige vezelen, en beneden- en voorwaarts nog door een beursband, verbonden. Tot deze vereeniging werken wijders nog mede de achterste lange en korte band des bekken (*ligamentum posticum longum en ligamentum posticum breve*) en de verspreide achterste banden (*ligamenta postica vaga*).

§. 31.

Het heiligbeen en staartbeen, als ook de bijzondere deelen van het laatste, worden door peesachtige vezels (*ligamentum ossis coccygis anticum et posticum*) vrij beweegbaar verbonden. — De vereeniging van het heiligbeen met den laatsten lendenwervel is slechts weinig bewegelijk, en wordt, behalve door de tusschenliggende kraakbeenige zelfstandigheid der wervelen, bevestigd door den voorsten, bovensten en ondersten band van het bekken (*ligamenta longitudinalia ossis coccygis*), welke ook nog de darm-heiligbeensvereeniging (§. 32.) versterkt.

§. 34.

Minder tot eigenlijke bevestiging der beenderen als wel tot vorming en voltooiing van het bekken en tot

aanhechting en steun der spieren, dienen de *band van Fallopius* (*ligamentum Fallopii s. Poupartii*) en de breede banden, die van den knobbel en doorn des zitbeens naar het heiligbeen gaan (*ligamenta tuberoso- en spinoso-sacra*). — De zeer beweegbare vereeniging van het hoofd der dijebeenderen met de heupkom geschiedt door het gewrichtsvlies (*membrana capsularis femoris*) en den ronden band (*ligamentum teres capitis femoris*).

J. WEITBRECHT, *Syndesmologia*. Tab. X. XVI. XVII. en XVIII.

J. C. LODER, *Tabulae anatomicae. Syndesmologia*. Tab. XXVI en XXVII.

III. *Van de holte des vrouwelijken bekken, deszelfs verdeeling, gedaante en ruimte.*

§. 35.

De beenderen en banden des bekken vormen gezamenlijk het eigenlijke bekken, welks inwendige ruimte (*cavum pelvis*) van boven wijder is dan van onderen, en zich ten aanzien der wijdde doorgaars eenigzins naar de grootte van het gansche ligchaam rigt. Men verdeelt de ruimte van het bekken in het *bovenste* of *groote* en in het *onderste* of *kleine* bekken. De grenslijn tusschen deze beiden, wordt door het *voorgebergte van het heiligbeen*, de *ongenaamde lijn* en door den *kam* van het schaambeen gevormd.

§. 36.

Het *bovenste* of *groote* bekken wordt van achteren door het laatste; voorwaarts uitspringende lenden-

wervelbeen, ter zijde door de schuins liggende darmbeenderen, en van voren, waar geene beenderen gevonden worden, door de Fallopijaansche banden en de zachtste deelen ingesloten. Het *onderste* of *kleine bekken* wordt van achteren door het heilig- en staartbeen, ter zijde door het zitbeen en van voren door het schaambeen bepaald.

§. 37.

Tot eene meer naauwkeurige bepaling van vele bijzonderheden, vooral bij het verloskundig onderzoek, verdeelt men het *onderste* of *kleine bekken* 1) in de *bovenste opening, engte, of ingang* (*apertura pelvis superior sive abdominalis s. introitus pelvis*), die de grenzen tusschen het bovenste en onderste bekken bepaalt, en de gedaante van een afgerond, meer breed dan lang, en aan het voorbergte van het heiligbeen uitgesneden kaartenhart bezit (*Pl. I. afb. 1.*). 2) In de tusschenruimte of het *midden des bekkens* (*apertura pelvis media*) hetwelk men aanneemt ter hoogte van de vereeniging van den tweeden en derden valschen wervel van het heiligbeen en het onderste gedeelte van de schaambeensvereeniging, waar het bekken eene langwerpige ronde (*elliptische*) gedaante heeft (*Pl. I. afb. 2.*), doch hetgene eigenlijk de gansche ruimte of wijidte tusschen den ingang en den uitgang bevat; en 3) in den *uitgang, benedenste, onderste engte* of *bilnaadsopening* (*apertura pelvis inferior. s. a. perinealis s. exitus pelvis*), die door de punt van het staartbeen, de dieper staande zitbeensknobbels en den boog der schaambeenderen bepaald wordt, en het meeste met eene ter

zijde ingebogene hartenfiguur overeenkomt (*Pl. I. afb. 3.*), welke echter, bij het terugwijken van het staartbeen, de gedaante van een (achterwaarts wijder wordend) eirond nadert. — (*)

§. 38.

Om de wijde van de bekkenruimte in de verschillende openingen des bekkens te bepalen, trekt men uit eene punt van de eene zijde, die zoo ver mogelijk van het midden des bekken verwijderd is, regte lijnen in verschillende rigtingen naar hetzelfde tegenovergestelde punt der andere zijde, en meet op deze wijze den onderlingen afstand van de zijden des bekkens. Men noemt deze maat van den afstand der beenderen des bekkens van elkander *afmeting*, *doormeter* (*diameter*), en heeft die tot een zeker getal gebragt, waarvan de kennis bijzonder gewigtig is. De grootte dezer afmetingen of doormeters is, volgens den bij de metingen gebezigten maatstaf, zeer verschillende, gelijk men die ook in verschillende welgemaakte bekkens, vooral bij personen van onderscheidene statuur, zelden van volkomen gelijke grootte vindt, hoezeer zij altijd in bepaalde verhoudingen tot

(*) Men stelt zich de beenderen van het bekken, hetzij in verband of afzonderlijk, ook voor, als verschillende afhellende vlakten vertoonende, eene voorstelling, die voorzeker groote nuttigheid heeft. Men leze daarover G. SALOMON, t. a. pl. §. 48—50 en aldaar aangehaalde schrijvers; alsmede A. E. V. SIEBOLD, *Lehrbuch der theoretischen Entbindungskunst*, §. 69. en E. V. SIEBOLD, *Lucina*, III. Bl. I. St. S. 13. f.

elkander staan. Wij hebben hier de gemiddelde verhouding van de gedane metingen opgegeven. (*)

§. 39.

In het *grootte* of *bovenste bekken*, trekt men zich slechts eene (*dwarfe*) *doorsnede* of *afmeting*, welke den afstand van de beide voorbovenste doornen van den kam der darmbeenderen van elkanderen aanwijst: zij bedraagt omtrent negen of negen en een halve duimen der oude Parijsche maat.

§. 40.

Om zich echter de grootte van het *kleine bekken* juist te kunnen voorstellen, moet men verschillende afmetingen of middellijnen daarvan kennen, en wel in den *ingang* 1) de *kleine rechte* of *voorste afmeting* (*diameter recta conjugata*) of (dewijl men zich de bovenste opening van het bekken als een langwerpig rond (*ellips*) voorstelt, wier kleinste doormeter in de meetkunst *distantia conjugata* genoemd wordt,) de *conjugata*, (*Pl. I. afb. 1. N^o. 1—2*) die zich van het voorgebergte van het heiligbeen (1) tot aan den

(*) Over de belangrijkheid eener naauwkeurige kennis van de verschillende afmetingen der holligheid van het bekken, de redenen waarom de schrijvers zoozeer verschillen in de opgave der uitkomsten hunner gedane metingen, en de wijze hoe men deze metingen moet bewerkstelligen, ten einde volkomene overeenstemming te bevorderen, leze men de *Aanmerkingen over de metingen van het vrouwelijke bekken* van den hoogleeraar G. BAKKER, in het *Geneeskundig Magazijn van STIPRIAAN LUISCIUS, ONTYD en MACQUELYN*, IV. D. III. St. bl. 93—102, Leid. 1807. 8.

bovenrand van de schaambeensvereeniging (2) uittrekt, en vier duim lang is; deze afmeting staat van achteren hooger dan de overigen; 2) de *groote* of *dwarfe afmeting* (*diameter transversa*) (*Pl. I. afb. 1. N^o. 3—4.*) die van het midden der ongenaamde lijn des darmbeens van de eene zijde tot op dezelfde plaats der andere zijde vijf duimen lengte heeft; 3) de twee *schuinsche* of zoögenaamde van *Deventersche afmetingen* (*diameter obliqua*) (*Pl. I. afb. 1. N^o. 5—6.*) loopende van de vereeniging van het darm- en heiligbeen aan de eene zijde (5) tot aan de vereeniging van het darm- en schaambeen (6) der andere zijde, vier en een halven duim lengte hebbende. (*)

§. 41.

In het midden of in de tusschenwijdte des bekkens

(*) In de bepaling der punten, waaruit de schuinsche diameter moet getrokken worden, verschillen de verloskundigen. Zij trekken dezelve of uit de *junctiona sacro-iliaca* of uit de daarnevens liggende uitholling van den darmbeensrand, en strekken dezelve uit tot zeer verschillende punten tusschen de voorzijde van het eironde gat en het midden der heupkom. Het gevolg hiervan is dat, wanneer de dwarsche diameter (gelijk gemeenlijk geschiedt) getrokken wordt, tusschen de het verst van malkander verwijderde afstanden van den darmbeensrand, de schuinsche middellijnen elkander zullen kruisen op verschillende vrij onbepaalde punten, doch meest altijd tusschen de dwarsche middellijn en het middelpunt der regte. BAUDELOCQUE, *l'art des accouchemens*, T. I. 5. ed. p. 45. pl. 2. laat de schuinsche diameter vallen tusschen het middenpunt van de regte en dat der dwarsche, FRORIEP brengt ze achter het middenpunt

zijn twee afmetingen voldoende (*) 1) de *groote, regte of voorste afmeting* (Pl. I. afb. 2. N°. 1. 2.), die van de vereeniging des tweeden en derden valschen wervels van het heiligbeen (1) tot over den achtersten rand van den schaambeensboog (2) loopt, en vier en een half tot vier en drie kwart duim lang is; 2) de *kleine of dwarse afmeting* der bekkenholte (Pl. I. afb. 2. N°. 3—4.) van het achter-onderste gedeelte van den bodem der heupkom der eene tot op den zelfden plaats der andere zijde, vier tot vier en een kwart duim lang. De afstand van het eene doornuitwas van het zitbeen tot het andere bedraagt gewoonlijk een kwart duim minder.

van beiden. Om naauwkeurig te werk te gaan, komt het mij het best voor, om de beide schuinsche diameters wederzijds te beginnen van de heiligdarmbeensche vereeniging, en zoo naar voren te trekken, dat zij de regte afmeting snijden met een hoek van 60° , en in dit snijpunt ook te doen vallen de dwarse afmeting.

(*) Offchoon de schrijver in de twee benedenste bekkenholten geene schuinsche doormeters aanneemt, zoo kan echter het aannemen derzelven in sommige gevallen van veel belang zijn, vooral wanneer bij eene mindere uitholling van het heiligbeen, bij een te kleinen hoek van den schaambeensboog, en in alle gevallen, waarin de regte doormeter verkleind wordt, de natuur of kunst van de schuinsche middellijnen gebruik maken kan ter voleinding der geboorte. OSIANDER en SIEBOLD nemen ook de schuinsche doormeter in het midden des bekkens, en STEIN, BAUDELLOCQUE, BUSCH, SALOMON, KNEBEL en anderen ook tevens in den uitgang des bekkens aan.

§. 42.

Ook in de *benedenste engte* of den *uitgang* (*apertura pelvis inferior*) heeft men slechts twee afmetingen noodig: 1) *de regte, groote of voorste afmeting* (*Pl. I. afb. 3. N^o. 1. 2.*) van de punt van het staartbeen (1) tot aan den schaambeensboog (2); deze heeft drie en een kwart tot drie en een half duim lengte, kan echter door het achteruitwijken van het staartbeen tot een halven, twee derden, ja zelfs een geheelen duim verlengd worden; 2) *de dwarse of kleine afmeting* (*Pl. I. afb. 3. N^o. 3. 4.*) van den zitbeensknobbel der eene zijde tot dezelfde plaats der andere zijde, vier duim lengte uitmakende.

§. 43.

In den ingang gaat derhalve de groote afmeting van de eene naar de andere zijde, doch in het middendeel en in den uitgang van voren naar achteren. Voor het onderzoek van eene levende vrouw is ook de kennis van den afstand van den onderste rand des schaambeens tot aan het voorgebergte of meest uitspringende punt des heiligbeens van zeer veel gewigt. Deze afstand bedraagt vier en een half duim, en kan de voorste schuinsche of hellende afmeting (*conjugata diagonalis*) van het kleine bekken genoemd worden. De diepte of hoogte van het geheele bekken is verschillend, naar de meerdere of mindere helling der darmbeenderen, bedraagt echter gewoonlijk van zeven tot zeven en een halven duim. De diepte van het kleine bekken rigt zich naar de hoogte des zitbeens, doch is *van achteren* meestal vier en een half tot vijf

duim, *ter zijde* drie en een half tot vier duim, *van voren* een en een half duim. De hoogte van de schaambeensboog, die een hoek van negentig graden maakt, bedraagt twee duim. De afstand van den voor-boven-doorn van den kam des darmbeens van den zitbeensknobbel, bedraagt iets meer dan zes duim. De afstand van de voorste vlakke van de schaambeensvereeniging is zeven duim van de achterste vlakke van het heiligbeen, genomen onder het graatachtig uitwas van den laatsten lendenwervel. Voor de jaren der huwbaarheid echter verschillen de ruimte-verhoudingen van het vrouwelijke bekken geheel van de hier gedane opgave.

J. W. GITTERMAN, *über das Verhältniss der Conjugata der oberen Apertur zu der Diagonal-conjugata des weiblichen Beckens*. v. SIEBOLD's Journal. II Bds. I St.

G. C. CREVE, *vom Baue etc.*

J. C. FR. KOEPPE, *praes. KRAUSE, de pelvi foeminea metiendi*. Lips. 1781. 4.

FRORIEP, *über das Pelviarium von Papier maché*. Weimar, 1802. p. 3.

P. CAMPER, *voor MAURICEAU's, Tractaat van de ziekten der zwangere vrouwen*. Amst. 1759. bl. 3 volgg.

Reflexionen über das weiblichen Becken in geburtshülflicher beziehung von E. V. SIEBOLD, Lucina III Bd, 1. 2. 3. St. Leipz. 1806. 8.

IV. *Van de assen des bekkens,*

§. 44.

De leer van de bekkenas, die door sommige verloskundigen te onregte als van weinig belang beschouwd wordt, is voor de theorie en de praktijk even

gewichtig, in zoo verre dezelve ons namelijk met de helling des bekkens, met de rigting der krachten, welke de natuur bij de geboorte volgt, en met den weg dien het kind en vooral deszelfs hoofd in het beenige hol van het bekken doorloopt, bekend maakt. Derzelve kennis is tot verklaring van vele verschijnselen en tot de juiste aanwending van vele handgrepen, volstrekt noodig.

§. 45.

Door as verstaat men eene *regte* (of ten opzichte van het bekken ook wel eene *kromme*) *lijn*, welke loopt door de middelpunten van al de lagen eens lichaams (of van eene holte) die met deszelfs grondvlakte (of eene daarvoor aangenomene vlakte) evenwijdig zijn. (*) Men noemt de as ook *middellijn*, of, naar de rigting, die zij heeft, *verticale* of *perpendiculaire*, (regtstandige of loodlijnige,) of ook *horizontale as* of *lijn*.

§. 46.

Wat aangaat de geschiedenis der gevoelens omtrent de plaatsing, helling en rigting van het bekken, blijkt het, dat terwijl men zich vroeger niet over de rigting en helling des bekkens bekreund had, HENDRIK VAN DEVENTER wel het eerst op het denkbeeld eener bekkenas gekomen is, de aandacht op het gewigt der zaak gevestigd en zijne meening daaromtrent bekend gemaakt heeft; doch J. MULLER was de eerste, die

(*) Eigenlijk is de as eene regte lijn, welke door twee tegen elkander overstaande punten en door het middelpunt van een ligchaam getrokken wordt, en waarop de lijnen rusten, waardoor men zich het ligchaam beweegbaar voorstelt.

tot voorstelling van zijn gevoelen, aangaande de helling des bekken, van de as gebruik heeft gemaakt, en de helling van den ingang des bekken met juistheid opgaf. ROEDERER was de eerste, die de meting van den hoek der helling van den uitgang des bekken op levenden aanwendde; LEVRET de eerste die de helling van den ingang bepaaldelijk opgaf, en ter opheldering zijner voorstelling van den loop der bekkenholte drie assen aannam; P. CAMPER de eerste, die ter aanwijzing van de kromming der bekkenholte een cirkelboog door dezelve trok. MATTH. SAXTORPH en JENS BANG hebben drie, van die van LEVRET verschillende assen gesteld, en BANG heeft de helling van de beide openingen met meer naauwkeurigheid bepaald, dan allen die voor en na hem dit onderwerp behandeld hebben, behalven NAEGELE, die vooral in den jongsten tijd aan dit onderwerp eenen bijzonderen arbeid toewijdde en de meest voldoende uitkomsten verkreeg. (•)

(*) *Das weibliche Becken betrachtet in Beziehung auf seine Stellung und die Richtung seiner Höhle, nebst Beiträgen zur Geschichte der Lehre von den Becken-axen, von FR. C. NAEGELE etc.* met 3 steendrukplaten. Carlsruhe, 1825. 4. Deze schrijver heeft in dit werk over de leer der bekkenas alles bijeenverzameld, wat door zijne voorgangers over dit onderwerp geschreven is. — De metingen van NAEGELE bevestigen JOS. AB. STOLTZ, *Considerations sur quelques points de l'art des accouchemens.* Strasb. 1826. 4. en F. A. RITGEN in zijne belangrijke verhandeling in het *Gemeinzame Deutsche Zeitschrift für Geburtskunde.* II. Bd. 2. Stück. — Over de helling des bekken is onlangs even uitvoerig gehandeld, door IGN. SCHWOERER, *De situ pelvis in ventre, curaque ejus directione specilegium et lucubrationes.* Triburgi, 1828. 4. maj.

§. 47.

Het bekken vormt geen regt, maar een gebogen of cylindervormig kanaal, (en men kan zeggen dat het eigenlijk uit twee cylinders bestaat, die in het midden des bekkens onder een stompen hoek vereenigd zijn) welks bovenste opening met den gezigtseinder in eene geheel andere verhouding staat dan de onderste. LEVRET dwaalde, met de as des bekkens alleen te bepalen naar het vlak van de bovenste schuinsche afsnijding van den cylinder des bekkens, die immers met de onderste in het geheel niet evenwijdig loopt; even zoo dwaalde ook ROEDERER, die de as des bekkens naar het onderste schuinsche afsnijdingsvlak van den cylinder des bekkens bepaalde, zonder te bedenken, dat het onderste vlak niet met het bovenste overeenstemt.

§. 48.

Als de slotsom van het onderzoek en de metingen, welke NAEGELE betrekkelijk dit onderwerp in het werk gesteld heeft, mag men vaststellen, dat men voor de helling der bovenste opening tusfchen de 59° en 60° moet aannemen, (LEVRET had 35° aangenomen), zoodat de meest uitstekende spits van het heiligbeen $3''$, $9'''$ — $10'''$ hooger staat dan de bovenste rand van de schaambeensvereeniging, dat wijders een hoek van tusfchen 10° en 11° (ROEDERER had 18° gesteld) de gemiddelde helling van de regte doormeter van den uitgang des bekkens zij, en dat alzoo de punt van het staartbeen zeven tot acht lijnen hooger staat dan het toppunt van den schaambeensboog.

§. 49.

Wanneer nu het denkbeeldig vlak der bovenste opening met den gezigtseinder een hoek van 59° , en het denkbeeldig vlak der onderste opening met den gezigtseinder een hoek van 11° maakt, dan wijkt het vlak der bovenste opening meer dan vijfmaal zoo veel van den gezigtseinder af, dan het onderste. Deelt men nu de beide vlakken door regthoekig daarop geplaatste loodlijnen, dan moeten ook deze deelingslijnen in hare rigting van elkander afwijken.

§. 50.

Dewijl de beide denkbeeldige vlakken van de bovenste en onderste opening niet evenwijdig met elkander loopen, en de deelingslijnen welke rechte hoeken met denzelven maken, in eene verschillende rigting gaan, zoo moet de deelingslijn van het vlak der bovenste opening met de vertikale of loodlijn van het vrouwelijke ligchaam in eene geheel andere verhouding staan dan de deelingslijn van het vlak der onderste opening.

§. 51.

De deelingslijnen der denkbeeldige schuinsche vlakken der bovenste en onderste bekkenopening verhouden zich echter even zoo tot de vertikale of loodlijn van het vrouwelijk ligchaam als de schuinsche vlakken zich tot den gezigtseinder verhouden. De deelingslijn van het vlak der bovenste opening wijkt daarom nagenoeg 59° en die der onderste opening nagenoeg 11° van den loodlijn van het vrouwelijke ligchaam af.

§. 52.

Deze beide deelingslijnen moeten als de asfen van het bekken beschouwd worden, die elkander in het midden des bekkens onder eenen stompen hoek ontmoeten. Stelt men zich deze asfen als naar boven verlengd voor, dan kan men daaruit vele gevolgen afleiden. Overigens valt in de bovenste as ook de middellijn der baarmoeder, en in de onderste as, die door het achteruitwijken van het staartbeen eenigzins verplaatst worden kan, de middellijn der uitgezette scheede, als men bij de laatste de verschuiving, die door den endeldarm in de ligging der scheede teweeg gebracht wordt, niet in aanmerking neemt.

G. F. JOERG, *brevis partus humani historia. Spec. I.*
Lipsiae 1805. p. 22.

§. 53.

Om zich de gegevene verklaring der asfen juist voor te stellen, beschouwe men (*Pl. I. afb. 9.*) de lijn $a-b$ als eene horizontale lijn; vervolgens trekke men de lijn $c-d$, als het vlak der onderste, en de lijn $e-d$, als het vlak der bovenste bekkenopening; men houde i voor de schaambeensvereening en den boog z voor de holte des heiligbeens; nu trekke men bij o eene loodlijn $f-g$ door het midden der lijn $e-d$, en dan heeft men de bovenste as; dan trekke men bij x eene loodlijn $h-g$ door de lijn $c-d$, en dan heeft men de onderste as, die bij g de bovenste onder een stompen hoek doorsnijdt. Trekt men nu nog door de punten o , g en x eene kromme lijn $y-z$, dan heeft

men ten naastenbij de middellijn van het gansche kleine bekken, die men ook de *rigtingslijn* * genoemd heeft.

* GREVE, t. a, pl. bl. 92.

FRORIEP, *Ueber das Pelviarium von Papier maché*.
Weimar, 1802. 8. S. 7.

§. 54.

Het hoofd en de hals van den knokkel des dijebeens wijken, onder een stompen hoek van 120° van zijn ligchaam af, En wanneer men zich de assen of middellijnen van het hoofd en den hals van beide de knokkels der dijebeenderen (wier groote draaijers (*trochanteres majores*) gewoonlijk omstreeks dertien duim van elkander zijn verwijderd, en alzoo een besluit ten aanzien van den afstand der beide heupkommen toelaten), verlengd voorstelt, dan doorsnijden zij elkander voor het voorgebergte van het heiligbeen met eenen hoek van 100° .

P. CAMPER, *Betrachtungen ueber einige Gegenstände der Geburtshülfe*. Leipz. 1777. 8. MAURICEAU, *ziekten der zwangere vrouwen*. Inleiding bl. 4 enz.

C. C. CREVE, t. a. pl.

SIEBOLD, *Lehrbuch der theor. Entbindungskunde*, S. 38.

JOERG, *brevis partus humani historia*. Spec. I. p. 22.

G. BACKER, *Descriptio iconis pelvis foemineae etc.* Gron. 1816. fol.

Geburtshülfsliche Demonstrationen; Erste Lieferung, zweite Tafel.

V. *Van het verschil van het vrouwen-
en mannenbekken.*

§. 55.

Tot het zevende jaar bespeurt men geheel geene, en tot op de jaren der huwbaarheid slechts geringe verscheidenheden van het bekken bij beide geslachten. Met en na de jaren der huwbaarheid echter vindt men, bij een opmerkzaam onderzoek, vele veranderingen aan het vrouwelijke bekken.

§. 56.

De *beenderen* van het vrouwenbekken dragen in het algemeen de kenmerken van het vrouwelijke geslacht, dat is, zij zijn dunner, hebben minder diepe kuilen en minder sterke verhevenheden, dan die van het mannenbekken.

§. 57.

De *darmbeenderen* zijn breeder, vlakker en meer buitenwaarts gelegen, de *zitbeenderen* dalen minder naar beneden, en de *schaambeensvereening* is breeder en niet zoo sterk binnenwaarts gebogen. De *schaambeensboog* van het vrouwenbekken is veel ruimer dan die van het mannenbekken, en vormt bij het laatste slechts eenen hoek van zeventig, ten hoogste van tachtig graden, ook is de rand van de *schaambeensboog* zeer verschillend. Het heiligbeen is breeder, zijne uitholling meer gelijkvormig gebogen en zijn voorgebergte maakt met het laatste lendenwervelbeen een hoek, die scherper is, dan bij het mannenbekken.

Het *geheele vrouwenbekken*, dat verder van de borstholte verwijderd ligt, is breeder, minder rond, lager en ruimer, de heupkommen staan verder van elkander, eenigzins meer voorwaarts naar de eironde gaten, en de onderlinge vereenigingen van de beenderen van het bekken zijn minder stevig dan die van het mannenbekken (*). Na de jaren der vruchtbaarheid gaan deze eigenaardigheden van het vrouwenbekken langzamerhand verloren, en het bekken der vrouw wordt aan dat des mans meer of minder gelijkvormig.

C. C. CREVE, t. a. pl. bl. 62 volg.

S. TH. SOEMMERING, *tabulae sceleti foeminini*. Frankf. 1797. fol. m. pl.

(*) Men zoude hier nog meerdere punten van verschil tusfchen het vrouwen- en mannenbekken kunnen opsommen, b. v. dat het mannenbekken, hoewel kleiner, evenwel toch bijna een kwart zwaarder is dan het vrouwenbekken, dat bij mannen de fchaambeensbogen dikker en regter, het heiligbeen door zijne mindere buiging korter, de fchouders breeder dan het bekken, bij vrouwen daarentegen de fchouders fmaller dan het bekken zijn, dat de heupkommen bij de mannen meer op zijde, bij de vrouwen meer naar voren staan, dat bij vrouwen de zitbeenderen minder dik en meer zijdwaarts geplaatst zijn, de fchaambeensvereeniging zachter en korter, de nederdalende takken der fchaambeensbogen teederder en meer voorwaarts uitgebogen zijn, enz. Verg. AUTENRIETH, in J. CH. REIL'S *Archiv. für die Physiologie*, Halle 1795—1814. VII Band. p. 88 etc. Het verschil tusfchen het mannen- en vrouwengeraamte, vindt men naauwkeurig befchreven bij E. VON SIEBOLD, *Handboek over de kennis en genezing der ziekten van het vrouwelijk geflacht*, I. Stuk. bl. 6—30.

VI. *Van de gebreken van het
vrouwelijke bekken.*

§. 59.

Elke aanmerkelijke afwijking van het regelmatig maakfel der bijzondere beenderen, van de voorheen beschrevene gedaante, wijdte, de opgegevene afmetingen, asien, en van de helling des bekkens, is een *gebrek des bekkens*, wier nadeelige gevolgen zich bij de zwangerheid of de verlossing altijd meer of minder openbaren kunnen.

§. 60.

Wat de *darmbeenderen* betreft, zoo kan (zoo wel van een als van beide derzelven) de binnen-bovenste oppervlakte te smal, te breed, te vlak, te diep uitgehold, en, van hare regelmatige rigting afwijkende, loodregt of horizontaal zijn. Aan de *zitbeenderen* zijn somtijds de knobbels te dik, te diep of te weinig afdalende, somwijlen ook te veel naar voren of naar achteren gerigt. Aan het *schaambeen* zijn dikwijls de horizontale takken te weinig buitenwaarts uitgebogen, de schaambeensvereening is te lang, en heeft, in plaats van eene beneden-binnenwaartsche, dikwijls veel meer eene loodregte of geheel beneden-buitenwaard-sche rigting; de nederdalende takken maken geen *schaambeensboog*, maar een hoek of de boog is ten minste naauwer, dan hij zijn moest.

§. 61.

Het *heiligbeen* kan te vlak of te hol, te breed, scheef, op de eene zijde hooger dan op de andere

zijn, en het voorgebergte, bij zijne vereeniging met den laatsten *lendenwervel* te veel of te weinig vooruitspringen, en te hoog of te diep staan. — Het *staartbeen* staat somwijlen scheef, is te lang of vlak, of te veel gebogen, zonder overigens vele of groote nadeelen toe te brengen. — Van meer belang is de verandering van de plaatfing der heupkommen. (*)

§. 62.

De gebreken van de vereenigingen der beenderen bestaan: 1) in onregelmatige vastheid; daartoe behoort de vrij menigvuldige vergroeiing of verftijving (*an-chylosis*) van de heilig- en staartbeensvereeniging, de meer zeldzame verftijving van de vereeniging des darmbeens met het heiligbeen, en die van de fchaambeensvereeniging, welke het zeldzaamst voorkomt, en ook de minfte nadeelige gevolgen verwekt; 2) in onregelmatige beweegbaarheid, b. v. gedurende de zwangerheid; wanneer er geene zeer groote rekbaarheid van de krankbeenige verbinding bestaat, dan is zij zoo weinig tot nadeel, dat zij zelfs door eenige ontleed- en verloskundigen als voordeelig en noodzakelijk beschouwd wordt. Is de beweegbaarheid

(*) De meeste der hier en in de vorige § opgegevene afwijkingen werken nadeelig door het verkleinen der afmetingen, en alzoo door den doorgang van het kind te beletten. — Te breede en te vlakke darmbeenderen geven aanleiding tot scheeve overhelling der baarmoeder; zijn zij te smal of te diep, dan wordt aan de baarmoeder de behoorlijke ruimte ontnomen.

echter te sterk, dan maakt zij het bekken blijkbaar gebrekkig, en heeft ongunstige gevolgen. — Bovendien kan de schaambeensvereeniging geheel ontbreken. (*)

CREVE, *von der Krankheit. des weiblichen Beckens*. S. 128.

Tab. X. Deze schrijver bezit het éénige voorbeeld eener *anchylosis symphysis ossium pubis*.

HUXHAMI, *Opera physico-medica curante G. CH. REICHEL*, Tom. III. p. 3 seqq.

§. 63.

De gebreken van het gansche bekken bestaan in te groote naauwheid, buitengemeene wijde, of in ongelijke hoogte, en eene daaruit voortkomende afwijkende scheeve rigting, of wanstaltigheid van hetzelfde. De aanleidende oorzaken daarvan zijn: *verschillende ziekten die de beenderen week maken*, (b. v. *Engelsche ziekte, jicht, scheurbuik, venusziekte, waaruit beenzwellingen en beenspekgezwellen (exostoses et osteostomatata) ontstaan kunnen, die de ruimte des bekken meer of minder vernauwen*); *de te vroege inspanning van jonge, zwakke kinderen, om te staan en te*

(*) Belangrijk zijn over dit onderwerp de *verhandeling over het maaksel en de beweegbare loswording der beenvereenigingen van het bekken*, door A. BONN; in de *Verh. van het Bat. Genootsch. te Rotterdam*, 1777. III. D. bl. 251—287. BOYER, *sur les maladies des os*. Tom. II. en deszelfs *Traité des maladies chirurgicales*. Tom. IV. p. 553. RICHERAND, *Nosographie chirurgicale*. Tom. III. d. 223. edit. 4. — CALLISEN, *systema chirurgiae hodiernae*. Tom. II. p. 699. edit. 1800.

gaan, het veel zitten van jonge personen op harde banken, vallen en slagen op het heiligbeen en staartbeen, het sterke inrijgen van den onderbuik en van het bekken, ontwrichting van het hoofd des dijbeens, beenbreuken en ruwe, ongeschikte verloskundige hulp. (*)

§. 64.

De vernaauwing des bekkens kan in verschillende deelen van hetzelfde plaats hebben. Is het *bovenste bekken* te naauw, dan heeft dit gewoonlijk alleen invloed op de zwangerheid. De *ingang van het kleine bekken* is 1. van voren, of van achteren, of van voren en van achteren tevens, zamengedrukt, waarbij voornamelijk de *conjugata* lijdt, die dikwijls tot zelfs minder dan een halven duim kan verkleind worden; 2) onder velerlei gedaanten aan eene zijde of aan beide zijden tevens meer of min zamengedrukt, waardoor dan de *dwarfe* en ook wel de *schuinsche afmetingen* verkort worden.

§. 65.

De *bekkenholte* kan van voren en van achteren of ter zijde zamengedrukt zijn. In het eerste geval lijdt de *regte*, in het tweede de *dwarfe afmeting van de bekkenholte*, (als de bodem der heupkom naar binnen gedrukt is, dan lijdt zij in eene rigting, die overeenstemt met de *schuinsche afmeting van den ingang*.) Even

(*) De uitwerking dezer onderscheidene gebreken op het bekken en deszelfs afmetingen vindt men goed ontwikkeld bij N. C. DE FREMERY, *de mutation. figurae pelvis, praesertim iis quae ex ossium mollitione oriuntur*. L. B. 1793. 1. Zie ook BAUDELOCQUE, I. D. Pl. IV en V.

gelijk de bekkenholte, kan ook de *uitgang* van het kleine bekken vernaauwd zijn, waarbij dan *zoo wel de regte als de dwarse afmeting van den uitgang* verkort worden. De vernaauwing door beengezwellen kan in alle openingen des bekkens en in alle rigtingen plaats hebben. (De gedaante van het vernaauwde bekken geeft zeer duidelijk te kennen, of de ziekte die de beengezwellen heeft te weeg gebragt, *voor of na* de ontwikkeling der huwbaarheid plaats had. Bij de vernaauwing van het bekken *voor* de huwbaarheid, en alzoo door Engelsche ziekte, vindt men namelijk doorgaans het bekken in de *conjugata* der bovenste opening verkleind, *de dwarse afmeting van dezelve groot en de onderste opening ruim*; het heiligbeen is daarbij *te weinig* gebogen, en de schaambeensboog *wijder* dan gewoonlijk. Bij het *na* de huwbaarheid verkleinde bekken (gemeenlijk door weekwording der beenderen) is de *conjugata* niet veel verkleind, het bekken in de bovenste en onderste opening naauw, en altijd ter wederzijde tezamengedrukt: de *schaambeenderen* zijn *snavelvormig* vooruitgedrongen, het *heiligbeen* is *buitengewoon toegebogen* en de *schaambeensboog* is *zeer naauw*, zoodat dikwijls de zitbeensknobbels dicht bij elkander staan. B)

BUSCH, *Geburtshülfliche Abhandlungen*, S. 168. ff.

§. 66.

De *te groote wijde* betreft of het gansche bekken of deszelfs bijzondere openingen. Is het bekken in eene opening verwijld, dan is het doorgaans in de andere vernaauwd. Bij voorbeeld: *te groote wijde* van den ingang is meestal met vernaauwing van den uit-

gang, de te groote wijdte der bekkenholte niet zelden met vernaauwing van de bovenste en onderste bekkenopeningen, en verwijding van den uitgang somwijlen met vernaauwing des ingangs verbonden. (*)

§. 67.

Aanmerkelijke afwijkingen van de opgegevene regelmatigige helling, vooral van die der bovenste bekkenopening, moeten ook tot de gebreken van het vrouwelijke bekken gerekend worden. De helling kan of vermeerderd of verminderd zijn, zoodat de as der bovenste bekkenopening *meer of minder dan vijfenvijftig graden* van de loodlijn van het ligchaam der vrouw afwijkt: de gevolgen van het laatste gebrek zijn bijna nog ongunstiger, dan die van het eerste. Zoo kan er ook door algemeene scheefheid van het bekken eene zijdelingsche helling plaats hebben. (†)

(*) De nadeelen van een te groot bekken zijn: 1^o te groote helling van de baarmoeder, dezelve vindt geen steun op de darmbeenderen; 2^o de geheele indaling van den baarmoeder, waardoor de blaas, endeldarm, zenuwen en vaten te veel gedrukt worden; 3^o overhelling der baarmoeder naar de eene of andere zijde; en vooral 4^o de te groote snelheid der geboorte, de vrucht geen tegenstand vindende, schiet neder, beledigt de nageboorte, en scheurt de navelstreng af. Zie OSIANDER, *Handbuch der Entbindungskunst*. Tubing. 1820. Th. I. §. 173.

(*) De te groote vooroverhelling van het bekken veroorzaakt te groote drukking der baarmoeder op de buikspieren, met nadeelige gevolgen voor de ligging der vrucht en moeilijke intreding derzelve in het kleine bekken, onregelmatige weeën, enz; de helling naar de zijde veroorzaakt

C. C. CREVE, *von den Krankheit. des weiblichen Beckens*, met pl. Berlin, 1776. 4.

JOH. HENR. JOERDENS, *Diss. de vitiis pelvis muliebris etc.* Erlangen, 1789. 8.

N. C. DE FREMERY, t. a. pl.

E. SANDIFORT, *de pelvi ejusque in partu dilatatione*, L. B. 1763.

VII. *Van de zachte deelen, welke binnen en buiten het bekken gevonden worden, met uitzondering van de teeldeelen.*

§. 68.

De volgende spieren komen bij de zwangerheid en de verlossing voornamelijk in aanmerking, en sommige derzelven hebben ook aandeel aan de samenstelling van het bekken. Het *middenrif* (*diaphragma*), de *buitenste en binnenste schuinsche buikspieren* (*m. obliqui externi et interni*), de *dwarfe* (*m. transversi*), en *regte buikspieren* (*m. recti*) welke, in juiste evenredigheid gevormd, in hun middendeel door de peesvliesachtige *witte lijn* (*linea alba*), die den *navel* (*umbilicus*) bevat en ondersteunt, gescheiden en verbonden zijn, en de *piramidale spieren* (*m. pira-*

eene schuinsche ligging der baarmoeder; de te geringe helling maakt dat de ingewanden der buik en de baarmoeder te zeer drukken op het onderste gedeelte van het bekken, waaruit te spoedige verlossing ontstaan kan; tevens ontstaat door afwijkingen van de regelmatige helling des bekkens drukking der vrucht op de zenuwen en bloedvaten aan de eene of andere zijde, waaruit zwelling, kramp, verdoving enz. voortkomen.

midales); achter en zijdwaarts aan het bovenste bekken liggen nog de *groote* (*psaos magnus*) en dikwijls ook de *kleine lendenspier* (*psaos parvus*), welke den ingang des bekken (§. 37.) en deszelfs dwarse afmeting helpen vormen, de *inwendige darmbeenspieren* (*m. iliaci interni*) en de *vierhoekige lendenspier* (*m. quadratus lumborum*).

§. 69.

Tot de vorming van den bodem van het kleine bekken helpen de *uitwendige dwarse spier van den bilnaad* (*musc. transvers. perinaei superficialis*), de *inwendige dwarse spier van den bilnaad* (*musc. transv. perin. profundus*); verder de *buitenste en binnenste sluitspier van den aars* (*m. sphincter ani externus et internus*), de *opligters van den aars* (*m. levatores ani*), de *spieren van het staartbeen* (*m. coccygei*), en eindelijk nog de *opligter van den kittelaar* (*m. ischio-cavernosus*), de *vernaauwer van de scheede* (*sphincter vaginac*), de *inwendige stopspier* (*obturator internus*) en eenige andere spieren, die de dije bewegen en vooral dezelve naar buiten draaijen of afvoeren.

J. C. LODER, *Tab. anatomicae. Myologia. Tab. XXVI XXIX.*

§. 70.

In het bekken ligt, vlak achter de schaambeenderen, de *pisblaas*, die uit verschillende vliezen bestaat en zeer rekbaar is, wier achterste vlakke door de van boven komende *pisleiders*, in eene schuinsche rigting

doorboord wordt, en welke eindigt in den *pisweg*, die onder den schaambeensboog door naar voren dringt.

L. F. VON FRORIEP, *ueber die Lage der Eingeweide im Becken*. Weimar, 1815. fig. 1.

§. 71.

Geheel achter in het bekken, digt aan de voorste oppervlakte van het heiligbeen (en naar de uitholling daarvan gebogen) loopt de *endeldarm*, die zich van links-bovenwaarts naar het midden en benedenwaarts begeeft, en zich digt onder het staartbeen in den *aars* (*anus*) opent. (*)

LODER, *Tab. anat. Tab. LXIII. LXIV. LXXV. et LXXIX.*

(*) De blaas en endeldarm hebben grooten invloed op de zwangerheid en verlossing. De blaas kan door volheid de zwangere baarmoeder, vooral in de eerste maanden terugdrukken, en den bodem der baarmoeder klemmen tusschen het promontorium. Door de drukking der baarmoeder wordt de ligging der blaas veranderd, en over de schaambeenderen gebragt, waardoor eene grootere kromming der pisbuis ontstaat, en men alsdan ter ontlasting der pis de mannen- (door de grootere kromming) in plaats van de vrouwen-pisontlaster moet gebruiken. De endeldarm met drekstoffen gevuld, vertraagt de nederdaling van het kind, en verkleint de schuinsche afmeting aan de linkerzijde van achteren. Ook bij het onderzoek van de *retroversio uteri* en de herstelling daarvan, is de kennis van den endeldarm van zeer veel belang.

§. 72.

Het bekken en de daarin bevatte deelen ontvangen hunne slagaderen 1) uit de *aorta* of groote slagader, namelijk de *inwendige zaadslagader* (*arteria spermatica*), welke zich voornamelijk in de eijerstokken, de trompetten van *Fallopius*, en bovenwaarts in de zijdedeelen van de baarmoeder verdeelt; en de onderste *darmscheils-slagader* (*arteria mesenterica inferior* voor den endeldarm), 2) uit de eigenlijke slagaderen van het bekken of onderbuiksslagaderen (*arteriae hypogastricae*), die hare takken geven aan de blaas, de scheede, de baarmoeder, den endeldarm, en ook takken aan en door de bekkenwanden afzenden. (*)

J. C. LODER, *Tabulae anatomicae Angiologia. Tab. CIII. CIV. et CV.*

ROSENMÜLLER, *chirurgisch - anatomische Abbildungen. III. Th. Tab. 2. N^o. 7 en N^o. 3. (9, 10, 11, 12.) enz.*

§. 73.

De *aderen* der in het bekken bevatte deelen komen te zamen 1) in de *inwendige zaadader* (*vena spermatica interna*), die zich in de onderste holle ader (*vena cava inferior*) of in de nierenader (*vena renalis*) ontlast; 2) in de onderbuiksader (*vena hypo-*

(*) Uit den loop en oorsprong dezer vaten verklaart men onderscheidene ziekten en toevallen gedurende de zwangerheid en verlossing, als: waterzuchtige zwelling der teeldeelen met uitzetting der aderen, beving, verdooving, pijnlijk gevoel in de ledematen en in den omtrek van het bekken zelve.

gastrica), welke zich ook door de darmbeensader (*vena iliatica*) in de onderste holle ader uitstort; 3) de aderen van den endeldarm (*venae intestini recti*) storten hun bloed ook uit in de onderste darm-scheilsader (*vena meseraica inferior*); en zoo door de miltader in de poortader.

J. C. A. MAYER, *Beschreibung der Blutgefäße*. Berlin, 1788. met pl.

LODER, *Tab. anat. Tab. CXXII. CXXIV et CXXV.*

ROSENMULLER, t. a. pl. Plaat II. N°. 23. N°. 19.

§. 74.

De *watervaten* der in het bekken bevatte deelen, vereenigen zich 1) in de *onderbuiksvlecht* (*plexus hypogastricus*), en 2) in de *zaadvlecht* (*plexus spermaticus*), welke beide door de *lendenvlecht* (*plexus lumbalis*) in de *borstbuis* (*ductus thoracicus*) komen.

J. C. LODER, *Tabulae anatomicae. Angiologia. Vasa absorbentia. Tab. CXXXVIII.*

§. 75.

De *zenuwen*, welke zich in het bekken verspreiden, zijn: 1) de *groote medelijdende zenuw* (*nervus sympathicus*), welke met de inwendige zaadslagaderen naar de eijerstokken en de baarmoeder gaat; en 2) de *lendenzenuwen* (*nervi lumbares*), en de daaruit voortkomende *dijezenuw* (*nervus cruralis*), en de *heiligbeenszenuwen* (*nervi sacrales*), die voornamelijk naar de uitwendige teeldeelen en de scheede gaan.

G. WALTER, *Tabulae nervorum thoracis et abdominis*. Berolini, 1788. fol.

J. LEON. FISCHER, *descriptio anatomica nervorum lumbalium, sacralium, etc.* c. tab. Lips. 1791. fol.

G. F. HILDEBRANDT, *Lehrbuch der Anatomie der Menschen*, 3. Aufl. Braunsch. 1803—1804. 4 Bde. 8.

S. T. SOEMMERING, *Vom Baue des menschlichen Körpers*. Frankf. a. M. 1791—96. 5 Bde. gr 8vo. — *De corporis humani fabrica*. 1794—1800. 6 Tomi. gr. 8vo.

J. C. LODER, *Tab. anatomicae. Neurologia. Tab. CLXIX ad CLXXV.*

ROSENMÜLLER, t. a. p.

TWEEDE HOOFDDEEL.

VAN DE UITWENDIGE TEELDEELEN.

§. 76.

Hiertoe behoort de geheele schaambeensstreek, met alle deelen, die men zonder de aanwending van het ontleedkundig mes uitwendig kan waarnemen; en wel de *buitensle en binnensle* (de groote en kleine) *schaamlippen*, de *kittelaar*, de *opening der scheede* (*introitus vaginae*) het *maagdenvlies* (*hymen*) en de *bilnaad*.

§. 77.

De geheele schaamstreek is na de jaren der huwbaarheid, met korte krullende haren bezet, en heeft, voor de schaambeensvereëning, ter plaatse waar de onderbuik ophoudt, eene verhevenheid, door een met vet gevuld kussen gevormd, en *venusheuvel* (*mons veneris*) genoemd. De geheele ligging van de schaam-

streek is bij lange groote personen meer voorwaarts gerigt, bij kleine dikke personen meer benedenwaarts tusfchen de dijen geplaatst, en hangt hoofdzakelijk van de helling des bekkens af.

§. 78.

De zeer rekbare *buitenſte*, *uitwendige* of *groote ſchaamlippen* (*labia pudendorum majora*) beginnen, vlak onder den venusheuvel, als een paar vaste, veel vet bevattende, met celwijsweeffel opgevulde vaatrijke huidplooijen. Zij puilen meer of minder naar voren uit, en fluiten in den volkomen maagdelijken ſtaat meestal vast aan elkander, en gaan, benedenwaarts altijd dunner wordende, tot aan den bilnaad, waar zij door het vliesachtige *toompje* (*frenulum*) aan elkander verbonden zijn. Op hare inwendige oppervlakte zijn zij zeer zacht en hoogrood van kleur, en tusfchen dezelve bevindt zich de *ſchaamspleet* (*rima pudendorum*), die verſchillend van grootte is.

§. 79.

De *binnenſte*, *inwendige* of *kleine ſchaamlippen* (*labia pudendorum minora*) (waterlippen of nymphae) zijn inſgelijks twee huidplooijen, en eigenlijk ſlechts een inwendig verlengfel van de huid die de uitwendige ſchaamlippen vormt, en daar nog zachter en rooder is. Meestal liggen zij achter de uitwendige ſchaamlippen verborgen, ſomwijlen echter dringen zij ook tusfchen dezelve door, en dan zien zij er meestal vuilachtig bruin uit. Bovenwaarts, waar men aan dezelve vele ſmeerklieren vindt, eindigen zij ieder in twee punten, van welke de eene in den eikel van den

kittelaar overgaat, en de andere de voorhuid daarvan helpt vormen; van onderen verliezen zij zich in de uitwendige schaamlippen.

NEUBAUER, *de triplici nympharum ordine*. Jena, 1784.
Recus. in ejusdem operibus.

§. 80.

Onder de bovenste vereeniging der binnenste schaamlippen ligt de *eikel van den kittelaar* (*glans clitoris*) welks maakfel met dat der mannelijke roede overeenkomt, en even als deze, met twee sponsachtige lichamen (*corpora cavernosa*) is voorzien, maar door geene pisbuis doorboordt wordt. Deze eikel van den kittelaar is zeer klein, een vijfde tot een kwart duim lang, één en een half lijn dik, en met vele smeerklie-ren voorzien, en schijnt het voornaamste werktuig van den wellust bij de vrouw te zijn.

§. 81.

Tusschen de binnenste schaamlippen vindt men de, met vele slijmklie-ren voorziene *opening* of *ingang van de scheede* (*introitus vaginae*), boven welke, digt onder den schaamboog en een kwart duim onder den kittelaar, de kleine *opening van den pisbuis* (*orificium urethrae*) ligt, die door een meer of min dikken rand omgeven is, welke eenigzins verheven, dikwijls met plooijen bezet en zeer gevoelig is. (*)

(*) Eene naauwkeurige kennis der pisbuisopening is voor den verloskundige tot het inbrengen van den catheder van het hoogste belang. Bij ongehuwden is dezelve naauw, bij gehuwden meer geopend. In de zwangerheid en voer-

§. 82.

In den maagdelijken staat is de ingang der scheede grootendeels gesloten door een klapvlies, *maagdenvlies* (*hymen*) genaamd, dat schuins van onder naar boven gaat, van onderen en ter zijde vastgegroeid is, en met zijnen doorgaans halvemaanswijzen vrijen rand, slechts eene geringe opening overlaat. Wordt het maagdenvlies door den bijslaap verbroken, dan ontstaan daardoor aan den ingang der scheede drie of vier kleine ronde uitpuilende verhevenheden, *myrtheheuveltjes* (*carunculac myrtiformes*) genaamd. Vlak achter het toompje bemerkt men, als men de lippen van één scheidt, vóór het maagdenvlies eene kleine langwerpige verdieping, de *schuitvormige holligheid* (*fossa navicularis*) genaamd. (*)

J. J. HUBER, *de vaginae uteri structura nec non de hymene*. Goett. 1742.

J. G. TOLLBERG, *de varietate hymenum*. Hal. 1791. 4.

F. B. OSIANDER'S *Denkwürdigkeiten für die Heilkunde*. 2ten Band ites Stück.

namelijk onder en ook nog eenigen tijd na de verlossing, is dezelve moeilijk te vinden, en als het ware meer naar binnen in de scheede getrokken. Dit wordt veroorzaakt door de veranderde plaatsing der pisbuis zelve, waardoor het inbrengen der catheder in de blaas somtijds zeer moeilijk wordt.

(*) Het maagdenvlies, dat ook wel eene cirkelvormige gedaante heeft, is niet altijd een zeker bewijs van den maagdom. Deszelfs aanwezigheid bewijst even min het aanwezen der moreele, als deszelfs afwezigheid den verloren physique maagdom bewijst, zoo dat de geregtelijke arts

§. 83.

De tusschenruimte, die tusschen het toompje en de opening van den regten darm ligt, en door de huid, het daaronder liggend vet, en eenige spieren (§. 60.) wordt ingenomen, noemt men den *bilnaad* (*perinaeum* s. *interfoemineum*); waarvan de breedte, dikte en rekbaarheid zeer verschillend is, en welke door de groote der schaamspleet bepaald worden.

J. G. WALTERS *Betrachtungen über die Geburtstheile des weiblichen Geschlechts*. Berlin, 1776. 1793. gr. 4to. met platen.

Van de gebreken der uitwendige teeldeelen.

§ 84.

De uitwendige schaamlippen zijn somtijds geheel of gedeeltelijk toegegroeid (*atresia labiorum*); of men vindt dezelve op velerlei wijze wanstaltig, te klein, zuchtig, ontstoken en in verzwering; of zij strekken tot zitplaats aan een slagader- of adergezwel, of aan eene liesbreuk. (*)

hier in zijne oordeelvelling de grootste voorzigtigheid moet in acht nemen. Vergel. L. J. C. MENDE, *Commentatio anatomica de hymene s. valvula vaginali; cum tabula aenea*. Goett. 1827.

(*) Gelijk de balzak der mannen wel eens gespleten is, zoo zijn ook bij de vrouwen de schaamlippen wel eens aangegegroeid. Dit laatste gebrek is of aangeboren of ontstaat als gevolg van voorafgegane ontveeling, gebrek aan zuiverheid, scherpen witten vloed enz. Zie SANNIÉ in *Holl. Maatsch.* te Haarl. 1760. V. Deel. bl. 424—437.

§. 85.

Aan de inwendige schaamlippen heeft men somtijds dezelfde gebreken waargenomen, die hier dan ook even nadeelig zijn, als wanneer zij aan de uitwendige schaamlippen voorkomen. Eene verkeerde rigting van den pisweg en van zijne opening, alsmede de gebreken van den kittelaar, kunnen ook vele onaangename gevolgen verwekken.

§. 86.

Zeer gewigtig zijn ook nog 1) de gebreken van het maagdenvlies, dat geheel toegegroeid, vast, eeltachtig, verbeend (?) zijn, eene dubbelde opening vormen, of ook, zonder dat dit voor de verlossing van eenig belang is, geheel ontbreken kan; 2) de gebreken van

D. V. p. 424-437. G. MULDER, *Diss. de atresia*. Gron. 1763. A. DE HAEN, *Rat. medendi*. L. B. 1768. Tom. III. Cap. VIII. B. S. ALBINUS, *Academic. Annot.* Leid. 1774. 4. Lib. IV. G. R. BÖHMER, *de naturalibus foeminarum clausis*. Wittb. 1768. 4. RUST, *Magaz. d. ges. Heilk.* Berl. 1826. Band XV. Heft 2. s. 339. B. XVII. Heft 2. B. XXI. St. I. VILLAUME, in *Revue medicale ou Journal de l'hôtel Dieu*. Par. 1826. Tom. II. Juillet. SCHMITT, *Heidelb. klin. Annalen*. I. Bd. IV. Heft. s. 573. RICHEER'S *Chir. Bibliothek*. I Bd. s. 86. BRENNARD in HEMPEL in *Lond. med. repository*, 1824 en 1828. Mai. FRORIEP'S *Notizen*. Bd. XVIII. N°. 6. GUILLEMOT, *Journal universel des sciences medicales*. Paris, 1828. Janv. — SIEBOLD'S *Journ. f. Geb.* I Bd. 3. St. s. 475. MOLL en EDIK'S *Tijdschrift enz.* I. Jaarg. 2. St. bl. 156. II. Jaarg. 2. St. bl. 166. III. Jaarg. 4. St. bl. 375. IV. Jaarg. 2. St. bl. 167. V. Jaarg. 4. St. bl. 337—350, en meer anderen.

den bilnaad , die of veel te breed is , en daardoor de schaamspleet zeer vernaauwt , of veel te smal , of ten gevolge van ruwe ongeschikte hulp bij vroegere verlosfingen ingescheurd en geheel verscheurd , of ontstoken , met wratten² bezet , koudvurig en zeer geneigd tot openscheuring zijn kan.

OSIANDER'S *Denkwürdigkeiten* en TOLLBERG'S *Dissert.*

MATTH. BAILLIE, *the morbid anatomy of some of the most important parts of the human body.* Lond. 1793.

M. B., *Anatomie des krankhaften Baues , etc.* A. d. Engl. mit züsätzen von SOEMMERING , Berlin , 1794. 8.

Anh. zu M. B. *Anatomie d. krankh. Baues.* N. d. 5n. Originalausgabe von K. HOHNBAUM , u. m. neuen Anmerk. von S. T. SOEMMERING. Berl. 1820. gr. 8.

C. K. CONRADI'S *Handbuch der pathologischen Anatomie* , Hannover , 1796. 8

F. G. VOIGTEL'S *Handbuch der pathologischen Anatomie* , 3 Theile. Halle , 1804—1805. 8.

KNEBEL'S *Grundriss zu einer Zeichenlehre etc.* p. 280.

BENDER , *de partium genitalium feminearum deformationibus , quae sterilitatem efficiunt.* Berol. 1827. 8.

DERDE HOOFDDEEL.

VAN DE INWENDIGE TEELDEELEN.

§. 87.

Hieronder worden begrepen : de *scheede* (*vagina uteri*) , de *baarmoeder* (*uterus*) , de *trompetten* of *buizen van Fallopius* (*tubae Fallopianae*) en de *eijerflokken* (*ovaria*).

I. *Van de Scheede.*

§. 88.

Deze is eene zeer rekbare vliezige buis, gelegen in de holte van het kleine bekken; zij stijgt achter den pisweg en de blaas, en voor den endeldarm, met welke deelen zij vast verbonden is, in eene bogtige rigting opwaarts. Zij is van boven wijder dan van onderen, en omgeeft, van achteren wat hooger dan van voren, den hals der baarmoeder, met haar bovenste gedeelte, dat het *gewelf der scheede* (*laquear vaginae*) wordt genoemd.

§. 89.

Offchoon de holligheid der scheede rond of eigenlijk eirond is, zoo neemt men toch, tot eene meer naauwkeurige plaatsbepaling, in haar een voorsten en achtersten wand en twee zijwanden aan, wier hoogte van de hoogte of diepte van het bekken (§. 43.) zelve afhangt. De scheede is bij maagden naauwelijks een duim wijd.

§. 90.

Het inwendige vlies is van vele bloedvaten en zenuwen voorzien, zacht en gevoelig, en opdat het eene groote rekbaarheid zou bezitten, vol rimpels, die *vooral aan den voorsten* en achtersten wand zeer zichtbaar zijn, en benedenwaarts verhevene vleeschheuveltjes, doch in het midden geschaarde, dikwijls zeer verhevene rijen van dergelijke rimpels (*columnae rugarum carneo-papillosarum*) vormen. In de

plooijen dezer rimpels, voornamelijk aan den ingang der scheede, openen zich eene menigte slijmbeursjes, die de deelen glibberig houden. (*)

LODER, *Tab. anatomic. Tab. LXXIX.* fig. 1.

§. 91.

Voor aan den ingang der scheede, ligt 1) de haar omringende, willekeurig beweegbare *vernaauwende spier der scheede* (*constrictor vaginae*), die van onderen breeder dan van boven, en eigenlijk een vervolg is van de fluitspier van den aars; 2) eene netvormige vlecht (*plexus retiformis*), die dezen ingang bijna geheel omgeeft, een duim breed, eenige lijnen dik, en niet ongelijk is aan de sponsachtige lichamen (§. 80).

HUBER, *de vaginae uteri structura etc.*

§. 92.

Stelt men zich het onderste gedeelte van de niet uitgezette scheede als een regten cylinder voor, dan maakt hare middellijn of as met de as van de bovenste opening des bekken (§. 52.) bijna een regten hoek; bij eene meer sterke uitzetting der scheede echter, waarbij haar doormeter tot op vier duim vergroot kan worden, vertoont zij zich als eene gebogene buis, wier middellijn bijna geheel met de middellijn van de

(*) Deze slijmbeursjes tuschen de rimpels zijn zeer moeilijk te ontdekken. HALLER heeft in deszelfs uitmondingen slechts één maal een borstel kunnen inbrengen. *Elementa physiologiae* Tom. VII. sect. 28.

holte van het bekken, en van onderen met de as van de onderste opening des bekkens (§. 52.) overeenkomt.

ROSENMULLER, *chir. anatom. Abbildungen*. III. Theil. Tab. 2.

§. 93.

De scheede is aan velerleie gewigtige gebreken onderworpen. Zij kan *te lang, te kort, geheel niet aanwezig, dubbel, ontstoken*, en daardoor *vernaauwd en toegegroeid, verhard* en door *velerlei zweren aangetast* of ook *verscheurd* zijn. De afscheiding der slijmbeurfen kan *ziekelyk vermeerderd (fluor albus)* en *ontaard* zijn. Men neemt verder *slagader- en adergezwellen, polypen* en *uitzakkingen* van een gedeelte of van de geheele scheede waar, (*prolapsus vaginae partialis s. totalis*), die dan ligtelyk aanleiding tot *scheedebreuken (herniae vaginales)* kunnen geven.

BAILLY en SOEMERING, t. a. pl.

RICHTER'S *Anfangsgrunde der Wundarzneykunst*, 1ster Theil.

MORGAGNI, *De sedibus et causis morborum*, Ep. 46—47.

F. G. VOIGTEL, *Fragmenta semiologiae obstetriciae*. Hal. 1790. p. 50.

KNEBEL'S *Versuch einer Zeichenlehre etc.* p. 238—296.

P. A. BOEHMER, *obs. anat. rarior. fasc. II*. Hal. 1756.

EISENMANN, *Tabulae anatomicae quatuor uteri duplicis observationem rariorem sistentes*. Argent. 1752. fol.

P. F. MECKEL'S *Journal für anatomische Varietäten etc.* Halle, 1805.

Van de Baarmoeder.

§. 94.

Het belangrijkste van al de inwendige teeldeelen is de *baarmoeder (uterus)*. Hare gedaante is bij het kind nog cylindervormig; in den huwbaren, maagdelijken staat is zij gelijkvormig aan eene kleine platgedrukte flesch, waarvan de achterste wand meer gewelfd is dan de voorste, en waarvan de bodem naar boven en de punt naar beneden is gerigt; en, nadat zij in de zwangerheid op velerlei wijze veranderd is, wordt zij na de verlossing bijna peervormig, tot dat zij, als de jaren der vruchtbaarheid voorbijgegaan zijn, op nieuws aan de gedaante, die zij voor de huwbaarheid had, zeer nabij komt, en in den hoogen ouderdom zoo aanmerkelijk verandert, dat haar bovenste en onderste gedeelte, door de toegroeijing van den inwendigen baarmoedermond, vaneen gescheiden worden, en er twee verschillende holten, achter en boven elkander, in dezelve bestaan.

Dr. MAYER, (Hoogl. te Bonn) *Beschreibung einer graviditas interstitialis uteri, nebst Beobachtungen über die merkwürdigen Veränderungen, welche die weiblichen Genitalien und namentlich der Uterus im hohen Alter erleiden*, m.pl. Bonn, 1825. 4.

§. 95.

Men verdeelt de baarmoeder 1) in het bovenste gedeelte, den *bodem (fundus uteri)*, 2) in het *ligchaam* of *middendeel (corpus uteri)*, 3) in het onderste gedeelte, den *hals (collum s. cervix uteri)*,

dien men ook, voor zoo verre hij in de scheede afdaalt en door het scheedegewelf omgeven is, het *scheedegedeelte* (*portio vaginalis*) noemt.

§. 96.

De lengte van de geheele baarmoeder in den maagdenlijken staat bedraagt van voren twee en een half duim, van achteren slechts twee en een kwart duim; de breedte bedraagt op het breedste van het ligchaam der baarmoeder één en een half duim; de dikte van voren naar achteren acht tot tien lijnen. De lengte van den hals der baarmoeder is één duim, en zijne dikte bedraagt zes tot acht lijnen. Wanneer er reeds eenmaal zwangerheid heeft plaats gehad, dan neemt de baarmoeder deszelfs voormaligen geringen omvang niet eerder weder aan, dan in den hoogen ouderdom.

OSIANDER, *Denkwürdigkeiten für die Heilkunde etc.*
1 Bdes. 2tes Stuck.

§. 97.

Wordt de baarmoeder van haren bodem tot haren hals in de breedte opengesneden, dan ziet men in haar ligchaam de *holte der baarmoeder* (*cavum uteri*), van eene driehoekige gedaante, met binnenwaarts gebogen beenen, wiens twee bovenste hoeken, ter zijde van den grondslag des driehoeks, de naauwe openingen van de *buizen van Fallopius* vormen, en wiens onderste hoek in den hollen hals overgaat.

§. 98.

In de kindschheid zijn de wanden van de holte der baarmoeder door eene zachte, eenigzins vlokkige stof

overtogen, die van hare zelfstandigheid niet kan worden afgescheiden, en met vele plooijen bezet; ook liggen zij dan zoo dicht op elkander, dat zij slechts door de slijm, die zich daar tusfchen bevindt, vaneen gefcheiden worden. Nadat de huwbaarheid begonnen is, verdwijnen de plooijen in de holte grootendeels, doch de wanden blijven altijd nog zeer nabij elkander, en verwijderen zich slechts ten tijde der maandftonden, of bij en na de bevruchting.

§. 99.

De holle hals der baarmoeder vormt een kanaal, (*canalis cervicis*), dat omtrent elf lijnen lang, en in het midden wijder is dan van boven en onderen, waarin zich vele kleine slijmblaasjes (*ovula Nabothi*) en vele plooijen bevinden, die men, uithoofde van hare takvormige uitbreiding, den levensboom (*palmae plicatae*) genoemd heeft. (*)

§. 100.

De plaats, waar het kanaal van den hals in de holte van het ligchaam der baarmoeder overgaat, wordt de *inwendige mond der baarmoeder* (*orificium uteri internum*) genoemd, en de plaats, waar dit

(*) Deze blaasjes, door NABOTH eitjes genoemd, verschillen zeer in grootte, zitten nu eens op de oppervlakte, dan eens half ingedoken, of hangen ook wel aan een kort steeltje. Voor den staat der huwbaarheid worden zij niet gevonden, zij zijn bij oude vrouwen droog, na de huwbaarheid veelal met een helder vocht gevuld. Derzelver nut is onbekend, en zij ontbreken ook dikwijls geheel.

kanaal zich aan het einde van het scheidedeel in de scheede opent, heet de *uitwendige baarmoedermond* (*orificium uteri externum*). Wanneer men zonder eenige bepaling van den baarmoedermond spreekt, dan verstaat men daardoor altijd den uitwendige, die, na eenmaal plaats gehad hebbende zwangerheid, gewoonlijk ook wijder blijft, dan de inwendige. (*)

§. 101.

Het onderste gedeelte van het scheidedeel eindigt in twee lippen (*labium orificii uterini anterius et posterius*), waarvan de voorste dikker en twee lijnen langer is, dan de achterste. Beide de lippen zijn uitgezet, dikker dan het vlak boven haar liggend gedeelte des scheidedeels, en hebben den uitwendigen baarmoedermond tusfchen zich als eene *dwarfsche spleet* (*rima orificii uterini transversalis*), welke op de zijden twee hoeken (*angulus orificii uterini dexter et sinister*) vormt. Daar het onderste gedeelte van het scheidedeel, op het gevoel, overeenkomst heeft met den snuit van sommige dieren, zoo noemt men dit ook wel *zeeltenmond*, *zeeltenbekje* (*os tincae*).

§. 102.

De witachtige zelfstandigheid van de baarmoeder is in den bodem het dikst (vijf lijnen), maar ook het weekst; in het ligchaam is zij minder dik (vier lijnen) maar digter van weeffel, en in den mond, waar zij

(*) In den zwangeren staat wordt de hals allengs korter, de in- en uitwendige mond komen zamen, en het *orificium internum* is niet te bespeuren.

het allerdigst en bijna kraakbeenachtig is, heeft zij de minste dikte. Zij doet zich, bij hare ontwikkeling tijdens de zwangerheid, voor als een zonderling weefsel van vleeschvezelen, slagaderen, aderen zonder klapvliesen, zeer vele watervaten en zenuwen. — De *spiervezelen* der baarmoeder, die door de meeste ontleed- en verloskundigen *aangenomen* * worden, zijn echter in den jongsten tijd door velen *verworpen* ** en nu onlangs (als men door dien naam de eigenaardigheid dezer spiervezelen wil aanduiden) zeer regelmatig voor *half spieren* *** verklaard. (*)

* GERM. AZZOGUIDI, *observationes ad uteri constructionem pertinentes*. Bonon. 1773. Lugd. Bat. 1788. 4.

J. C. LODER, resp. HAUENSCHILD, *de structura uteri musculara*. Jenae, 1784. 4.

F. G. U. MAYER praes. TITIO, *de uteri structura etc.* Viteb. 1795. 4.

O. FRID. ROSENBERGER, *de viribus partum efficientibus etc.* Hal. 1791.

LUDW. CALZA, *über den Mechanismus der Schwangerschaft*. Uit de *Atti del l'Accademia di Padova* vertaald

(*) Behalve de hier door FRORIEP aangehaalde schrijvers, zou men er nog kunnen bijvoegen, dat voornamelijk METZGER, RICHTER, SOEMMERING en BLUMENBACH (in zijne *Grondbeginselen der Natuurkunde van den mensch*, vierde druk. §. 547. Amst. 1830.) het aanwezen van spiervezelen in de baarmoeder ontkennen; terwijl VESALIUS, RUISCH, SANTORINUS, MORGAGNE, MALPIGHI, FABER, HEISTER, DIEMERBROEK, CALDANUS, NOORDWYK, HALLER, PLENK, ROEDERER, HUNTER, MECKEL, STEIN, WRISSBERG, HILDEBRAND en anderen dezelve aannemen. MECKEL en CALZA hebben naar mijne gedachte het pleit beflist.

door WEIGEL, en REIL'S en AUTENRIETH'S *Archiv. für die Physiologie*, VII. B. S. 342.

CARUS, *Lehrbuch der Gynaekologie*, I. Th. §. 31.

** J. G. WALTER'S *de morbis peritonei et vasis uteri*. 1787.

WEISSE *praes.* BOEHMER, *de structura uteri non muscosa sed celluloso-vasculosa*. Viteb. 1784.

G. H. RIBKE, *über die structur der Gebärmutter*. Berl. 1793.

*** J. H. FERD. AUTENRIETH, *Handbuch der empirischen menschlichen Physiologie*. Iter Band. Tübing 1801. S. 88.

J. LOBSTEIN, *fragment d'anatomie physiologique sur l'organisation de la matrice dans l'espece humaine*. Paris. an IX. 1803.

§. 103.

De baarmoeder ligt in het bovenste gedeelte van het kleine bekken, achter de met dezelve te zamen hangende pisblaas (wier verandering in omvang, even als de veranderde houding van den romp, altijd eene meer of minder merkbare verandering in de ligging der baarmoeder te weeg brengt) en voor den endeldarm, die haar eenigzins naar de regterzijde dringt; boven dezelve liggen onmiddellijk de dunne darmen. De lengte-as van de baarmoeder komt, bij den opgerigten stand en buiten de zwangerheid, ten naastenbij met de lengte-as van het bovenste bekken (§. 82.), doch gedurende den stondenvloed, waarbij de baarmoeder eenigzins nederdaalt, bijna met de as van het onderste bekken, overeen. Evenwel hebben er hier zoo vele uitzonderingen plaats, dat men daarvan nauwelijks iets kan zeggen, dat algemeen geldende is.

J. C. ROSENMULLER, *chirurgisch anatomische Abbildungen*. 3ter Theil. 1ste Lief. (Weimar, 1806.) Tab. I.

J. G. V. D. BERGH, *Observ. de utero*. L. B. 1821. 8.

De gebreken van de baarmoeder, die in eene onmiddellijke betrekking staan met de zwangerheid en de verlossing, zullen voor een gedeelte eerst naderhand behandeld worden. Men heeft bevonden dat dezelve (zonder nadeel voor de gezondheid) kon ontbreken, wezenlijk dubbeld (*uterus duplex*) en in twee holten uitgebreid (*uterus bicornis*) kon zijn (*). Zij kan uitgezakt en omgekanteld, ontstoken, met zweren

(*) Het volkomen gemis der *uterus* is een zeer zeldzaam gebrek, men vindt er echter waarnemingen van bij REALD. COLUMBUS, *de re anatomica*. Francof. 1593. 8. H. G. ENGEL, *de utero deficiente*. Prag. 1777. 4. J. L. SCHMUCKER, *Vermischte chirurgische Schriften*, 1786. 3 Band. 8. A. G. RICHTER, *observationes chirurgicae*. Goet. 1776. 3 fasc. 8. G. W. STEIN, in HUFELAND'S *Journal der pract, Heilkunde*. Berl. 1819. Mai. — Dubbelde baarmoeders beschreven. A. HALLER, *Disput. phys. coll.* Goett. Tom. V. p. 237. P. F. MECKEL, *Journal für alle anatomische varietäten, feinere und pathologische anatomie*. Halle, 1805. 2. 3. waarn. pl. I. afb. 1. WIEDEMAN in *Lucina*. II. B. II. St. bl. 93. H. P. LEVELLING, *de utero bicorni in Ej. Obs. anat. rariores*. Fasc. I. Norimb. 1787. 4. A. L. CASSAN, *Recherches anatomiques et physiologiques sur les cas d'uterus double et de superfetation*. Paris, 1826. 8. Polypen behandelen vooral RALFF in V. GRAEFE und V. WALTHER'S *Journal etc.* Berl. 1827. X Bd. 4. Heft. J. A. V. D. WATER, *de polypis uteri et vaginae*. Tr. ad Rh. 1824. CARUS in V. SIEBOLD'S *Journal etc.* Wurzb. 1828. VII. Bd. 2. St. Eene prolapsus uteri inversi bicornis beschrijft FR. W. STURM, in HARLES, *neue Jahrbücher der deutschen Medizin und Chirurgie*. Band XIV. 2. suppl. Bonn. 1827. 8.

bezet, verhard, verbeend * en geheel ontaard zijn. Zij kan aan polypaardige uitwasfen en aan waterzucht lijden, de baarmoedermond kan ontbreken of gefloten zijn, zij kan in de gedaante van een kromhals gebogen zijn, enz.

CAROL. THAMM, *de genitalium sexus sequioris varietatibus*. Hal. 1799. 4.

J. C. ROEDERER, *Opuscula medica*.

FR. AUG. WALTER, *Annotationes academicae*. Berol. 1786.

ANAON CANESTRINI, *historia de utero duplici etc.* August. Vindelic. 1788. 8.

BENJ. ZEITMANN, *de signis et curatione polyporum uteri*. Jenae, 1790.

FR. ADOLPH HEINZE, *de discrimine polyporum etc.* Jenae, 1790.

EISENMANN, *tabulae anatomicae quatuor uteri duplicis observationem rariorem sistentes, etc.* Argent. 1752. fol.

* JOS. SCHALLGRUBER'S *Aufsätze und Beobachtungen im Gebiete der Heilkunde*. Grätz, 1816. 8.

AUG. GOTTL. SCHWARZ, *de uteri degeneratione*. Goett. 1798.

E. B. G. HEBENSTREITH, *progr. de uteri concretionem morbosam*. Leipz. 1801. 4.

G. R. BOEHMER, *de naturalibus faeminarum clausis*. Witteb. 1778.

J. C. SCHLEGEL, *sylloge minorum operum praestantiorum ad artem obstetriciam spectantium*. Leipz. 1795. Vol. II. 8.

F. JAHN, *de utero retroverso*. Jenae, 1787.

CONSTANT DE GREGORINI, *de hydrope uteri etc.* Halae, 1795.

KLINGE, *de procidentia uteri, usuque pessariorum in hoc morbo*. Goett. 1789. 8.

SOEMMERING, in de aanmerkingen bij BAILLIE, bl. 214.

VOIGTELS, *Handbuch der pathologische Anatomie*.

P. F. MECKEL, *Journal für anat. Varietäten*. I. B. 1. St. S. 45. ff.

D. B. WENZEL, *die Krankheiten des Uterus*. Mainz, 1816.
in folio, met vele platen.

E. G. PATRIX, *ueber die Gebärmutterkrebs und die Krankheiten der zu dem Uterus führenden Theile*. Leipz.
1821. 8.

J. BURN'S *Grundsätze der Geburtshülfe*. S. 105. ff.

§. 105.

De bovenste helft (§. 95.) der baarmoeder is door het buikvlies (*peritoneum*) overtrokken, hetwelk van voren en van achteren, als met twee vereenigende plooijen op de blaas en den endeldarm overgaat, en ter wederzijden de baarmoeder als met twee breede plooijen, de *breede banden* (*ligamenta uteri lata*), zeer los aan de zijden van het bekken hecht. — Aan de bovenzijde van den bodem der baarmoeder, eenigzins naar voren, ontspringen de zoogenoemde *ronde banden* (*ligamenta uteri rotunda*), die als aanhangfels van de zelfstandigheid der baarmoeder beschouwd moeten worden, schuins-, voor- en buitenwaarts naar beneden dalen, en zich, nadat zij door de lieschring gegaan zijn, onder eene vezelachtige gedaante in den venusheuvel verliezen. (*)

J. H. F. AUTENRIEVI et F. DELMANZO, *observationes in morbos quosdam ligamenti uteri acutos*. Tübing. 1811. 8.

(*) Deze banden dienen niet alleen tot ondersteuning van de baarmoeder, maar vooral ter geleide der vaten, en wel der *vasa spermatica*, alsmede der *vasa lymphatica*, die van den lendenvecht afkomen, en met den ronden band door den lieschring gaan.

III. *Van de trompetten van Fallopius
en de Eijerstokken.*

§. 106.

Van boven ter wederzijde van den bodem der baarmoeder, achter de ronde banden, nemen de *trompetten van Fallopius*, twee buizen van drie duim lengte, met zeer fijne openingen haar begin, loopen golvend naar de zijden des bekkens, terwijl haar kanaal eenigzins wijder wordt, tot aan de breede banden der baarmoeder voort, en eindigen in eene opening, die een ongelijken, gekroesden rand van kleine roodachtige, franjeachtige uiteinden (*fimbriae*) heeft, vrij in de buikholte afhangt, naar de eijerstokken gekeerd is, en in den maagdelijken staat meer plooijen bezit, dan na plaats gehad hebbende verlosfingen.

REILS en AUTENRIETHS, *Archiv. für die Physiologie*,
VIIter Band. Halle 1807. 8. S. 294.

§. 107.

De zelfstandigheid der trompetten van Fallopius is (vooral inwendig) aan die van de baarmoeder niet ongelijk, en haar kanaal zoo wijd, dat het eene niet zeer dikke sonde doorlaat; somwijlen zijn zij echter ook aan eene of aan beide zijden, en dat wel dikwijls in hunne geheele uitgestrektheid, digtgegroeid, met waterblaasjes (*hydatides*) bezet, of ook met de nabijgelegene deelen zamengegroeid; overigens deelen zij gewoonlijk in de gebreken van de baarmoeder.

LEONHARDI, *Progr. de tubarum uterus morbis etc.*
Viteb. 1788.

§. 108.

De *eijerslokken* liggen, op bijna één en een halve duim afstands van de zijden der baarmoeder, achter de trompetten van Fallopius, met welke zij door een vervolg van den breeden band der baarmoeder, de *vleermuisvleugel* (*verpertilionis alae*) genoemd, verbonden zijn. Zij vormen in den tijd der huwbaarheid twee platgedrukte eivormige lichamen, die van een bollen, boven-achterwaarts gerigten, en van een regten, aan den vleermuisvleugel gehechten rand voorzien zijn, en wier eene einde door eene bandachtige streng aan den bovenhoek der baarmoeder bevestigd is.

§. 109.

Zij bestaan uit een zeer vast, met bloedvaten en zenuwen doorvlochten celwijsweeffel, waarin zich omtrent zestien kleine blaasjes *de eijertjes van de Graaf* (*vesiculae Graafianae s. ovula*) bevinden, die met eene lymphaticke bleekgele vloeistof gevuld zijn. Is echter de in de blaasjes bevatte vloeistof dik en geel, dan noemt men ze *gele lichamen* (*corpora lutea*). Onlangs heeft men * ook kleine, op de oppervlakte van een eijerslok ontstaande gierstvormige blaasjes, voor de eigenlijke eijertjes gehouden. (*)

(*) Deze *corpora lutea* zijn overblijffels van het *ovum*, dat tot het vruchtbeginfel is gebruikt geworden, en worden niet dan bij zwangeren of vrouwen die het geweest zijn, gevonden. Zie hierover het naauwkeurig werk van HUNTER, *de utero gravido*. Pl. XXII, XXIX en XXXI.

TH. G. A. ROOSE, *über die gelben Körper im weiblichen Eierstocke*. Braunschw. 1800.

E. HOME, in de *Philosophical Transactions for the year*, 1817. 1819.

OSIANDER, *Lehrbuch der Hebammenkunst*. S. 209.

Deszelfs *Grundriss der Entbindungskunst etc.* S. 130.

§. 110.

De gebreken der eijerstokken zijn : ontsteking, verharding en knoestachtigheid, gezwollen en zweren, en vooral waterzucht enz., gebreken welke, vooral als zij in de beide eijerstokken plaats hebben, de vruchtbaarheid belemmeren of beletten. (*)

KRIEGER, *Diss. sistens ovariorum muliebrium pathologiam*. Goett. 1789.

Baillie, in de Hoogd. uitgave van SOEMMERING. t. a. pl.

VOIGTEL'S *Handbuch der pathologische Anatomie*.

(*) Waterzucht en honiggezwel (*steatoma, melliceris*) met haar enz. gevuld, komen het meest voor; de herkenning is dikwijls zeer moeilijk. Het voornaamste omtrent de oorzaken, verschijnselen, behandeling en literatuur der ziekten van de eijerstokken vindt men bij E. VAN SIEBOLD, *Handboek over de kennis en genezing der ziekten van het vrouwelijk geslacht*. II. D. 2. en 3. Stuk. bl. 267-284. Zie ook de uitmuntende oordeelkundige *Verhandl. over de zakwaterzucht* van ONZEN J. VAN DER HAAR, in *Verhandl. van de Holl. Maatsch. te Haarl.* 1762. VI. D. 2. St. bl. 543—627. A. DE HAEN, *Ratio medendi*. ed. L. B. Tom. II. p. 21. sqq. HALLER, *Opuscula minora*. Tom. III. p. 346. MORGAGNE, *Epistolae anatom.* Cap. 39. art. 17. A. MURRAY, in the *Edinb. med. and surg. Journal* 1828. N^o. 95. A. BURDACH, *Zeitschrift für Natur- und Heilk.* I. D.

IV. *Van de verrigtingen der inwendige vrouwelijke
teeldeelen, afgescheiden van de zwangerheid,
de verlossing en het kraambed.*

§. 111.

Onder alle de teeldeelen is in den maagdelijken huwbaren staat alleen de baarmoeder werkzaam, de overige deelen worden dit eerst later. De huwbare, tot de voortteling geschikte leeftijd, vangt, in onze streken, bij de vrouw zelden voor het veertiende jaar aan, en duurt tot op het vijfenveertigste of vijftigste jaar.

§. 112.

In dit ter voortplanting geschikte tijdperk, heeft er bij alle gezonde vrouwen, buiten den staat der zwangerheid, om de vier weken, een verlies van bloed uit de bloedvaten der baarmoeder plaats, hetwelk door den mond der baarmoeder en de scheede wegvloeit, gewoonlijk vier dagen aanhoudt, in den beginne het aanzien van vleeschnat, doch later dat van zuiver bloed heeft, en naderhand weder dezelfde hoedanigheid aanneemt, die het in den beginne had. De hoeveelheid van het ontlaste bloed, welks hoedanigheid volkomen aan het terugblijvende gelijk, doch slechts niet stolbaar (?) is, bedraagt tusschen de vier en zes oncen.

Dresd. 1827. 2. St. SIEBOLD's *Journal*. VIII Bd. 2. St. S. 480. RUST, *Magazin*. XXIII. B. 3. St. J. SEYMOUR, *Illustrations of Some of the principal diseases of the ovaria etc.* Lond. 1830. 8. *Geneeskundig Magazin*. I. D. 1. St. bl. 117—127.

OSIANDER'S *Denkwürdigkeiten für die Heilkunde etc.*
2ter Band.

F. OSIANDER, *Diss. de fluxu menstruo atque uteri prolapsu.* Goett. 1818. p. 12. sqq.

GIUSEPPE JACOPI, *Elementi di Fisiologia e Notomia comparativa.* Tom. III. Milano, 1809. 8. p. 199.

§. 113.

Deze *maandelijfsche bloedvliet* (*menstruatio*), dien men ook de maandstonden of maandelijfsche zuivering noemt, en waarvan men zich dikwijls zeer onjuiste begrippen vormde, heeft zijne oorzaak in de bewerktuiging van het ligchaam der vrouw. Hij berust op eene overmaat van bloed, welke aan de bestemming van het bestaan der vrouw, de voortplanting van het geslacht, beantwoordt, en heeft slechts zoo lang plaats, als deze bestemming kan vervuld worden, doch onvervuld blijft.

§. 114.

Zoodra de bestemming der vrouw door de zwangerheid, de verlossing en het zogen vervuld is, houdt de maandelijfsche bloedvliet op. Wanneer deze bestemming, na den afloop der zoging, weder vervuld kan worden, dan begint de bloedvliet op nieuw; wordt zij werkelijk vervuld, dan houdt de bloedvliet weder op, en zij houdt geheel op, als de meer gevorderde leeftijd de vervulling dezer bestemming volstrekt onmogelijk maakt.

T. T. JAEHKEL, *Diss. aetiologia fluxus menstrui mulierum.* Lipsiae, 1784.

G. H. CH. NIEMEYER, *Diss. de menstruationis fine et usu.* Goett. 1796. 8.

H. L. L. ELLENMANN, *Diss. de fluxu menstruo ejusque praesertim aetiologia*. Lipsiae, 1800.

P. G. A. BLUMENHAGEN, *Diss. menstruatio physiologica et pathologica spectata*. Goett. 1803. 4.

NAEGELE, *über einige Fehler der Menstruation etc.* in zijne *Erfahrungen und Abhandlungen etc.* s. 265. ff.

RITGEN, in *Gemeinz. Deutsche Zeitschrift*. Weimar, 1828. Band II. Heft 3.

E. VON SIEBOLD, *Handboek over de kennis en geneezing enz.* II. Stuk. bl. 179—356.

§. 115.

De eerste verschijning van deze verrigting der baarmoeder is met eenige omstandigheden verbonden, welke men *voorboden van den maandelijkschen bloedvliet* (*molimina menstruorum*) noemt, en die in verandering van den omloop des bloeds en der spijsvertering, in hoofdpijn, ligte kolieken, in een gevoel van zwaarte in het onderlijf en de ledematen, in kriebeling in de beenen en dijen, en in opzwellings en hardwording der borsten bestaan. Deze voorboden worden des te onmerkbaarder, hoe veelvuldiger de maandelijksche bloedvliet terugkomt, en ten laatste vertoont zich slechts somwijlen een voorgevoel van denzelve.

§. 116.

Ten aanzien van den maandelijkschen bloedvliet, kunnen er menigvuldige, met meer of minder nadeelen voor de gezondheid en de voorteling verbondene afwijkingen plaats hebben. In plaats van de gewone voorboden, ontstaan er dikwijls koortsachtige toevallen, krampen, hevige koliekpijnen, braking, buikloop, enz. De maandelijksche bloedvliet zelf kan te vroeg

of te laat, te menigvuldig of te schaars, in te groote of te geringe hoeveelheid, of in het geheel niet verschijnen; dezelve kan te lang aanhouden, te vroeg geheel ophouden, van eene zeer ziekelijke hoedanigheid zijn, en langs geheel ongewone wegen komen. (*)

FR. L. ANGERMANN *praes.* GEHLER, *catameniorum phaenomena in muliere sana et aegrotante*. Lipsiae, 1793.

FISCHER, *Diss. de mensibus suppressis*. Goett. 1794.

(Vergelijk de schrijvers, die over de ziekten van het vrouwelijk geslacht geschreven hebben, voornamelijk SIEBOLD's *Handboek*. I. D. 2. Stuk. W. P. DEWEES, *Treatise on the Diseases of females*. Philadelphia, 1827. 8. — MARSHALL HALL, *Commentaries on some of the more important diseases of females*. Lond. 1827. 8.)

(*) STARK nam de maandstonden reeds waar bij een meisje van zes jaren; hare gezondheid was zeer goed, doch de groei zeer achterlijk. LOBSTEIN geeft een voorbeeld van een meisje van twee jaren; haar groei was mede achterlijk, doch haar verstand zeer ontwikkeld, zoodat zij zich reeds uit schaamte van andere kinderen afzonderde. SIEBOLD, *Lucina*, I B. I. St. S. 102. 4 B. I. St. S. 163. Bij een meisje van negen maanden zag BUSCH reeds *puberteit* en stondenvloed. In haar negende levensjaar was zij volkomen volwasfen, stierf echter in haar twaalfde aan *miliaria*. *Gemeinzame Deutsche Zeitschrift für Geburtshülfe*. Weimar, 1826. 8. Band I. Stück I. — Zie ook MEYER, *de menstruationa ejusque anomaliis*. Berlin, 1826. 8. JACOBSON, *la clinique des hopitaux et de la ville*. Tom III. SIEBOLD's *Journal*. VIII B. I. St. RUST, *Magazin*, XXVI Bd. I. St. J. F. BONFELS in het *journal general de medecine etc*. Paris, 1828. Nov.

VIERDE HOOFDDEEL.

VAN DE BORSTEN.

§. 117.

De *borsten* (*mammæ*) vormen in de jaren der huwbaarheid in den maagdelijken staat, twee ronde, eenigzins buitenwaarts gekeerde, op de groote borstspieren geplaatste, veerkrachtige, week, bolle half-ronden, welke eene zeer fijne opperhuid hebben, die witter is dan de overige huid. De diepte tusſchen de beide borsten vormt den vrouwelijken boezem.

§. 118.

In het midden van elke borst bevindt zich de meer of minder verhevene *tepel* (*papilla*), die van onderscheidene grootte is, en uit verschillende verienigde heuveltjes of huidtepeltjes bestaat, die naast elkander liggen, met vele bloedvaten en zenuwen voorzien zijn, en de openingen der melkbuisjes bevatten. Deze tepels zijn zoo gevoelig, dat zij zich op elke kriebeling uitzetten. De huid, die den tepel onmiddellijk bekleedt, is donkerrood of bruin, heeft zeer vele vetkliertjes, waardoor zij eenigzins glibberig wordt gemaakt, en wordt *hof*, *kring* of *ronde vlakke* (*areola mammæ, areola papillæ*) genoemd.

§. 119.

Onder de huid ligt de *borstklier* (*glandula mammæ*), die in eene grootere of kleinere hoeveelheid vet

is ingewikkeld, en uit vele *klierachtige korreltjes* (*acini*) bestaat, welke door een celachtig vlies tot een geheel vereenigd zijn. Uit deze klier komen de wortels der kleine, zachte, vliedsachtige buisjes, *melkbuisjes* (*duetus lactiferi*) genoemd, die, gewoonlijk ten getale van vijftien, in den tepel gaan, en zich aldaar openen.

J. D. SANTORINI, *anatomici summi XVII tabulae, quas nunc primum edit atque explicat de structura mammarum et de tunica vaginali testis* MICHAEL GIRARDI. Parmae, 1775. 4. Tab. G. I.

F. AD. BOEHMER, *de mammarum ductibus*. Hal. 1742.

ALEX. BERNH. KOELPIN, *de structura mammarum etc.* Gryphisw. 1765. 4. m. pl.

J. G. KLEES, *ueber die weiblichen Brüste*. Franckf. a. M. 3. Aufl. 1806.

ATHANAS. JOANNIDES, *de mammarum physiologia*. Hal. 1801. gr. 4.

J. G. MEINICKE, *Diss. mammarum structuram et morbos sistens*. Viteb. 1805. 4.

J. A. BRAUM, *ueber den Werth und die Wichtigkeit der weiblichen Brüste*. Erfurt, 1805. 2 Bde.

VOGT, *de mammarum structura et morbis*. Viteb. 1805. 8.

In docenda et discenda medicina atque arte obstetricia methodum activam potiore in facienda expectationem saepe non alienam esse ostendit et observationes quasdam de papillis mammarum numero et structura variis communicat J. F. OSIANEER. Goett. 1816. 4to.

§. 120.

De borsten zijn somtijds buitengewoon klein, of door gezwollen en zakwaterzucht ongemeen groot. Haar tepel is dikwijls zeer klein, ingezonken, bijna

onmerkbaar; somtijds echter ook zeer groot, ontveld, pijnlijk en soms dubbeld. Ja men heeft zelfs vijf * borsten of afdeelingen der borst met tepels waargenomen. De borsten zijn wijders aan ontsteking, ontvelling, verzwering en vooral aan knoest- of kankerachtige ontaarding onderhevig. (*)

J. V. MUELLER, *de scirrho praesertim mammarum*. Jenae, 1779.

RICHTER, *Anfangsgrunde der Wundarzneikunst* I. Theil.

* *Miscellen fur die neueste Weltkunde*. 1807. N^o. 27.

OTTO, *Handbuch der pathologischen Anatomie*. Breslau, 1814. 8.

MEYER, *de mammis muliebribus in statu sano et morboso consideratis*. Erford, 1800.

(*) Naarmate het uiterlijk gestel der vrouw meer met dat der man overeenkomt, zijn ook de borsten kleiner. Uitvoerig worden de gebreken derzelve behandeld bij E. V. SIEBOLD, *Handboek der ziekten van het vrouwelijk geslacht*, bl. 520—555 en aldaar aangehaalde schrijvers. — Zes tepels aan twee borsten, zie men in MOTL en ELDIK'S *Tijdschrift*. II. Suppl. 1. St. bladz. 84. III. Jaarg. 2. St. bladz. 99.

TWEEDE AFDEELING.

De Leer der Zwangerheid.

EERSTE HOOFDDEEL.

VAN DE ZWANGERHEID IN HET ALGEMEEN.

§. 121.

De *zwangerheid* is die staat van het ligchaam der vrouw, welke van het tijdstip der bevruchting af tot dat der verlossing toe voortduurt, en waarbij het voortbrengsel van den vruchtbaren bijslaap zich in hetzelfde bevindt, en daarin gevoed en ontwikkeld kan worden.

I. *Van de Bevruchting.*

§. 122.

De fluijer, waaronder de wording van de eerste levende kiem van een bewerktuigd wezen nog verborgen ligt, zal voorzeker voor ons nog zoo lang geheel ondoordringbaar blijven, totdat onze kennis in de natuurkunde van den mensch in het algemeen meer verlicht, meer eenvoudig, en op meer zekere beginselen zal gevestigd zijn. De tijd zal leeren of wij van dit tijdstip meer of minder verwijderd zijn.

§. 123.

Wanneer men de leer van het *Occasionalismus* er van uitzondert (een gevoelen, volgens hetwelk God zelf telkens onmiddellijk tot de oorzaak gemaakt wordt, van de bij de bevruchting vereenigd wordende stof, en daaraan de bewerktuigde gedaante en het leven geeft), kunnen de zeer uiteenlopende gevoelens en theorien tot twee afdeelingen gebragt worden, namelijk: tot de dikwijls geheel onbegrijpelijke ontwikkelingsleer (*theoria evolutionis*, welkers belijders eene federt de fchepping in het ligchaam der vrouw gelegde kiem aannemen, welke alleen door den vruchtbaren bijflaap zich begint te ontwikkelen), en tot de meer licht verfpreadende leer der langzame opeenvolging (*theoria epigenescos*, welkers aanhangers eene door den bijflaap te weeg gebragte langzame ontwikkeling, en vorming eener tot dus verre ruwe en ongevormde masfa aannemen, welke of door het mannelijke of door het vrouwelijke ligchaam, of door beiden te gelijk afgegeven wordt.) Geene dezer theorien echter is genoegzaam bevredigende. (*)

ALBERTI ab HALLER, *Elementa physiologiae corp. humani*. Laus. et Bernae 1757—1766. Tom. VIII. in het achtste deel.

(*) Een zeer volledig overzicht van de verfchillende gevoelens en theorien der bevruchting vindt men in PIERER'S *anatomisch physiologisch Real-Wörterbuch*. Leipz. 1819. 8. Theil III. S. 802. — REIL'S *Archiv für die Physiologie*. B. II. S. 482. Band III. S. 31. f. CARUS, *Gynaekologie*. Theil II. §. 637. ff. G. C. B. SURINGAR, *de novo formativo ejusque aberrationibus*. L. B. 1824.

J. F. BLUMENBACH, *Institutiones physiologicae*, Edit. III. 1810.

J. F. BLUMENBACH, *Grondbeginselen der natuurkunde van den mensch, uit het Latijn door VAN DER BREGGEN*. Amst. 1830. 8.

T. G. A. ROOSE, *Grundzüge der Lehre von der Lebenskraft*. Goett. und Braunschw. 1800. 8.

POL. SCHNEEGASS, *über die Erzeugung, oder Aufzählung und Beleuchtung aller bisherigen Zeugungstheorien*. Jena, 1802. 8.

D. OKEN, *die Zeugung*. Bamb. und Wurzb. 1805. 8.

J. F. SCHWEIGHAEUSER, *sur quelques points de physiologie relatifs à la conception et l'économie organique du foetus*. Strasb. 1812. 8.

§. 124.

Hoezeer wij dan ook van de eerste wording der levende kiem niets zekers weten te zeggen, zoo hebben wij evenwel door de vergelijkende ontleed- en natuurkunde, de verschijnselen en omstandigheden leeren kennen, die de ontwikkeling van het leven in de bewerktuigde kiem vergezellen.

§. 125.

De bijslaap is gewoonlijk het vruchtbaarst, als hij gehouden wordt bij eene volkomene gezondheid en gematigde paardrift van den man en de vrouw, in de morgenstonden van den lentetijd, nadat korten tijd te voren de maandstonden hebben plaats gehad, en terwijl de vrouw op den rug ligt. Deze omstandigheden zijn echter op zich zelve tot den vruchtbaren bijslaap, noch altijd noodzakelijk, noch altijd voldoende.

§. 126.

Bij den vruchtbaren bijslaap, wordt het mannelijk zaad, op het tijdstip dat de wellust bij den man en bij de vrouw het hoogste toppunt bereikt, in de baarmoeder gespoten, die even als de andere reedeelen met bloed is opgehoopt, en vanwaar het door de opgerigte buizen van Fallopius, die met hare franje-achtige uiteinden (§. 106.) den eijerstok hebben omvangen, in den eijerstok komt en één (zelden meer) der daarin bevatte eijertjes bevrucht. (*)

§. 127.

De neerzetting van een (of meer) van zulke pas bevruchte eitjes op eene plaats, waar het gevoed of

(*) Offschoon het waarschijnlijk is (zoo als FRONIER hier stellig zegt), dat het zaad bij den bijslaap in de baarmoeder gebragt wordt, zoo schijnt echter uit vele waarnemingen en getuigenissen van geachte geneesheeren te blijken, dat dit niet volstrekt noodzakelijk is ter bevruchting. MORGAGNE en HALLER in hunne menigvuldige waarnemingen vonden het slechts éénmaal; RUISEN tweemalen; en hier zoude men nog kunnen twijfelen, of het vocht dat men in de baarmoeder vond, niet het slijm was, dat veelal na de geslachtsvereeniging aldaar gevonden wordt. Men leze HAIGHTON en CRUIKSHANK, in de *Philosophical Transactions*. 1787. Vol. I. p. 159. sqq. p. 197. sqq. REIL's *Archiv. f. d. Physiologie*. III B. 1. St. S. 31. ff. S. 197. ff. VIII B. 3. St. S. 381. — Ook is het nog niet bewezen, (wat de schrijver zegt,) dat op het oogenblik van de geslachtsvereeniging de franjeachtige uiteinden den eijerstok omvatten. DEWEES en STEARNS, *an essay on conception and superfoetation*. Newyork, 1828. 8.

ontwikkeld moet worden, noemt men de ontvangenis, bevruchting of bezwangering (*conceptio*), die tevens het laatste tijdstip van den bijslaap, en het eerste tijdstip van de zwangerheid uitmaakt.

II. *Van de verschillende soorten van zwangerheid.*

§. 128.

Wanneer het eitje door de buizen van Fallopius, ten gevolge van eene, aan deze eigene beweging, (*motus peristalticus?*) binnen de baarmoeder wordt gevoerd, hetwelk in een nog niet naauwkeurig bepaalden tijd geschiedt, dan noemt men dit eene *regelmatige bevruchting* of ontvangenis (*conceptio uterina*), en de daardoor begonnene *zwangerheid* is eene *regelmatige of baarmoeder-zwangerheid* (*graviditas uterina*), welke gewoonlijk veertig weken of tweehonderd vijfënzeventig tot tweehonderd tachtig dagen duurt, doch door velerleie oorzaken verkort of verlengd, en ook tot vierënveertig en zesënveertig (?) weken kan gerekt worden. (§. 213.) (*)

(*) G. SALOMON verhaalt in het *Geneeskundig Magazijn* van eene dragt, welke van 3 Januarij tot 26 Januarij van het volgende jaar duurde, de vrucht woog tien en een kwart pond. Een dergelijk geval verhaalt L. HEISTER, *Dissertatio qua partus tredecemestris pro legitimo habitus proponitur et partui nullum certum tempus tribui posse ostenditur*, Goett. 1753. 4. Zie ook W. G. PLOUCQUET, *ueber frühreife und späte Geburten*. Mannh. 1807. 8. J. CH. HARRER *praes.* R. A. VOGEL, *de partu serotino etc.* Goett. 1767. 4. J. E. L. PUTTMANN, E. PLATNER *et* G. H. MILIUS, *Opuscula de partu undecemestri c. praef. edid.*

§. 129.

Komt het eitje niet in de baarmoeder, dan bestaat er eene *onregelmatige bevruchting*, en eene *zwangerheid op eene verkeerde plaats*, *buiten-baarmoederlijke zwangerheid* (*conceptio et graviditas extra-uterina*), welke in sommige gevallen zeer lang, ja tot veertig jaren kan duren, doch overigens van allerlei aard zijn kan: 1) het ei kan *in den eijerslok* blijven (*conceptio et graviditas ovaria*); 2) het kan in de *buizen van Fallopius* opgenomen worden en daarin blijven, (*conc. et grav. tubaria*); 3) het kan door de buizen tot aan den mond derzelve in den wand van de baarmoeder dringen en aldaar in de zelfstandigheid der laatste blijven (*conc. et grav. tubo-uterina*, *conc. et grav. in uteri substantia s. interstitialis*); 4) het kan ook uit den eijerstok dringen, doch alsdan niet door de buizen opgenomen worden, maar *in de buikholte* geraken, *buikzwangerheid* (*conc. et grav. ventralis. s. abdominalis*). Deze buikzwangerheid kan ook later door openbarsting van de baarmoeder en de scheede, (of, bij eene reeds te voren plaats gehad hebbende zwangerheid op eene verkeerde plaats, door de verscheuring der buizen of des eijerstoks) ontstaan, en alsdan is er eene *toevallige of opvolgende buikzwangerheid* (*graviditas abdominalis secundaria*), en het kind kan

F. L. SCHÖNEMANN. Lipsiae. 1799. 8. FRORIEP's Notizen. B. XI. n^o. 8. JAC. COLLINS in the *Edinburg medical and surgical journal*. 1826. April. ALERVIMAN, *medico-chirurgical transactions published by the medical and surgical society of London*. Vol. XIII. Part. II. Lond. 1828.

daarbij zelfs in de blaas en in het darmkanaal dringen, enz. Eenige willen ook nog de ontwikkeling van het ei *in de scheede* waargenomen hebben, hetgene, zoo ooit, evenwel alleen bij eene hoogst zonderlinge vorming der teeldeelen plaats kan hebben. (*)

(*) De oorzaken, verschijnselen en uitgangen van zulke zwangerheden vindt men, behalve in de door FRORIEP aangehaalde werken, beschreven door MICH. VON LENHOSSEK, *Beobachtungen und Abhandl. aus dem Gebiete der gesammten pract. Heilkunde, von Oesterreichischen Aerzten*. Band II. S. 395. ff. THOMASSEN A THUESSINK, in de *Genees-, Heel- en Scheikundige Verhandelingen van het Koninkl. Nederl. Inst.* Amst. 1823. 4. 1. aflev. J. F. KLUYSKENS, aldaar. 2. aflev. G. SALOMON, aldaar. 3. aflev. L. G. DE FREMERY, aldaar. 3. aflev. — Vergelijk ook FISCHER, in LODER's *Journal für die Chirurgie, Geburtshülfe und gerichtliche Azzneykunde*. 1799. II B. 3. Stukk. F. A. FRITZE, *observatio de conceptione tubaria cum epicrisi*. Strassb. 1779. 4. W. JOSEPHI, *Diss. de conceptione abdominali*. Goett. 1784. 4. K. K. WEINKNECHT, *de conceptione extrauterina*, 1779. 4. CH. F. DEUTSCH, *de graviditate abdominali, singulari obs. illustr. cum quibusdam ad historiam literariam etc.* Halle 1792. 4. F. L. HEIM's *Erfahrungen und Beobachtungen über Schwangerschaften ausserhalb der Gebärmutter*. Berlin, 1812. Ook in HORN's *Archiv. u. s. w.* 1812. Jan. p. 1-40. RUST's *Magazin d. ges. Heilkunde*, B. XIV. St. 2. S. 261 ff. en 371. SIEBOLD's *Journal für Geburtshülfe*. B. IX. St. 1. S. 238. MECKEL's *Handb. der pathologischen Anatomie*. Leipz. 1812—16. II B. S. 163. WISHARD en WILH. JOHNSON bij L. MENDE, *Beobachtungen und Bemerkungen aus der Geb. H.* III Band. Gott. 1826. 8. TILT, *the London medical and physical journal*. Lond. 1828. Mai.

- * W. SCHMITT in de *Beobachtungen der K. K. med. chirurg. Academie zu Wien*. 1 Bd. Wien. 1801. p. 65. Taf. 5.
- * HEDERICH in HORN's *Archiv*. Sept. Oct. 1817.
- * MAYER, *Beschreibung einer graviditas interstitialis uteri etc.* Bonn 1825. 4.
- * *On a new variety of extrauterine pregnancy*, by GILB. BRESCHET, in *medico-chirurgical transactions*. vol. XIII. pars. I. p. 33.
- * *Memoire sur une nouvelle espèce de grossesse extra uterine*, par M. BRESCHET, in het eerste nommer van het *Repertoire général d'anatomie et de physiologie pathologiques etc.* Paris, 1826. 8. met pl.
- * *Geburtshülflche Demonstrationen*. IV. Heft. Weimar, 1826. Taf. 13.

CHARLOTTE HEILAND, gen. v. SIEBOLD, *über die Schwangerschaft ausserhalb der Gebärmutter und über eine Bauchhölen Schwangerschaft ins besondere*. Giess. 1816.

R. J. CAMERARIUS, *de foetu XLVI. annorum*. Tub. 1722.

JOS. GERSON, *Beobachtungen bei einer Frau, die eine Frucht in ihrer Mutterscheide drei Jahre etc.* Hamb. 1784.

GUERAND in RUST's *Magazin u. s. w.* XXVI B. 3. Heft.
 J. COOPER, *the Edinburg med. and physical journal*.
 Edinb. 1828. Jan. HENRY LEE HERSSKEL, in HORN's *Archiv*.
f. m. Erfahr. Berl. 1828. Julij. HIPPOCRATES *Magazijn*.
 VII B. 4. Stuk. p. 291. MENIERE, *Archives generales de*
medecine. 1826. Juin. SIEBOLD's *Journal*. 1826. VI. Bd.
 1. St. *The philadelphia monthly Journal of medecine*
and snrgery. 1828. *Medico-chirurgical transactions*. Vol.
 XIII. P. II. Lond. 1827. *Journal des progres des sciences*
et institutions medicales etc. Paris, 1827. Vol. I.
 ERNEST, in RUST's *Magazin*, XXIII. B. 2. Stuk. MALA-
 CARNE in HUFELAND's *Journal d. pract. Heilk.* Berl. 1826.
 Oct. en vele anderen.

CLEM. JOH. PBAEL, *de foetu duodetriginta annos in utero detento*. Goett. 1821. 8.

NOEL in het *Journal de médecine, chirurgie etc.* Tom. 52. (1779.) vert. in SCHWEIKHARD'S *Magazin für Geburtshülfe*. 1 Band.

Dr. LAUR. EBERSBACH, in *Ephemerid. nat. curios. cent. V. obs. XX.*

W. JOSEPHI, *ueber die Schwangerschaft ausserhalb der Gebärmutter, und ueber eine höchst merkwürdige Harnblasenschwangerschaft in's besondere*. Rostock, 1803. 8.

G. V. EHRHARD, *d. I. Samml. von Beobacht. u. Aufsätzen über Gegenstände der A. W. und Entbindungslehre*. Nürnberg. 1ste Heft. 8.

THEUSSINK, in *Bulletin des sciences médicales* 1811. e semestre.

C. L. RATH, *Diss. de graviditate oarica*. Berol. 1828, alwaar de afloop van zesëndertig gevallen te vinden is.

§. 130.

Wanneer het eitje niet op zijne bestemde verblijfplaats komt, dan kan hetzelfde, daar het een eigen leven bezit, ook op andere plaatsen, gedurende eenigen tijd voortleven, doch het kan alleen bij de buikzwangerheid ontwikkeld en op zijn tijd rijp worden: (ja men moet gelooven, dat het overtijdig kan worden, dat is, dat het kind niet op het oogenblik sterft, waarop het gewone tijdperk der zwangerheid afgelopen is.) Bij de zwangerheid in de eijerstokken en in de buizen van Fallopius, wordt de wasdom en ontwikkeling van hetzelfde, door hinderpalen belemmerd, die het spoedig doen sterven, en als de vrucht in dit geval niet door de kunst wordt weggenomen, dan

wordt zij of door verzwering uit het ligchaam verwijderd, of zij blijft nog lang daarna in het ligchaam, en wordt alsdan (meestal zonder nadeel voor de gezondheid der moeder) droog en met eene harde kalkachtige korst overtrokken, en een *steenkind* (*lithopaedion*) genoemd. (§. 200. 201.)

GOODSIR in DUNCAN'S *Annals of medicine for* 1802. n^o. 10.

J. G. WALTHER'S *Geschichte einer Frau, die in ihrem Unterleibe ein verhärtetes Kind 22 Jahre getragen.*

Berlin, 1778. 4. met pl.

Vergelijk over de hiertoe betrekkelijke literatuur:

PLOUCQUET, *literatura medica digesta*. Tom. II. p. 132.

JOHN BURN'S *Grundsätze der Geburtshülfe etc.* S. 230. ff.

Dr. AMPFERLE, in *Salzb. med. chir. Zeitung*, 1815. n^o. 35.

S. 156.

§. 131.

Als er bij een vruchtbaren bijslaap slechts een eitje wordt bevrucht, dan wordt dit eene *enkelvoudige zwangerheid* (*graviditas simplex*) genoemd. Zijn er integendeel twee, drie, vier, vijf, zes, of meer (?) eitjes bevrucht, hetgeene overigens wel door éenen bijslaap kan plaats hebben, dan bestaat er eene *meer- of veelvoudige*, en wel eene *tweelings-*, *drielings-*, *vierlings-*, *vijslings-* en *zeslings-zwangerheid*, enz. (*graviditas multiplex cum gemellis trigeminis, etc.*). (*)

(*) Vierlingen zijn reeds zeldzaam. Men vindt daarvan voorbeelden bij BLUMENBACH, *med. Bibliothek*. Goett. 1795. III. Theil. MENDE, *Beobachtungen und Bemerkungen aus der Geburtshülfe*. I. B. S. 299. *Med. Jahrbucher der K. K. Oesterreich. Staates*, VI. B. 4. St.

§. 132.

De overbevruchting (*superfoecundatio*) heeft plaats, wanneer er twee eitjes niet te gelijk, maar in twee elkander opvolgende vruchtbare bijslapen (dikwijls van twee verschillende mannen) bevrucht worden. Dit kan welligt (bij eene veelvoudige zwangerheid meermalen dan men meent) het geval zijn, als de tweede bijslaap gehouden wordt, voordat nog het ei, dat door den eersten bijslaap bevrucht was, in de baarmoeder gekomen is. De *overbezwangering* (*superfoetatio*) evenwel, waarbij twee en meer vruchten op zeer verwijderde tijdstippen verwekt worden, kan alleen dan plaats hebben 1) als eene onregelmatige bevruchting en zwangerheid (§. 129) de baarmoederzwangerheid is voorafgegaan; 2) als er eene dubbelde baarmoeder bestaat, in welk geval dan ook de beide, op verschillende tijdstippen verwekte vruchten op verschillende tijdstippen kunnen geboren worden.

J. K. GRAVEL, *Diss. de superfoetatione conject.* Argent.

1738. *recus. in* SCHLEGEL, *sylloge oppos.* Vol. I. n°. 10.

R. J. CAMERARIO, *Diss. de foetu XLVI. annor.* Tub. 1790.

S. 105. *London medical gazette.* 1828. n°. 12. p. 345.

MOLL en EDIK's, *practisch tijdschrift der geneeskunde*, IV. Jaargang. bl. 187. 2. Supplementband, bl. 285. 1 Supp.

1. St. bl. 92. VI. Jaargang. 6. St. bl. 544. VIII. Jaarg.

6. St. bl. 574. Vijflingen, in REIL's *Archiv.* I Band. S. 74.

CARUS, *Gemeinsame Deutsche Zeitschrift für Geburtskunde.* II Band. 1. Heft. S. 27. WEISS. *Ibid.* II-B. 1. Heft.

HORN's *Archiv. für med. Erfahr.* Berl. 1828. Julij. —

Zevenlingen, OSIANDER, *Handbuch der Entbindungskunde*, I. Theil. S. 320. FRORIEP's *Notizen u. s. w.*

B. VIII. n°. 10. B. XXIV. n°. 15.

T. G. A. ROOSE, *de superfoetatione nonnulla*. Brem. 1801. 4.
Ook in ROOSE'S *Beiträgen zur gerichtlichen A. K.*
2tes Stück.

J. C. VARRENTRAPP, *Commentariolus in T. G. A. ROOSE,*
de superfoetatione nonnulla libellum. Francf. a. M.
1803. 4.

A. L. CASSAN, *Recherches anatomiques et physiologiques*
sur les cas de l'uterus double et de la superfétation.
à Paris, 1826. 8.

HASSE in VON SIEBOLD'S *Journal f. Geburtshülfe*. VI. B.
2 St. S. 433.

VAN ELDIK, in het *practisch tijdschrift der geneeskunde enz.*
VII. Jaarg. 1828. 2 St. bl. 161. 1 Jaarg. 4 St. bl. 371.

§. 133.

Als een bevrucht ei zich in het ligchaam der vrouw bevindt, (§. 122.) het zij het overigens in of buiten de baarmoeder ontvangen, volkomen of onvolkomen ontwikkeld (*graviditas perfecta et imperfecta*) of ontaard zij, het zij de daarin bevatte vrucht (of vruchten) tijdig, ontijdig, (of overtijdig?), welgevormd of wanschapen, en levend of dood zij, dan bestaat er eene *ware zwangerheid* (*grav. vera*), welke echter weder verschillend zijn kan (§. 128, 129.). Is er integendeel geen bevrucht ei voorhanden en worden er door verschillende andere oorzaken, slechts verschijnselen verwekt, die met die der zwangerheid overeenkomst hebben, dan bestaat er eene *schijnbare zwangerheid* (*grav. apparens*), ook wel *onechte* of *valsche zwangerheid* (*graviditas spuria*) genoemd. * Zijn beide deze gevallen, de ware en de schijnbare zwangerheid vereenigd, dan geeft men dit den naam van *gemengde zwangerheid* (*grav. mixta*).

* KNEBEL'S *Grundriss zu einer Zeichenlehre etc.* S. 408. ff.

TWEEDE HOOFDDEEL.

VAN DE VERANDERINGEN VAN HET VROUWELIJK LIGCHAAM GEDURENDE DE ZWANGERHEID.

§. 134.

Zoodra de bevruchting heeft plaats gehad, ontstaan er in het ligchaam der vrouw veelvuldige veranderingen, die voor den verloskundige van het hoogste gewigt zijn, en welke te weeg gebragt worden door de wederzijdsche tegenwerking van het bevruchte ei en van het ligchaam der vrouw op elkander, en die of door het gezigt of door het gevoel waargenomen, of door ontleding ontdekt worden.

1. *Van de veranderingen van het vrouwelijk ligchaam, die door ontleding ontdekt worden.*

§. 135.

Tot op den tijd, waarop de bevruchting plaats heeft, of ten minste voordat het bevruchte ei in de door vochten uitgezette baarmoeder komt, wordt er uit de wanden van hare holte, die nu eenigzins van elkander zijn verwijderd, eene weiachtige vloeistof afgescheiden, welke in het vervolg de gansche inwendige holte, hare drie openingen waarschijnlijk niet uitgezonderd, in de gedaante van een vliezigen zak bekleedt, en de bevestiging van het ei in de holte

der baarmoeder bevordert. Het kanaal van den hals der baarmoeder is door eene slijmprop gesloten.

W. HUNTER'S *anatomische Beschreibung der schwangern Uterus*, übers. u. m. Anmerk. von FRORIEP. S. 38 en 80.

§. 136.

De holte der baarmoeder, die te voren driehoekig was, verliest hare hoeken, wordt eirond, langer en breeder, dit nu geschiedt niet alleen, doordien het ei grooter wordende, de wanden van de baarmoeder uitschiet, maar ook door eene eigenaardige zwelling of opzetting der baarmoeder zelve, die ten koste van het gansche overige ligchaam is toegenomen, en waarop zeker het ei ook eenigen invloed heeft. In het begin der zwangerheid, wanneer de baarmoeder meer in de lengte toeneemt, is hare vergrooting niet zoo kennelijk, als in de tweede helft, wanneer zij in de lengte, en voornamelijk in de breedte en dikte toeneemt; ook is zij in den aanvang meer gelijkvormig eirond uitgezet, doch op het einde meer gevormd naar de gedaante der vrucht, die in haar bevat is. Gewoonlijk is de baarmoeder op het einde der zwangerheid van twaalf tot dertien duim lang, van zeven tot acht duim breed, en van voren naar achteren van vier tot zes duim dik. Door de uitzetting der baarmoeder worden de plooijen van het buikvlies, die met haar in verband staan, (§. 105.) tot hare bedekking gebezigd, en de eijerstokken en buizen van Fallopius, die van voren tusschen deze plooijen liggen, plaatsen zich meer aan de benedenzijde van het ligchaam derzelve.

§. 137.

De uitzetting en ontwikkeling van de baarmoeder volgt eene bijna onveranderlijke wet, die, naar het ſchijnt, op de natuurlijke verſcheidenheid in de digtheid van hare vezelen (§. 102.) gegrond is. (*) In de eerſte helft der zwangerheid worden alleen de vezelen van den bodem ontwikkeld, in het midden derzelve krijgen de vezelen van het ligchaam deel aan de ontwikkeling, en op het einde geſchiedt de verwijding alleen door de uitzetting van de vezelen van den hals der baarmoeder.

§. 138.

De uitzetting der baarmoeder geſchiedt niet ten koſte van hare zelfſtandigheid (en alleen bij haren hals ſchijnt dit eene uitzondering te lijden); hare zelfſtandigheid neemt integendeel aanmerkelyk toe, gelijk ook de ſlagaderen en watervaten, die men in haar waarneemt, in getal en omvang toenemen. Als de cubieke inhoud van de zelfſtandigheid der niet bezwangerde baarmoeder vier en een kwart duim bedraagt, dan bedraagt de maſſa harer zelfſtandigheid in de zwangerheid vijf cubiek duimen. De dikte der zelfſtan-

(*) De uitzetting van de baarmoeder geſchiedt gewis niet alleen door mechanifche krachten, of door de drukking van het ei, maar door eigendommelyke, ons onbekende krachten. REIL, *ueber das polarifche Aus einanderweichen der Gebärmutter* in zijn *Archiv. für die Physiologie*. B. VII. St. 3. S. 402–501. verklaart de uitzetting der baarmoeder door *contractie* en *expansie*, eene niet onwaarfchijnljke vooronderſtelling.

digheid is evenwel verschillend, naar de verscheidenheid van de plaatfingen der baarmoeder, van de tijdperken der zwangerheid en van de zwangere voorwerpen.

§. 139.

De as van de baarmoeder kan gedurende de zwangerheid zeer onderscheidene rigtingen aannemen. — In den aanvang, als de baarmoeder in het bekken afdaalt, heeft zij dezelfde rigting als ten tijde der maandstonden (§. 103.); tegen het einde der zwangerheid echter maakt zij gewoonlijk met de loodregte as van het ligchaam der vrouw een grooteren hoek, dan de as van de bovenste engte des bekken. De rigting van hare as is onregelmatig, als zij *te veel naar voren of naar achteren, of naar de linker of te veel naar de regterzijde* (eenigzins regts is zij gewoonlijk) gekeerd is. Men noemt de te sterk afwijkende rigtingen, van de as der baarmoeder *scleeve liggingen van de baarmoeder* (*obliquitas uteri*), welker nadeelen men evenwel overdreven, en die men in vele andere opzigten veronachtzaamd heeft.

HIER. FABRICIUS AB. AQUAPENDENTE, *de formato foetu*.
Patav. 1604. fol.

ABR. VATER, *Diss. qua uterus gravidus physiologice et pathologice consideratur*. Viteb. 1722. 4.

ALB. AB. HALLER, *historia nuperae dissectionis geminae gravidae*. Goett. 1739. recus. in HALLERI, *Disput. anatom.* Vol. V.

J. G. FR. KUEHN, *de causis uterum impraegnatum distentibus*. Viteb. 1763.

E. SANDIFORT, *de utero gravido in observ. anat. pathologicis*. L. II. L. B. 1779. 4.

FOLKERT SNIP, *vroedkundige aanmerkingen en afbeelding eener bezwangerde baarmoeder*. Amst. 1793. gr. folio. met platen.

TH. AD. BOEHMER, *situs uteri gravidi*. Hal. 1741.

L. J. BOER, *Abhandlungen etc.* I Band. S. 84. ff.

H. A. WRISBERG, *de utero gravido in Comm. j. c.* Tom. I. pag. 276.

NOLDE, *Beiträge*, 3ter Stück. S. 137.

L. CALZA, *ueber den Mechanismus der Schwangerschaft in REIL's und AUTENRIETH's Archiv. u. s. w.* Band VII. S. 341. ff.

Alsmede de voorheen aangehaalde werken van ARANTIUS, NOORDWYK, JENTY, SMELLIE, ALBINUS, ROEDERER, W. HUNTER, BURNS en JOERG.

II. *Van de veranderingen van het vrouwelijk ligchaam, die men door het gezigt en het gevoel waarneemt.*

§. 140.

De kennis en beschouwing dezer veranderingen is zeer belangrijk, wegens het overzicht van het beloop der zwangerheid en hare tijdrekening, die zij den verloskundige geeft; doch men moet slechts niet vergeten dat vele nog in het geheel niet bekende omstandigheden verschillende afwijkingen in de volgreeds der verschijnselen kunnen voortbrengen. In de vier eerste weken, na de ontvangenis, zwelt het onderlijf eenigzins op; het blijft echter zacht, en even als men buiten de zwangerheid vóór de beginnende maanden waarneemt, welke nu echter gedurende de zwangerheid in het geheel niet, of ongeregeld en zeldzaam verschijnen. De venusheuvel en de groote schaam-

lippen zijn eenigzins vaster en meer vooruitspringend, en de ingang van de scheede is heet en droog, of ook wel ongewoon vochtig door de vermeerderde slijm-afscheiding. Het scheededeel wordt dikker, de lippen van den mond der baarmoeder zwellen op, en worden elkander meer in lengte gelijk, de dwarse spleet van den uitwendigen baarmoedermond begint in eene kleine ronde opening te veranderen, terwijl de inwendige baarmoedermond gesloten is. (*)

§. 141.

In de tweede maand (de maand op achtentwintig dagen gerekend) daalt de baarmoeder, die in zwaarte toeneemt, in de bekkenholte, en daardoor verliest het onderlijf de zoo even (§. 140.) gemelde dikte weder, en wordt zelfs nog platter, dan in den maagdelijken staat. (Bij vrouwen, die reeds meermalen gekraamd,

(*) Over het algemeen is bij de vrouwen het wegblijven der maandstonden het beslissende teeken van zwangerheid, en indedaad kan bij vrouwen die altijd gezond zijn, en bij welke de stonden altijd geregeld vloeiden, naauwelijks eene andere oorzaak gevonden worden. Het bloed, dat in de vaten terugblijft, moet nu dienen om de vrucht van voedsel te voorzien, en om de levensvermogens van de voorheen werkelooze baarmoeder op te wekken.

De droogte en vochtigheid der scheede schijnt aftehangen van de verschillende individueele gesteldheid; want in de eerste dagen na de ontvangenis zijn de in- en uitwendige deelen in een staat van zeer opgewekte levenskracht, welke eene ontsteking schijnt nabij te komen, en waarvan het uitwerksel dikwijls veel naar eene uitstorting van *lymphæ* met vliezen schijnt te gelijken.

en een opgezet ligchaam gehouden hebben, is deze verandering natuurlijk niet bemerkbaar.) Den teza-
mengetrokken, kleinen, ronden baarmoedermond kan
men, wegens den lageren, en meer loodregten stand
van het scheedededeel (*pl. I. afb. 5.*) ligtelijk bereiken.
De borsten worden harder en meer gespannen.

§. 142.

In de derde maand rijst de baarmoedermond, die
steeds grooter wordt, weder uit het bekken, en
maakt het ligchaam, door het in de hoogte drijven
der darmen, weder eenigzins meer gewelfd. De baar-
moedermond is weinig van gedaante en rigting veran-
derd. De borsten beginnen te zwellen, en zij worden
door ligte steken aangedaan.

§. 143.

In de vierde maand rijst de bodem der baarmoeder,
wier uitzetting toeneemt, geheel boven het bekken,
en kan, bij magere personen, als eene harde, ronde
zwellung boven de schaambeenderen gevoeld worden.
De buik is merkbaar gezwollen, en de mond der
baarmoeder staat reeds hooger, en is zachter op het
gevoel (*pl. I. afb. 7.*) De kring rondom de tepels

(*) In de borsten (welkers groote medelijdsheid met
de baarmoeder genoegzaam bekend is), worden de vaten
verwijd, en ontvangen deze deelen een nieuw leven,
waardoor zij reeds gedurende de zwangerheid tot derzelver
bestemming voorbereid worden. — De hals der baarmoeder
wordt korter en weeker, omdat deszelfs vezelen meer op
elkander gepakt liggen.

der borsten wordt donker, en de tepel zelf dikker en eenigzins meer verheven. (*)

§. 144.

In de vijfde maand is de zwelling des buiks, zonder eene sterke insnoering, volstrekt niet meer te verbergen, en voornamelijk ook in de zijden der vrouw bemerkbaar. Men voelt den bodem der baarmoeder zeer duidelijk, als een gezwel, in het midden tusschen den kam der schaambeenderen en den navel. De mond der baarmoeder staat hooger en meer naar achteren.

§ 145.

In de zesde maand kan men den bodem der baarmoeder op de hoogte van den navel voelen, de onderste rimpels van de navelgroef worden glad, en de navel verkrijgt derhalve tevens eene bovenwaartsche rigting; (men zegt dan, dat de navel begint te verdwijnen) ook voelt men nu voor het eerst de bewegingen van het kind, als eene ligte en korte aantikking. Het scheede-deel is korter, ten hoogste een half duim lang, en weeker dan te voren. (*pl. I. afb. 7.*) (*)

(*) De beweging van het kind ontdekt men door de hand op den buik te leggen. De vrouw zelve ontdekt dezelve inwendig reeds vroeger, als een gevoel van zachte kruiping, (waarom dezelve wel eens voor wormen is gehouden), welke in de vijf en eene halve maand begint, zoodat sommige vrouwen, die dezelve altijd gevoelen, hierna hunne rekening bepalen. — De baarmoeder staat nu hooger en meer naar achteren. De bodem echter valt meer voorwaarts, en boven den bodem zijn uitwendig somtijds de darmen op het gevoel te ontdekken.

§. 146.

In de zevende maand vindt men den bodem der baarmoeder van twee tot vier vingeren breed boven den navel, welks groef vlakker wordt. Het scheede-deel is nog meer verkort en nog wecker, en de hooger staande baarmoedermond is nog meer naar achteren, tegen de uitholling van het heiligbeen gerigt. In de scheede voelt men van voren, achter de schaambeenderen, door het gewelf der scheede heen, het zeer beweegbare, voorliggende deel des kinds. (*) De aderen der borsten schijnen blaauwachtig door, en men kan dikwijls eene waterachtige vloeistof uit de borsten drukken. (†)

§. 147.

In de achtste maand ligt de bodem der baarmoeder in het midden tusfchen den zoogenoemden hartkuil en den navel, boven welken de uitgezette bekleedselen des buiks eene gespannene zwelling maken, meer naar

(*) Eene zeer doelmatige wijze om de beweging en het aanwezen der vrucht te ontdekken (het zoogenaamd *ballottement*), beschrijft BAUDELOCQUE, *l'art des accouchemens*. Tom. I. §. 395.

(†) Sometijds zelfs vloeit er eene groote hoeveelheid *lympha* uit de borsten, welke niet, zoo als HIPPOCRATES, *sect. V. Aphor. 52.* en CELSUS, *de Medicina*, Lib. II. cap. 7. art. 31. meenden, aan te merken is als een bewijs van zwakheid of ongesteldheid der vrucht.

De hals der baarmoeder wordt nu zeer kort, omdat dezelve gedeeltelijk besteed wordt ter uitrekking en vergrooting der baarmoeder zelve.

eene zijde (gewoonlijk naar de regter); de navelgroef is geheel vlak en week; (men zegt alsdan: *de navel is verdwenen*); ook de plooiën boven den navel zijn uitgewischt, en dikwijls ontwaart men ter zijde van denzelve (meer of minder duidelijk) vooruitspringende deelen des kinds. Daar nu vooral de vezelen van den hals der baarmoeder tot verwijding van hare holte bijdragen, zoo is het scheidedeel omtrent een half duim lang, dik en gezwollen; de baarmoedermond is moeilijk bereikbaar, en staat zeer hoog achterwaarts. Daar nu het gewelf der scheede bol nedergedrukt is, zoo is het voorliggende deel des kinds, bij het onderzoek, zeer beweegbaar.

§. 148.

In de negende maand bereikt de bodem der baarmoeder, vooral bij de eerste zwangerheid, bijna den hartkuil; zoodat, als de vrouw niet meerder den adem haalde door uitzetting van de borst naar buiten, dan door de nederdaling van het middenrif, de ademhaling bijzonder moeilijk zoude worden. De wanden van den buik zijn, boven den navel, door de uitzetting verdund. De navelgroef begint zich eenigzins te verheffen, en de deelen des kinds, die nevens den navel liggen, worden voor een geoeffend gevoel kennelijker. Het scheidedeel is tot op een kwart duim verkort, naauwelijks te bereiken, en staat achterwaarts, tegen het voorgebergte van het heiligbeen. De harde, niet zeer beweegbare kogel van het voorliggende deel des kinds dringt het gewelf der scheede in het bekken nederwaarts voor het scheidedeel. Er is dikwijls melk in de borsten, die niet zelden van zelve wegvloeit.

§. 149.

In de tiende maand daalt de bodem der baarmoeder weder tot op het midden, tusfchen den hartkuil en den navel, en de bekleedselen van den buik zijn minder gespannen; daarbij gevoelt de vrouw zich meestal eenigzins verligt. De navel is kegelvormig vooruitgedreven, en die deelen des kinds, welke uitwendig gevoeld kunnen worden, zijn nog duidelijker. De hals van de baarmoeder is nu geheel tot verwijding van hare holte gebezigd, van daar, dat alleen de lippen van het verdwenen fchededeel nu nog eene zwelling vormen, die later (uitgenomen bij vrouwen, die meermalen zwanger geweest zijn, waar zij tot aan de verlosfing blijft bestaan) geheel verdwijnt. (*pl. I. afb. VIII.*) De inwendige mond der baarmoeder is dan zoo nabij aan den uitwendigen, dat men flechts eene enkele opening kan befpeuren. (Bij vrouwen, die meermalen gekraamd hebben, is echter het onderscheid van den minder geopenden, harden, *inwendigen*, en van den wijden, geheel weeken, *uitwendigen* baarmoedermond, nog duidelijk.) Het deel, dat zwaar en vast op of in de bovenfte engte des bekkenf ligt, voelt men als een halven kogel, door het uitgezette, zeer dunne gewelf der fcheede, even als door eene blaas omgeven: in welk gewelf de mond der baarmoedermond een klein, bijna onmerkbaar groefje vormt. (*)

(*) Alle deze teekenen van den voortgang der zwangerheid moet men zich vast in het geheugen prenten, en zich alle de op elkander volgende veranderingen van het

OSIANDER's *Hebammenbuch*. S. 226. ff. Dezelfde, *Denkwürdigkeiten etc.* 2ter Band. S. 342.

L. F. FRORIEP, *Hysteroplasmata oder Nachbildungen der Vaginal portion des Uterus und des Muttermundes in den verschiedenen Perioden der Schwangerschaft und Geburt. Mit dem Touchirapparate*. Weimar 1802.

L. P. J. POTT, *de corporis foeminae gravidæ mutationibus iisque cum integra ipsius inter graviditatem valetudine recte conciliandis*. Goett. 1816. 4.

G. WAGNER, *de foeminarum in graviditate mutationibus nec non de causis quibus fiat, ut integra earum valetudo cum hisce mutationibus consistat*. Brunsw. 1816. 8.

DERDE HOOFDDEEL.

VAN HET MENSCHELIJK EI, EN DE DAARIN BEVATTE VRUCHT.

§. 150.

Het ei, na een vruchtbaren bijslaap, met leven bedeed, is in de eerste dagen na de ontvangenis

scheedededeel eigen maken. FRORIEP, VAN SIEBOLD en anderen hebben door afstrefels in was, welke naar de natuur afgegoten zijn, onder den naam van *hysteroplasmata*, getracht de veranderingen van het scheedededeel der baarmoeder in verschillende tijdperken des levens, zoowel bij vrouwen die niet gebaard, als die gebaard hebben, en bij de laatsten voor, gedurende en na de baring voor te stellen. Dezelve zijn verkrijgbaar te Potsdam. *Breite Strasse*, N^o. 35, onder het adres van ERNST STUWE. — Echter zij men omzigtig in het bepalen van den juisten tijd, dewijl deze niet naauwkeurig op eene halve of geheele maand na bepaald kan worden.

slechts onduidelijk, en alleen als eene geleachtige vloeistof in de baarmoeder zichtbaar. Eerst in de derde week bespeurt men een ruw ligchaampje, van de grootte eener hazelnoot, welks wasdom echter buitengemeen spoedig voortgaat, zoodat het in de vierde week met een duivenei, en in de zesde in grootte met een ganzenei overeenkomt, en nu, tot op het einde der zwangerheid, altijd te gelijk met de holte van de baarmoeder, in grootte toeneemt. Elk volkomen ei bestaat uit *de vrucht (foetus)* en uit *de deelen, die haar omgeven*.

- F. G. DANZ, *Grundriss der Zergliederungskunde des Ungebornes Kindes etc. Mit Anmerkungen von SOEMMERING*, 2 Bändchen. Frankf. und Leipz. 1792-1793. 8.
J. FR. LOBSTEIN, *Essai sur la nutrition du foetus*. Strasb. an X. 1802. 4. J. FR. LOBSTEIN, *Ueber die Ernährung des Foetus*, uebersetzt von Dr. KESTNER. Halle 1804. 8.

I. *Van de deelen, die de vrucht omgeven,*

§. 151.

Hiertoe behooren de vliezen, de moederkoek, de navelstreng en het water. — In den aanvang der zwangerheid bespeurt men vier *vliezen (velamenta)* aan het ei (die naderhand tot slechts drie zamen smelten). Het buitenste is zeer ongelijk, als met gaten doorboord, en wordt uit de *lympha*, die dadelijk na den vruchtbaren bijslaap in de holligheid van de baarmoeder wordt afgescheiden, (§. 135) even als een ontstekings- of schijnvlies gevormd: het overtrekt (naar BOJANUS) de gansche holte der baarmoeder, en geeft eene losse sluiting aan hare drie openingen,

I. D.

L

Men noemt dit, *het afvallend vlies der baarmoeder* of van HUNTER (*membrana uteri decidua crassa, v. caduca, v. Hunteri; Epichorion*); het hangt ook (behalve in de eerste maanden) minder vast zamen met het ei dan met de baarmoeder, zoodat het, bij de lozing der overige deelen van het ei, in dezelve blijft hangen, en eerst eenigen tijd daarna, met de kraamzuiveringen ontlast wordt. Zelfs bij de buitenbaarmoederlijke zwangerheid wordt het in de baarmoeder gevonden. Op eene zekere plaats van het ei slaat dit vlies zich binnenwaars om, terwijl het ei, dat door de buis van Fallopius in de baarmoeder dringt, dit vlies hier van de baarmoeder losmaakt, en voor zich heen dringt, het omgeeft alsdan nog eenmaal het geheele ei als zijn tweede vlies, dat men *het omgeslagen afvallend vlies der baarmoeder* (*membrana decidua uteri reflexa*) noemt. Dit tweede eivlies, dat het ei ook niet oorspronkelijk bezit, maar eerst in de holte der baarmoeder ontvangt, is slechts in den aanvang der zwangerheid zichtbaar; naderhand (omtrent het midden der vijfde maand) verbindt het zich met het afvallend vlies van HUNTER, en schijnt geheel verdwenen te zijn. (*)

(*) Het eitje komt waarschijnlijk ter zijner tijd (volgens de waarnemingen van HALLER, HUNTER, CRUIKSHANK, HOME, MAGENDIE, PREVOST, DUMAS en anderen, somwijlen eerst acht, veertien, twintig dagen na de bevruchting,) uit den eijerstok, door de trompetten, in de baarmoeder met twee vliezen bekleed, en vindt aldaar twee andere, het afvallend vlies en het omgeslagen afvallend vlies van HUNTER. Daar men zeldzaam deze vliezen in de natuur kan waarnemen en zien, dezelve moeilijk zijn te

- HUNTER, *anatomia uteri gravidi*. Tab. 5, 10, 26, 34.
W. HUNTER's *anatomische Beschreibung des schwangeren Uterus*. S. 80. in de aanmerking.
BURNS, *the anatomy etc.* p. 202. cct.
WRISSBERG, *de structura ovi etc.*
LOBSTEIN, *über die Ernährung des Foetus*. S. 2. ffg.
JOERG, *über das Gebärorgan*. t. a. pl. p. 18—21.
SOEMMERING, *Icones embryonum*. Tab. I. Fig. 1—5.
AUTENRIETH resp. SCHMAUK, *diss. de nexu ovi humani cum utero et restringenda in abortu haemorrhagia*. Tubing. 1811. 8.
E. GUNTHER resp. K. W. KRUMMACHER, *obs. quaedam anat. circa velamenta ovi humani*. Duisb. 1790. 4. in SCHLEGEL's, *sylloge observationum ad art. obstetr.* Vol. I.
J. F. MULLER, *diss. sistens genitalium, ovi etc. historia* in SCHLEGEL l. c.
J. G. C. JOERG, *Grundlinien zur Physiologie der Menschen*. Leipz. 1815. 8. Theil I.
DANZ, *Zergliederkunde des ungeb. Kindes*. Theil I. p. 16. §. 7 en 8.

§. 152.

Het derde vlies behoort daarentegen reeds oorspronkelijk tot het ei, is zeer vast, sterk, van vele vaten

beschrijven, en wanneer bij miskraam het *ovum* uitgeworpen wordt, in de baarmoeder blijven zitten, en bij de ontleding veelal mishandeld worden, raadplege men de opgegevene schrijvers, alsmede HUNTER, t. a. pl. Pl. 5, 10, 25, 26. Fig. 4, 28. Fig. 1, 2, 12, 29. Fig. 2, 31, Fig. 1, 32. Fig. 1, 2. 33. Fig. 1, 4, 34. Fig. 3—8. — LODER, Pl. 90. Fig. 9 en 10. ROEDERER, *icon. uteri humani*. Tab. VI. Fig. 8. SANDIFORT, *observ. anatom. pathol.* Lib. II. Cap. 1. Tab. 6.

voorzien, eenigzins donker, en heeft den naam van *vaat-* of *adervlies* (*chorion*). In de eerste maanden heeft dit vlies, op zijne gansche buitenvlakte, zeer vele vaatbundels, die zich allengskens alle naar eene zijde begeven (*het vlokkige gedeelte; pars flocculenta*), en de andere zijde bijna geheel vrij laten (*het gladde of doorschijnende gedeelte: pars pellucida*); uit het eerste gedeelte ontspruiten de navelvaten in den moederkoek. De uitwendige vlakte van het vaat- of adervlies verbindt zich door vaten, die de gedaante hebben van vlokjes, met het omgeslagen vlies, doch de binnenvlakte hangt zamen met het vierde vlies van het ei, door middel van eene geleiachtige stof en zeer zachte vezelen van een zeer fijn celachtig weeffsel. Dit vierde binnenste vlies (het tweede van de eigenlijke vliezen van het ei), het *lams-* of *watervlies* (*am-nion s. indusium*), is zeer dun, zacht, doorschijnend, zonder zigbare vaten, en vormt, als behoorende tot de soort der weivliezen, met zijne gladde inwendige vlakte, de eigenlijke holte, waarin het lamsvocht of het vruchtwater en de vrucht zich bevinden. Bovendien slaat het lamsvlies zich nog over de navelvaten, en bekleedt dezen als met eene scheede. Tot op de derde maand der zwangerheid vindt men gewoonlijk een klein blaasje tusschen het vaatvlies en het lamsvlies, dat niet verre van de kiem verwijderd, en door vaten enz. daarmede verbonden is. Dit kleine blaasje, dat men *navelblaasje* (*vesicula umbilicalis*) noemt, bevat eene lymphaticke vloeistof (die ten deele in wijngeest stremt) en waarvan men geloofst, dat zij in den eersten tijd tot voeding der vrucht zou dienen. Uit de nasporingen der vergelijkende ontleed-

kunde wordt het waarschijnlijk, dat het navelblaasje minder met den *piszak* (*allantoïs*) der dieren, dan met de *tunica erythroides*, die bij vele zoogdieren voorkomt, moet vergeleken worden. (*)

HALLER, *Element physiologiae*. T. 8. p. 182, 183.

DANZ, t. a. pl. p. 15—20.

HALLER, *Grundriss der Physiologie*. Berl. 1788. S. 670.

(*) Volgens WRISBERG (*descriptio anatomica embryonum*, Gott. 1764.) en anderen bestaat het *chorion pellucidum* uit meerdere aan elkander gehechte vliezen, is doorschijnend, dikker en sterker dan het *amnios*, heeft vele bloedvaten, loopt langs de holle zijde van den moederkoek, en is losjes gehecht aan het *chorion fungosum*. Dit laatste vlies, dat tevens met de baarmoeder verbonden is, is ook doorschijnend, geelachtig, dik, doch los zamenhangend, lijmig, vlokkig, in een versch praeparaat zich als slijm voordoende, en in wijngeest eerst als een vlies zichtbaar wordende; hetzelfde loopt over de bolle zijde des moederkoeks, tusfchen deze en de baarmoeder, en behoort volgens WRISBERG niet tot het ei, maar komt er eerst naderhand bij. Zie de afbeelding bij HUNTER, Pl. 33. Fig. 3. en LODER, Pl. 90. Fig. 5. — Het *amnios* is het binnenste en dunste vlies, loopt over de bolle zijde des moederkoeks, tot aan en op de navelstreng, en heeft geene bloedvaten. Over de vliezen, de *allantoïs* en de *tunica erythroides*, leze men HALLER, *Elem. Phys.* T. VIII. P. I. p. 190—208. sqq. ROEDERER, *de foetu observationes*. BLUMENBACH, *Handboek der vergelijkende Ontleedkunde*. §. 351, 352, 358. Tab. VIII. Fig. 1, 2. DANZ, t. a. pl. I. p. 42. sqq. §. 12. EMMERT in REIL'S *Archiv für die Physiol.* X. B. 4. H. p. 42—83. LENHOSSEK, *Physiologia medicinalis*. Pestini, 1818. Vol. V. p. 241. sqq. en aldaar aangehaalde fchrijvers.

- J. F. LOBSTEIN, *Ueber die Ernährung des Foetus*. S. 65.
OKEN en KIEZER, *Beiträge zur vergleichenden Zoologie, Anatomie und Physiologie*. Bamberg, 1806. 4. 1. Heft
C. H. DZONDI, *supplementa ad anatomiam et physiologiam potissime comparatam*. Lipsiae 1806. 4.
K. F. BURDACH, *de primis momentis formationis foetus*, Königsb. 1814.
FR. MECKEL'S *Beiträge zur vergleich. Anatomie*, I. Th. 1. Heft. 1808. p. 91. sq.

§. 153.

In de eerste maanden der zwangerheid vindt men, bij een naauwkeurig onderzoek, het ei meer peervormig, het *afvallend vlies* slechts los met de baarmoeder verbonden en het *omgeslagen vlies* slechts op eene plaats (namelijk waar het zich om slaat) met het afvallend vlies vereenigd. Het lamsvlies is meer rond, en vult de eironde holte van het vaatvlies nog niet aan, maar laat ten minste nog een derde der ruimte overig, die verder met een eigen water is aangevuld. De door het lamsvlies gevormd wordende scheede van de navelfstreng, heeft eene ongelijkmatige dikte. — Na de derde maand begint de moederkoek, tusfchen het vaatvlies en het afvallend vlies (ter plaatse waar het omgeslagen vlies zich om slaat), zichtbaar te worden. Het lamsvlies vult de holte van het vaatvlies allengskens geheel, zoodat het water, dat vroeger tusfchen deze vliezen gevonden werd, geheel verdwijnt, en slechts in zeldzame gevallen tot op het einde der zwangerheid als *valsch- of sluipwater* (*liquor amnii spurius*) overblijft,

HUNTERS *anatomische Beschreibung etc*, S. 67,

§. 154.

De grootte van de holligheid der vliezen van het ei is in het begin der zwangerheid; in evenredigheid, het aanmerkeliĳkst, en staat met de grootte der vrucht in omgekeerde verhouding. De vliezen maken een zeer wezenlijk gedeelte van het ei in de zwangerheid uit, en hebben ook bij de verlossing hare bestemming. Bij eene zwangerheid van tweelingen is het afvallend vlies altijd enkelvoudig; doch het vaatvlies is slechts dan enkelvoudig, als de tweelingen een moederkoek gemeen hebben; bij afzonderlijke moederkoeken integendeel is het dubbeld. Daarentegen heeft elke vrucht duideliĳk zijn eigen lamsvlies, en slechts in zeldzame gevallen lijd't dit eene uitzondering. De vliezen kunnen te dik en te vast, te sterk, niet goed bevestigd, of door een valsĳh vruchtwater van elkander gescheiden zijn, of zelfs geheel ontbreken (?).

MUELLER, *diss. genitalium sexus sequioris, ovi etc. brevis historia*. Jena, 1780.

WRISBERG, *de structura ovi etc.* in zijne *Commentationes*. p. 312.

WRISBERG, *descriptio anatomica embryonis etc.* Goett. 1764.

ROEDERER, *de foetu perfecto*, in zijne *Opusculis citat.*

PATUNA, *Epistola continens historiam foetus sine involucri extra uterum inventi, placenta intra uterum haerente*. Vienn. 1765.

Dr. E. GÜNTHER resp. C. G. KRUMMACHER, *obs. anat. circa velamenta ovi humani*. Duisb. 1790. 4.

§. 155.

De *moederkoek* (*placenta*) ontstaat, op eene nog niet duideliĳk verklaarbare wijze, aan het stompe einde van het ei (ter plaatse, waar de navelvaten van het vaatvlies

naar de kiem gaan), 'en zit gewoonlijk in den bodem der baarmoeder eenigzins naar de eene zijde. Tegen het einde der zwangerheid, neemt hij het vierde gedeelte van de wanden van het ei in. Zijn middellijn bedraagt zes of zeven duim; zijne dikte is in het midden, waar gewoonlijk de navelstreng is vastgehecht, één duim, doch aan zijnen omtrek, rondom welken de vereeniging der vliezen een vasten en als peesachtigen ring vormen, is hij dunner. Zijne zwaarte, met die der vliezen van het ei en de afgesnedene navelstreng, bedraagt eenige looden meer dan een pond (in sommige gevallen weegt zij tot twee ja tot vier ponden). * Eigenlijk is de moederkoek uit eene menigte van kleine stukken zamengesteld, (*) die glad zijn aan de zijde der vrucht, welke door het vaatvlies tot eene vlakke vereenigd en door het lamsvlies onttrokken is; doch aan de zijde, die naar de baarmoeder gekeerd is, vormen zij eene sponsachtige en ongelijke vlakke, (waarop men meer dan twintig holligheden van de grootte van dunne penneſchachten ziet), en zij zijn door duidelijke inſnijdingen verdeeld. Is er, bij een welgevormden moederkoek nog een gedeelte geheel

(*) Bij de herkauwende dieren beſtaat het *chorion* uit vele knobbels, die van elkander afgeſcheiden zijn, en *cotyledones* genoemd worden. In den menſchelijken moederkoek zijn deze *cotyledones* vereenigd en maken een geheel uit, zij worden echter tevens vaneengeſcheiden door het *chorion fungosum*, dat dezelve alle bekleedt, gaande tuſſchen dezelve in, gelijk het zachte herſenvlies in de herſenen. — BLUMENBACH, *Handb. der vergel. Ontleedkunde*. §. 354, 370, 372. — TREVIRANUS, *Biologie*. Th. III. p. 242. ſq. II. MUNTINGHE, *de functione placentae*. Grop. 1816. 8. F. EGLING, *de placenta*. L. B. 1818. 4.

afgezonderd, dan noemt men dit een *bijkomenden moederkoek* (*placenta succenturiata*). Bij eene zwan-gerheid van tweelingen heeft of elke vrucht haar eigen of beide vruchten hebben een gemeenen moederkoek, zonder dat echter de vaten van beide de vruchten gemeenschap hebben.

T. B. OSIANDER, *Handbuch der Entbindungskunst*. 1 Bd. 2. Abtheil. p. 580.

* W. J. SCHMITT's *Uebersicht etc.* in de *Salz. med. chir. Zeitung*. 1815. N^o. 27. S. 16.

§. 156.

De moederkoek bestaat uit eene bijzondere hoeveelheid bloedvaten en een vliesachtig celwijsweeffel; watervaten en zenuwen kunnen niet duidelijk ontdekt worden. Men onderscheidt aan denzelve het *vruchtgedeelte* (*pars foetalis*), dat allereerst uit de vlokken van het vaatvlies is ontstaan, en waarin de vaten van den navelstreng ontspruiten en zich verspreiden; en een *baarmoedergedeelte* (*pars uterina*), dat in verhouding tot het eerste zeer dun is, door het afvallend vlies gevormd wordt, en met welks cellen de vaten van de baarmoeder in verband staan. De vaten van het baarmoedergedeelte en de cellen van het vruchtgedeelte liggen zeer naauwkeurig tegen elkander aangesloten, en maken onderling vele ineenwikkelingen, doch staan te zamen in geene onmiddellijke gemeenschap; en de vaten van het vruchtgedeelte, benevens het daarin bevatte bloed, worden alleen door de vochten der moeder als het ware gebaad en omspoeld, niet met dezelve gemengd. De gebreken van den moederkoek zijn, ten aanzien van zijn samenstel: waterblazen, zonderlinge knoest-

achtige verhardingen, ophooping van eene kalkachtige stof, verbeening (?), slagader- en aderspatten, enz.; ten aanzien van zijne verbinding met de baarmoeder, bestaan zijne gebreken in zijne plaatfing bij en op den mond der baarmoeder, zijne gedeeltelijke ontijdige loswording, ongewoon vasten samenhang, enz. (*)

FR. D. HERISSANT resp. BIDAULT, *an secundinae foetus pulmonum praestant officia?* Paris, 1743.

WRISBERG, *de secundinarum humanarum varietate in Comment. ante citatis. (et in novis comment. Soc. Reg. Sc. Gott. 1773, 1774. Tom. IV.*

A. C. REUSS, *novae quaedam observationes circa structuram vasorum in placenta humana.* Tub. 1784.

QUIRINUS KUEMPEL, *de solutione placentae.* Jen. 1789.

G. PH. MICHAELIS, *Diss. sistens observationes circa placentae ac funiculi umbilicalis vasa absorbentia.* Goett. 1794. 4.

BURNS, t. a. pl. p. 143.

B. N. G. SCHREGER et R. A. HEDWIG, *fragmenta anatomica et physiologica.* Fasc. I. N^o. 3. Lipsiae, 1791.

(*) De schrijver plaatst achter verbeening een (?). Dat echter kalk- en beenachtige verhardingen van de zelfstandigheid des moederkoeks zoo zeldzaam niet zijn, zien men bij WIGAND, *de geboorte van den mensch*, uit het Hoogd. door C. V. ELDIK, Amst. 1826. III. D. bl. 258. OTTO, *Handbuch der pathologische Anatomie.* CARUS, *Lehrbuch der Gynaekologie*, II. Th. S. 507. en SIEBOLD in zijn *Journal für Geburtshülfe*, VI. B. 2. Stuck. S. 246. Vooral echter CLARUS, in *Gemeinsame Deutsche Zeitschrift für Geburtskunde.* 1826. I. Band. 3. Hest. S. 615—620. A. J. G. DÖRING. Ibid. III. B. I. St. Zie ook MOLL en ELDIK, *praktisch Tijdschrift voor de Geneeskunde.* VI. Jaarg. VI. St. bl. 574. volg. en BRACHET in FRORIEP's *Notizen für Natur- und Heilkunde*, Weim. 1828. N^o. 435.

J. W. KÜCK *praes. REIL*, *de semiologia placentae*. Halle, 1791. 8.

B. S. ALBINUS, *Annot. Academ.* Lib. 1. Cap. 10, 18, 19.

J. G. D. MICHAELIS, *de placenta humana, anat, pathol. et therapeutice considerata*. Erfurt. 1792. 4.

B. N. SCHREGER, *de functione placentae uterinae*. Erl. 1799.

W. HUNTER, *anatomische Beschreibung etc.*

DANZ, t. a. pl.

J. F. LOBSTEIN, t. a. pl. S. 81. ff.

JOERG, *ueber das Gebärorgan*. t. a. pl.

HALLER, *Elementa physiologiae*. T. VIII. P. I. p. 177-255.

§. 157.

De *navelstreng* (*funiculus umbilicalis*) ontspringt meer of minder uit het midden, zeldzaam uit den rand des moederkoeks, en in zeer zeldzame gevallen uit eene plaats van de vliezen van het ei, die meer of min van den moederkoek verwijderd is. Zij is achttien tot twintig duim lang, een half duim dik, en gaat tot den navelring van den onderbuik der vrucht. Hare grootte, vooral hare dikte, staat in omgekeerde rede tot den wasdom der vrucht (§. 161—163); hare kleur is graauwachtig geel. Zij bestaat uit twee slagaderen en eene eens zoo dikke ader (zeer zelden is deze verhouding anders), die omgeven zijn door een zacht celwijsweeffel, dat gevuld is met eene heldere gelei, de *Whartonsche gelei* (*gelatina funic. umbilicalis*). Deze vaten zijn in de scheede, die rondom de navelstreng door een vervolg van het lamsvlies wordt gevormd, aldus geplaatst, dat zij van elkander worden afgezonderd door de tusschen-scheidfels, * welke zoo vele verlengfels van de genoemde scheede uitmaken. De *navelader* neemt al de

aderen van het vruchtgedeelte des moederkoeks op, en gaat in de navelstreng met verschillende kronkelingen tusſchen de beide ſlagaderen, waar zij dikwijls *aderspatten* (*varices fun. umbil.*) vormt, door den navelring naar de *groef* of den *kuil* der lever (*fossa pro vena umbilicali*), alwaar zij zich in de linker tak van de poortader, en door een bijzonderen tak (den *ductus venosus Arantii*) in de holle ader uitſtort. De beide *navelſlagaderen* ontspringen uit de onderbuiks - ſlagaderen (*arteriae iliacae*), zelden uit de groote ſlagader (*aorta*) der vrucht, gaan ter zijde van de pisblaas uit het bekken naar boven, door den navelring, ſlingerden zich, daar zij langer zijn dan de ader, in de navelstreng ſpiraalförmig om dezelve, en verſpreiden zich in het vruchtgedeelte van den moederkoek. — De polsſlag der navelſlagaderen is niet afhankelijk van het hart der vrucht. † OSIANDER wil de watervaten van de navelstreng met kwik hebben opgeſpoten ††, en zenuwen, die als takken van de medelijdende zenuw (*nervus sympathicus*) de navelſlagaderen ** verzelden, (?) heeft men ſlechts bij ſommige dieren in de navelstreng ontdekt. De *blaasband* of het *pisvat* (*urachus*) die bij de dieren door de navelstreng loopt, is bij de rijpe menſchelijke vrucht ſlechts zeldzaam boven de blaas nog geopend, maar gewoonlijk in een geſloten band veranderd. Bij de weeke kiem zijn er echter, in de eerſte maanden, ook nog *vasa omphalo-meseraica* *** en kanalen voorhanden (§. 152.), bij wier naauwkeurige beſchrijving wij *hier* des te minder kunnen ſtilſtaan, daar hunne geſteldheid reeds in de derde maand verandert, en zij later alle geſloten zijn. De *Wharton*.

gelei wordt dikwijls op sommige plaatsen in eene zoo groote hoeveelheid gevonden, dat zij *knobbels* (*nodi* (*varices*) *spurii* s *gelatinosi*) vormt, of zij is van kleur verandert, of er wordt in de plaats derzelve alleen *serum* gevonden. De navelstreng kan te kort, zes of acht duim, of tot vier en een half voet en daarboven te lang zijn, en in het laatste geval kan zij ligtelijk veelvuldige omwendingen of omslingeringen en ware knopen door ineenslingering (*nodi veri*) vormen. — In sommige gevallen was er in het geheel geen navelstreng. * * * * (*)

* STEIN, *Lehrbuch*. I. Th. Taf. 3.

** LARREY, *mémoires de chirurgie militaire*. Paris 1812. 8. Tom. III. p. 150.

G. F. F. DÜRR, *Diss. in qua demonstratur, funiculum umbilicalem mammalium nervis carere*. Tub. 1815. 8.

RIECKE, *Diss. in qua investigatur: utrum funiculus umbilicalis nervis polleat vel careat*. Tub. 1816. 4.

† OSIANDER, *Handbuch der Entbindungskunde*. I. p. 588.

†† OSIANDER, t. a. pl. p. 593.

(*) Het ontspringen van de navelstreng uit den rand des moederkoeks is, volgens mijne waarnemingen niet zeldzaam. Te korte navelstreng is bij de verlossing nadeelig, dewijl bij de geboorte van het kind daardoor de moederkoek geweldig getrokken wordt. Te lange navelstreng veroorzaakt uitzakkingen en omslingeringen derzelve, waardoor zij gedrukt en de omloop des bloeds verhinderd wordt. — Een opengebleven *Urachus* met *fungus umbilicalis*, beschrijft BUSCH in het *systematisches Repertorium der gesammten med. Literatur Deutschlands*. 1828. Heft 9. S. II. MOLL en ELDIK, *praktisch tijdschrift enz.* IX. Jaarg. I. St. bl. 96. Zie ook: Aldaar, III. Jaarg. 4. St. bl. 389. FRORIEP's *Notizen u. s. w.* 1824. N°. 113.

*** CHAUSSIER, in de *Nouveaux mémoires de l'academie de Dyon.* 1782.

Sir E. HOME etc. t. a. pl.

WRISBERG, *Observ. de structura cvi et de secundinarum varietate* in de *Comment. citat.* p. 30. seqq. et 312. seqq.

OSIANDER, *Beobachtungen etc.*

LOBSTEIN, t. a. pl. S. 119. fg.

BAUDELOCQUE, *l'art des accouchemens.* Tom. I. p. 250. Pl. VI.

**** KLUYSKENS, in de aanmerkingen op de Fransche vertaling van DENMAN's *Introduction etc.* (De schrijver bezit in zijne verzameling ook een *embryo* van de derde maand, waarin uiterlijk geen spoor van navelstreng te zien is. Men vergelijke ook de afbeelding van eene merkwaardige misgeboorte, in de *Geburtsh. Demonstrationen.* IV. Heft.

Sir E. HOME en BAUER (*Philosophical Transactions of the Royal Society of the Ycur.* 1825. Pl. I.) verzecken, dat zij, met het microscoop, de zenuwen in den moederkoek van een kalf, en in de navelstreng van een tapir en van de menschelijke vrucht gevonden hebben.

§. 158.

Het *vruchtwater* of *lamsvocht* (*liquor amnii*) hetwelk men, ter onderscheiding van het valsche of sluipwater (§. 153.) het ware water noemt, en over welks oorsprong men zeer verschillende gevoelens gehad heeft, schijnt een voortbrengsel te zijn van de vaten van het inwendig vlies van het ei. Het heeft een zoeten en laffen of zaadachtigen reuk; somwijlen echter is het zoo stinkend, dat het bijna bezwijming verwekt: het heeft een eenigzins ziltigen smaak, schoon het ook wel eens scherp en als bijtend is.

De kleur is in den eersten tijd der zwangerheid volkomen helder, doch omtrent het midden en het einde derzelve wordt het melkachtig en vlokkig. Meestal vindt men het vruchtwater met de fijne haren van de ontijdige vrucht gemengd, en somtijds heeft het eene bijna geele of groene kleur. Zijne warmtemaat bedraagt omtrent dertig graden REAUMUR (negenënegentig en een halve graden FAHR.); zijne foortelijke zwaarte één duizend en vijf. De hoeveelheid is zeer verschillend; zij staat met den wasdom der vrucht in omgekeerde rede; in een rijp geworden ei zal het doorgaans omtrent één en een half pond bedragen; het kan echter ook tot op eene zeer geringe hoeveelheid na opgeslorpt, of ook tot op tien pond en daarboven toegenomen zijn. (*)

WRISBERG, *de structura ovi etc.*

STEIN, *Annalen etc.* 2. Heft.

§. 159.

De bestanddeelen van het vruchtwater zijn: zeer veel water en eene geringe hoeveelheid eiwitstof en gelei; ook schijnt de scheikundige ontleding in hetzelfde nog zoutzure en koolzure soda, ammonia en phosphorzure kalkaarde (volgens BERZELIUS ook vloeispaatzuur) aan te wijzen. — Het vruchtwater heeft eene veelvoudige bestemming: het dient om de

(*) Gevallen van volstrekt gemis van het vruchtwater vindt men bij WRISBERG, t. a. pl. *Verhandelingen van het genootschap ter bevordering der Heelkunde*. D. VII. bl. 254. en bij G. POSTHUMUS, *de liquore fetali amnio vulgo dicto*. Gron. 1819. 8. Zie ook G. EGELING, *de liquore amnii*. L. B. 1813. 4.

voeding te bevorderen, om de vrucht eene vrije en zekere ruimte tot haren onbelemmerden wasdom te verschaffen, om de zamengroeiing der tegen elkander liggende deelen der vrucht te beletten, om de gelijkmatige uitzetting der vliezen van het ei gedurende de zwangerheid te bevorderen, om het gevoel te verminderen, dan door de bewegingen des kinds bij de moeder verwekt word (?), en om de verlossing in meer dan één opzicht te verligten.

JOH. LUD. FRANK, *de liquore amnii*. Goett. 1764.

J. W. BAUMER resp. HETTLER, *de liquoris amnii natura*. Giess. 1776.

CHR. FRID. CUNITZ, *de liquore amnii ejusque relatione ad foetum in utero*. Lips. 1788.

VAN DEN BOSCH praes. VAN GEUNS, *de natura et utilitate liquoris amnii*. Utrecht, 1793. *recus. in SCHLEGEL'S sylloge etc.* Vol. I.

P. SCHEEL, *Comment. de liquoris amnii etc. natura et usu*. Hafn. 1799. 8. — *Ueber Beschafterheit und Nutzen des Fruchtwassers etc. mit Anmerk.* Erlang. 1800. 8.

BUNIVA en VAUQUELIN, in de *Annales de Chimie*. T. 33. N^o. 99. en in HORCKEL'S *Archiv für die thierische Chemie*. I. Stück.

OSIANDER'S *Annalen etc.* 2 Bdes. 1stes Stück.

C. H. DZONDI, *Untersuchung des liquor amnii, des liquor allantoidis und des Harns von neugeborenen Kälbern* in GEHLEN'S *Journal für Chemie*. 2. B. 4. Hest. 1806. pag. 657.

JOH. FR. JOHN, *Chemische Tabellen des Thierreichs*, Berlin, 1814.

HALLER en DANZ, t. a. pl.

§. 160.

Tot de deelen, die de vrucht omgeven, behoort in de laatste maanden ook de witte zeepachtige smeer, waarmede de vrucht dikwijls geheel of ten deele bedekt is, welke men het *smegma* of de *vruchtslijm* (*vernix caseosa*) noemt, en die waarschijnlijk het voortbrengfel is van de werkzaamheid van de huid der vrucht en eene daardoor verwekte ontleding van het vruchtwater. Gewoonlijk vindt men deze stof het meest ter plaatse van de buiging der ledematen, de okselholten, de liesstreken, en bij de dwarse liggingen des kinds het meest op de naar boven gekeerde zijde van hetzelfde. — Deze vet- of kaasachtige stof kan, zoowel in den gezonden als in den zieken toestand van de moeder of van het kind ontbreken, en (overigens in zeer verschillende hoedanigheid en hoeveelheid) voorhanden zijn.

J. J. SCHULZ, *de ortu et usu caseosae vernicis*. Helmst. 1788.

OSIANDER'S *Annalen*, 1sten Bandes. 2. St.

STEIN, *Annalen etc.* 2. Heft.

JOHN'S *Chemische Tabellen des Thierreichs*, etc.

II. *Van de menschelijke vrucht.*

§. 161.

Omtrent de derde week, na de bevruchting, wordt de kiem het eerst in de vliezen zichtbaar. Zij heeft ongeveer de grootte van eene mier, is nog geheel zonder gedaante, en bestaat uit twee witkleurige, geleachtige blaasjes, waarvan het grootste, dat de romp moet worden, met zijn spitse einde aan een dunnen steel (de navelstreng) vastgehecht is, het kleinste

I. D.

M

echter, dat het hoofd moet worden, vrij in het lamsvocht hangt. (*)

§. 162.

In de tweede maand is de kiem of vrucht reeds zoo groot als eene bije, en vele van hare deelen zijn reeds veel duidelijker kenbaar. Aan het hoofd begint nu de vorming van de oogen, die als zwarte punten door de dunne oogleden heen schijnen; de vorming van den mond (waaruit de tong dikwijls hangt), en van de neusgaten en de openingen der ooren; en aan den tronk de vorming van de vingerlooze en stompe ledematen en van de teeldeelen die nog niet onderscheiden kunnen worden. Men kan reeds (en op het einde van deze maand reeds vrij duidelijk) iets van de hersenen, van het ruggemerg, van de kraakbeenige beginselen der beenderen, van het hart, van de longen en van de meeste overige ingewanden van het onderlijf (en wel gedeeltelijk de darmen in de navelstreng) bespeuren, gelijk men in het midden des ligchaams ook reeds eene roodkleurige vloeistof waarneemt. (†)

§. 163.

In de derde maand is de vrucht omtrent twee en een half duim lang, het hoofd is aan het voorhoofd

(*) Men vergelijke hier s. TH. SOEMMERING's *Icones embryonum*. Francf. a. M. 1799. fol. Pl. I. afb. I. — In dit belangrijk werk vindt men alle schrijvers, die zich op dit gedeelte der natuurleer van den mensch hebben toegelegd, aangehaald.

(†) HUNTER, *anatomia uteri etc.* Tab. 33. fig. 5. SOEMMERING, l. c. fig. 2—6. Vergelijk ook DANZ, *Zergliederkunde*, Th. I. p. 139. §. 39.

en van achteren reeds gewelfd, het gelaat heeft een geheel rimpelig voorkomen; aan de ledematen ziet men kleine ronde vingers, en zelfs het begin der nagels. Het vleesch, dat thans begint gevormd te worden, is zoo doorschijnend, dat de ribben der gewelfde borst er duidelijk doorschijnen; de darmen liggen in de buikholte, doch het onderlijf is ter plaatse, waar het met de navelstreng is verbonden, zoo zeer uitpuilend, dat het eene navelbreuk (*hernia umbilicalis*) vormt, die eerst later verdwijnt. De teeldeelen zijn uitpuilend, en de kittelaar kan gemakkelijk met de roede verward worden. Op sommige plaatsen kan men reeds beenpunten waarnemen. (*)

§. 164.

In de vierde maand ziet men alle deelen duidelijker met uitzondering van de nagels; ook wordt de ongelijke verhouding tusfchen het hoofd en den romp nu eenigzins verminderd. De plaats der inplanting van de navelstreng aan den onderbuik is zeer nabij de teeldeelen, die nu beter kunnen onderscheiden worden. (†)

(*) SOEMMERING, l. c. p. 7. fig. 7-10. DANZ, p. 141. §. 40. HALLER, *Elementa Physiologiae*. Tom. VIII. p. 371. CARUS, *Gynaekologie*. Th. II. §. 685-699. Tab. II. fig. 1-4.

(†) SOEMMERING's fig. 11-16. vertoonen de trapsgewijze en snelle voortgang der vrucht in deze maand; het individueel verschil van ligchaam, gedaante, gelaatstrekken en kunne is reeds kenbaar.

§. 165.

In de vijfde maand begint de vrucht, die omtrent acht duim lang is, ook beweging zijner uitwendige spieren te openbaren; de huid wordt met fijne witte haren (*lanugo*) bedekt, die evenwel later weder uitvallen, en onder de huid wordt eenig vet gevormd. De navel is nog zeer nabij aan de teeldeelen, waaraan nu ook uitwendig de balzak of de schaamlippen duidelijker gevormd worden. (*)

§. 166.

In de zesde maand verliest de vrucht, die nu van negen tot twaalf duim lengte heeft, één en drie vierde pond weegt (en een frischer en rooder aanzien heeft), eenigzins het rimpelige voorkomen, en wordt meer algemeen geëvenredigd; de nagels worden nu duidelijker, en de haren op het hoofd eenigzins donkerder. Het oogappelvlies wordt geopend. De beweging der vrucht, hoe zwak die ook wezen moge, wordt evenwel van nu af door de moeder waargenomen. Wordt een kind in dezen leeftijd geboren, dan is de ademhaling en het schreien en slikken moeilijk, en het sterft na eenige uren. †)

§. 167.

In de zevende maand neemt de hoeveelheid van het vet onder de huid toe, zoodat de laatste nog minder gerimpeld is. De vrucht is omtrent veertien of vijftien

(*) SOEMMERING, l. c. fig. 17, 18, en 19. HUNTER, Tab. 25, 27, 28, 32. fig. 1 en 2. HALLER en DANZ, l. c.

(†) HUNTER, Tab. 23. 25. DANZ, l. c. p. 148. §. 42.

duim lang , twee en drie kwart pond zwaar ; het hoofd vormt nu bijna een derde deel van het gansche ligchaam , het neemt echter voornamelijk in dikte toe. De ballen beginnen uit de buikholte te zakken. De bewegingen der vrucht worden menigvuldiger , sterker en door de zwangere vrouw beter waargenomen. Wordt de vrucht nu geboren , dan is zij levend , doch zij leeft niet lang.

§. 168.

In de achtste maand , en in den aanvang van de negende , weegt de vrucht vier of vijf pond , de evenredigheid der deelen van het kleine ligchaam neemt nu altijd nog toe , doch de voeten zijn nog zeer mager ; de huid ziet er zeer rood uit , de nagels bezitten de vereischte vastheid nog niet ; de zeer roode balzak is nog zeer weinig gerimpeld , en dikwijls bevat hij nog maar éenen bal. De randen van de beenderen des hoofds zijn nog wat van één verwijderd , en worden gemakkelijk verre over elkander geschoven , en ter plaatse waar de hoeken der randen (aan de naden) elkander moeten naderen , vindt men nog vrij groote openingen , die alleen door de huid zijn gesloten en *fontanellen* genoemd worden. Die , welke tusschen het voorhoofd en de wandbeenderen ligt (ter plaatse waar de *voorhoofds-* , *kroon-* , en *pijlnaad* te zamen komen) noemt men de *groote* of *vierhoekige fontanel* (*font. anterior*) ; die , welke tusschen de wandbeenderen en het achterhoofdsbeen gevonden wordt , de *kleine* of *driehoekige fontanel* (*font. posterior*) : in deze vloeijen de *pijlnaad* en de *winkel-* of *lambda-naad* in een. Als eene vrucht in dit tijdstip geboren wordt ,

dan kan men haar met groote omzigtigheid in het leven behouden. (*)

§. 169.

In de laatste helft van de negende maand begint het kind geheel rijp te worden, en in de tiende maand is het rijp. Het weegt alsdan omtrent zeven pond, en is omstreeks negentien tot twintig duim lang (†) Om de grootte van het reeds geheel behaarde hoofd te leeren kennen, neemt men vier afmetingen van hetzelfde aan, wier verhouding evenwel door de verlossing kan veranderd worden: *a*) van het wandbeen over het oor der eene zijde, tot op dezelfde plaats der andere zijde, gelijklijnig met de *dwarfsche as* van het hoofd des kinds), de *kleine* of *dwarfsche afmeting*, welkers lengte drie en een kwart tot drie en een half duim is; *b*) de *loodregte afmeting* of middellijn, van het midden des schedels tot aan het achterhoofdsgat (gelijklijnig met de *loodlijnige as* van het hoofd), eveneens drie en een kwart tot drie en een half duim; *c*) van den neus-

(*) Zoodanige vrucht in het leven blijvende, heeft eene moeilijke ademhaling, zwakke stem, houdt de oogen meest gesloten, slaapt bijna aanhoudend, en wel bijna zoo lang als dezelve nog in den schoot zijner moeder had behooren te blijven; zij zuigt zeer moeilijk, en het kinderlijk gedeelte der navelstreng valt later af, dan bij voldragene kinderen. SOEMMERING, l. c. Pl. III. DANZ, l. c. p. 151. §. 33. HALLER, l. c. p. 372.

(†) Bij onderscheidene schrijvers vindt men voorbeelden van vruchten van tien, twaalf, vijftien, ja van twee en twintig en een half pond. Zie SIEBOLD's *Lucina*, IV. B. 1. St. S. 77.

wortel tot de plaats van de achterste fontanel, de *regte, groote of middenste afmeting*, welkers lengte vier en een kwart tot vier en een half duim is; *d*) van de kin tot het bovenste gedeelte van het achterhoofdsbeen (evenwijdig met de *lengte-as* van het kinds-hoofd), de *schuinsche, grootste afmeting*, vier en drie kwart tot vijf duim lang. De *achterste fontanel* is bijna geheel verdwenen, en de *voorse* zoodanig vergroeid, dat men haar met de toppen van twee vingeren kan bedekken: de beenderen des hoofds kunnen niet meer zoo gemakkelijk als in de vorige maanden (§. 168) over elkander worden geschoven. — Volgens de opgave van Engelsche verloskundigen, * zou de omvang van het hoofd van eene mannelijke vrucht een achtëntwintigste of een dertigste gedeelte grooter zijn, dan die van eene vrouwelijke (*). De breedte der schouders bedraagt vier en een half, die van den stuit omtrent vier duim. Door het onder de

(*) Over het verschil van den omvang des hoofds bij pasgeborene kinderen van het mannelijke of vrouwelijke geslacht, handelt M. KEEVER, in *the London medical repository*. 1825. Julij, p. 72. — CLARKE vond bij zestig kinderen dat de gemiddelde omvang bij mannelijke en vrouwelijke kinderen stond als veertien tot dertien en vijf achtste (Engelsche) duimen. t. a. pl. Prof. HENNE deelt den uitslag van zijne meting bij honderd dertig kinderen mede, waaruit insgelijks blijkt dat jongens grootere hoofden hebben dan meisjes. Zie VON SIEBOLD's *Journal für Geburtsh. u. s. w.* VIII. B. 1. S. 222. MOLL en ELDIK's *Tijdschrift enz.* V. Jaarg. bl. 93. VII. Jaarg. 6. St. bl. 571. VAN ELDIK in zijne *verloskundige verhandelingen*, II. St. bl. 286 volg.

huid liggende korrelachtige vet is nu alles meer rond en meer geëvenredigd. De nagels bezitten de vereischte hardheid en puilen uit. De borsten zijn uitpuilend, en bevatten bij mannelijke en vrouwelijke vruchten dikwerf eene melkachtige vloeistof. De ballen zijn nu in den balzak, die merkelyk meer gerimpeld, doch niet meer zoo rood is, afgedaald, en bij vrouwelijke vruchten is de streek der teeldeelen en de aaneengeslotene buitenste schaamlippen zeer uitpuilend.

Dr. JOSEPH CLARCKE, in de *Philosophical Transactions*.
Vol. LXXVI.

BURNS, *Principles of midwifery etc.* Chap. 5. BURNS,
Grundsätze der G. H. a. d. Engl. von KÜLPIN. Stettin,
1820. 8. p. 31.

§. 170.

De *ligging* (*situs*) des kinds, die in de vroegere tijdperken der zwangerheid, wel is waar onbepaald, doch altijd met het hoofd benedenwaarts, en dus bij den opgerigten stand der zwangere vrouw naar den mond der baarmoeder was gerigt, en in de zevende maand reeds aldus kon worden waargenomen, is zonder omkanteling (*culbute*), in den laatsten tijd gewoonlijk als volgt: het hoofd is naar beneden, het achterhoofd, de nek en de rug naar voren en naar de linkerzijde, en de hielen zijn, in den bodem der baarmoeder, meer naar de regterzijde gerigt. De afwijkingen hiervan worden in het leerstuk van de verlossing opgegeven. Als er tweelingen zijn, heeft de eerste vrucht meestal de opgegevene, doch de andere eene juist tegenover-

gefelde ligging; dikwijls is evenwel hunne ligging geheel ande s. (*)

J. ONYMUS, *de naturali foetus in utero materno situ*.
L. B. 1743.

BUECHNER, *de genuini foetus in utero situ naturali*.
Hal. 1758.

C. F. REHFELD, *de situ foetus in utero materno*. Gryphism. 1770.

GEHLER, *Progr. de situ foetus in utero*. Lipsiae, 1791. —
GEHLER'S *kleine Schriften*, 2ter Theil. S. 358.

§. 171.

De *houding* (*habitus*) van het kind in de baarmoeder is zoodanig ingerigt, dat het zoo weinig ruimte inneme, als mogelijk is. Het hoofd is tegen de borst gebogen, de voorarmen zijn of tegen de voeten uitgestrekt, of zij liggen met gevouwen handen tegen het hoofd, of kruisen elkander op de borst. De dijen zijn

(*) Voorheen meende men dat de vrucht in de baarmoeder eene zittende houding had, en zich omstreeks de zevende maand omkantelde (*culbute*). Dan daar de vrucht in de eerste maanden in veel water bevat wordt, het zwaartepunt boven de navelstreng is, moet zij noodwendig met het hoofd naar beneden zakken, hetwelk naderhand door de grootere omvang der vrucht en de naar evenredigheid verminderde hoeveelheid water minder mogelijk is. Bij het ontleedkundig onderzoek in de eerste maanden vindt men ook verre de meeste vruchten met het hoofd benedenwaarts. Dit neemt echter niet weg dat de vrucht door verschillende bijzondere omstandigheden eene ongewone ligging aanneme. Zie BAUDELOCQUE, I. Decl. §. 238—240. 5. edit. p. 223. seqq. DUGES in de *Revue medicale ou Journal de clinique de l'Hotel Dieu*, Paris, 1826, Mars.

tegen den bulk opgetrokken, en de beenen meestal tegen de dijen geplaatst, of ook over elkander gekruist.

HARVEY, *exercitationes etc.*

P. A. BOEHMER resp. MADAI, *anatome ovi humani foecundati etc.* Halae, 1763.

ROEDERER, *de foetu perfecto etc.*

WRISBERG, *Descriptio anat. embryonis.*

FR. AUG. WALTER, *annotat. academicae. etc.*

AUTENRIETH, *supplementa ad historiam embryonis humani* Tubingae, 1797. 4.

FR. MECKEL, *Abhandlungen aus der menschlichen und vergleichenden Anatomie und Physiologie.* Halle, 1806. S. 227. fgd.

OSIANDER'S *Hebammenbuch etc.*

J. F. MECKEL, *Handb. der menschlichen Anatomie*, 4 B. *Geschichte der Foetus.* Halle, 1820. 8.

Alsmede de werken van SMELLIE, ALBINUS, JOHNSON, HUNTER en DENMAN.

III. *Van eenige eigendommelijkheden der menschelijke vrucht in het bijzonder.*

§. 172.

Deze eigendommelijkheden, waartoe eigenlijk reeds alles, wat tot hiertoe over de vrucht gezegd is, gerekend kan worden, zijn, naar de verschillende trappen van ontwikkeling, die de kiem in zeker opzigt moet doorloopen, zeer menigvuldig; doch zij verdwijnen vroeger of later na de geboorte.

§. 173.

De levensverschijnselen van de ongeborene vrucht zijn gering in getal en omvang; alle hare levensbewegin-

gen, in zoo verre zij als tegenwerking tegen uitwendige invloeden moeten beschouwd worden, worden alleen door de warmte, het bloed en het lamsvocht voortgebracht. De werkzaamheid van zeer vele gewigtige deelen des ligchaams is of geheel fluimerend, of zij openbaart zich nog op eene geheel eigenaardige wijze. (*)

§. 174.

De voeding der vrucht schijnt, om vele redenen, in de verschillende tijdperken der zwangerheid, ook op eene verschillende wijze plaats te hebben; en wel in den beginne door de vloeistof van het navelblaasje, en later door de vochten der moeder, in het baarmoederlijk gedeelte des moederkoeks uitgestort, en door het lamsvocht, te geschieden.

§. 175.

De overgang der vloeistof van het navelblaasje in het ligchaam der vrucht, wordt op zeer verschillende wijzen verklaard. De fappen der moeder, door de fijnste vaattakjes van het vruchtgedeelte van den moederkoek op eene nog onbekende wijze opgenomen, * komen in de navelader, van daar in de holle ader, en uit deze in het hart van de vrucht. Van het hart wordt het bloed door alle deelen des ligchaams verspreid, de voedende bestanddeelen daarvan tot de vorming en den wasdom der vrucht gebezigd, en het overige, door de navellagaderen, in den moederkoek

(*) Daar de vrucht zich, nadat de hand in de baarmoeder gebragt is, terug trekt, schijnt het gevoel bij dezelve reeds werkzaam te zijn.

teruggevoerd, om aldaar weder veranderd en vernieuwd te worden. — Het lamsvocht komt door de opflorping der huid, en, (bijaldien het door den mond naar binnen dringt) ook door het darmkanaal in het ligchaam.

F. LOBSTEIN, t. a. pl.

Dr. OKEN, in de *Salzb. med-chir. Zeitung*, 1805. t. a. pl.

A. BRILL, *de humore lacteo in placenta humana*. Gron. 1768. 4.

DUFAY, *Essai etc.* p. 52.

H. VAN DEN BOSCH, *de liquore amnii*. Ultraj. 1792. 4.

* De proeven van WILLIAMS „omtrent den overgang van het bloed der moeder tot de vrucht” zijn van een bijzonder aanbelang. Zie FRORIEP's *Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilk.* N^o. 290. S. 52.

§. 176.

Wegens de vernieuwing des bloeds door de navelvaten en de vaten des moederkoeks, behoeft het bloed der vrucht de longen niet te doorstroomen, waarin naderhand de verandering van het bloed plaats heeft. De kleine bloedsomloop sluimert derhalve bijna geheel en slechts de *groote* wordt regelmatig volbragt. De deelen, welke dezen bloedsomloop, die der vrucht bijzonder eigen is, (§. 157.) bevorderen, zijn: het *eironde gat* (*foramen ovale*) in het tusschenschot van de beide boezems van het hart, hetwelk eerst met het einde der zwangerheid gesloten wordt door een klapvlies, dat na de geboorte met dit tusschenschot zamengroeit; het *klapvlies van de holle ader* (*valvula Eustachii*), dat op het einde van het vruchtlevens verdwijnt; en de buis van BOTAI (*ductus arteriosus Botalli*), die de groote slagader met de

longslagader verbindt, en na de geboorte in een digten band overgaat; en eindelijk de reeds genoemde *aderlijke buis* (*ductus venosus Arantii*).

§. 177.

Het *hart* (dat in het bebroede vogelei zeer vroeg als kloppend punt gezien wordt) is bij de vrucht in evenredigheid zeer groot; doch de voorste kamer van het hart is in de eerste maanden nog niet gevormd. De *long* is bruinachtig van kleur, klein, digt, zonder lucht, foortelijk zwaarder dan het water, en hare bloedvaten zijn weinig uitgezet. De *luchtpijp* is naauw, en met slijm en lamsvocht gevuld. De *herfenen* hebben, met betrekking tot de overige deelen, eene vrij aanmerkelijke grootte; zij zijn echter weeker dan bij volwasfenen, en bestaan bijna alleen uit de graauwe zelfstandigheid.

§. 178.

De helderroode, voor de vrucht zeer belangrijke *lever*, is bij eene nog jonge vrucht buitengemeen groot, naar boven gedrongen, en vult de beide zijden van de buikholte; zij ontvangt haar bloed onmiddellijk uit de navelader (§. 157.) in groote hoeveelheid. De *galblaas* is klein, en bevat eerst op het einde der zwangerheid eene zachte, bruinkleurige gal, die nog de gewone fcherpte mist. Wegens de bijzondere wijze, waarop de vrucht wordt gevoed (§. 174.), is de *maag* naauw, klein, rond, en met eene geelkleurige vloeistof gevuld. In het *darmkanaal* kan men eerst op het einde der zwangerheid het klapvlies van BAUHINUS, en het onderscheid tusfchen de dikke en dunne darmen bemerken; het wormwijze aanhangfel is echter reeds vroeger voorhanden. In het

darmkanaal vindt men eene slijmachtige, geelachtig groene vloeistof, zonder reuk, van een bitteren smaak, die allengskens dikker en in den laatsten tijd der zwangerheid zwartachtig wordt, *pekstof* (*meconium*) genoemd, over wier ontstaan men het nog niet geheel eens is. — Onder de beenderen is slechts het rotsachtig gedeelte des slaapbeens, dat het zintuig des gehoors bevat, volkomen gevormd.

§. 179.

Er zijn nog eenige werktuigen aanwezig, wier bestemming men niet naauwkeurig kan bepalen, die echter alleen voor de ongeborene vrucht schijnen te dienen, dewijl zij na de geboorte afnemen of verdwijnen. Daartoe behoort: *a*) de *borstklier* (*glandula thymus*), een langwerpig, roodachtig wit ligchaam, dat met eene weiachtige vloeistof opgevuld is; *b*) de *schildklier* (*glandula thyreoïdea*), die zoo groot is, dat zij dikwijls eene krop schijnt te vormen, en buitengewoon vele vaten ontvangt; *c*) de *bijnieren* (*glandulae s. capsulae suprarenales*), die in het eerste tijdperk des levens de meeste betrekkelijke grootte hebben; *d*) het dunne, zeer teedere *oogappelvlies* (*membrana pupillaris*), hetwelk slechts op het midden der zwangerheid zichtbaar is, en met het einde daarvan (§. 266.) weder verdwijnt. (*)

(*) Men raadplege over de verrigting dezer deelen (behalve de door den schrijver vermelde geschriften) SINCH. LUCAE, *anatomische Bemerkungen ueber Divesticula am Darmkanal und über die Höhlen des Thymus*. Nürnberg. 1813. 4. Dezelfde, *anat. Unters. der Thymus in Menschen und Thieren*. Franckf. a. M. 1810 en 1811. 4.

CHR. JAC. TREW, *de differentiis hominis nati et non nati*. Altdorf, 1736.

A. B. KOELPIN, *de foetus et adulti differentia*. Gryph. 1764.

ANT. ET FR. ROESSLINN, (*fratres*) *de differentiis inter foetum et adultum*. Argent. 1783.

WRISBERG, *descriptio anatomica embryonis*. j. c.

DANZ, *Grundriss etc.*

AUTENRIETH, *supplementa ad historiam embryonis humani*. j. c.

F. SENF, *de incremento ossium foetus*. Halae 1801. 4.

G. F. SCHUETZ *praes.* AUTENRIETH, *Diss. sistens experimenta circa calorem foetus et sanguinem ipsius*. Tub. 1799. 8.

TH. KESTNER, *Diss. de nexu matris cum embryone*. Goett. 1802. 4.

H. S. HYMANS, *de hepatis in embryone magnit. causa ejusque functione in foetu*. Dordr. 1821. 4.

A. F. HECKER, *ueber die Verrichtungen der kleinsten Schlagadern etc. der Schilddrüse und Brustdrüse, des Milzes, der Nebennieren und der Nachgeburt*. Erfurt, 1790. 8.

C. GRUNER, *de usu glandulae Thymi etc.* Jena, 1792. 4.

J. F. ACKERMANN, *progr. de corporis thymici vera functione*. Heidelb. 1814. 4. J. C. A. MAYER, *de secundaria*

quadam glandulae thyreoideae utilitate. Francof. a. V. 1785. 4. J. C. LODER, *progr. examen hypotheseos de*

glandulae thyreoideae usu. Jena, 1797. 4. J. A. SCHMIDT-MÜLLER, *über die Ausführungsgänge der Schilddrüse,*

Sendschreiben an Soemmering. Landsh. 1804. 8. AD. MAAS, *de glandula thyreoidea etc.* Würzb. 1810. 8.

J. F. ACKERMANN, *de corporis thyreoideae vera functione*. Heidelb. 1811. 4. J. C. A. MAYER, *de glandulis supra-*

renalibus. Francof. a. V. 1784. N. RIEGELS, *de usu glandulae suprarenalis etc.* Kopenh. 1790. 4. HEDENUS,

J. D. HERHOLD, *physiologische Untersuchungen über das Leben, besonders des menschlichen Foetus etc.* Kopenhagen, 1803.

LOBSTEIN, t. a. pl.

F. MECKEL, *Abhandl. aus der menschl. und vergl. Anat.* t. a. pl. en in zijne *Beiträge zur vergleichenden Anatomie*. I Bdes. Ites Heft. S. 57 fgde.

J. DOELLINGER, *Beiträge zur Entwicklungsgeschichte des menschlichen Gehirns*. Frankf. a. M. 1814. fol.

FR. FRIED. TIEDEMANN, *Anatomie und Bildungsgeschichte des Gehirns im foetus des Menschen*. Nurnb. 1816. 4. met platen.

W. VROLIK, *Oratio de foetu humano animalium minus perfectorum formas referente*. Gron. 1829.

tractatus de glandula thyreoidea etc. Viennae, 1822. 8.

K. F. HEUSINGER, *ueber die Bau und die Verrichtungen der Milz*. Eisen. 1817. 8. F. GEHLHAUS, *ueber den Nutzen der Milz*. Bamb. 1818. 8. TIEDEMAN EN GMELIN, *Versuche über die Wege auf welchen substanzen aus dem Magen ins Blut gelangen, ueber Milz etc.* Heidelb. 1820. — Over de voeding zie men ook J. F. MUELLER, *diss. sistens etc. ovi, nutritionis etc. historiam*. Jena, 1780. in SCHLEGEL's *sylloge*. J. H. VOGEL, *Comment. qua foetum in utero non liquore amnii sed sanguine etc. nutrirı ostenditur*. Gött. 1761. 4. B. N. G. SCHREGER, *de functione placentae uterinae ad SOEMMERING. epist.* Erl. 1799. 8. Alle de door deze en andere schrijvers opgegevene theorien en verklaringen omtrent de voeding en verrigting van sommige deelen der vrucht, leeren ons wel hoe die kon plaats hebben, maar niet hoe die wezenlijk geschiedt.

IV. *Van de misvormingen van het ei
en van de vrucht.*

§. 180.

Ligchamen, welke zich uit de teeldeelen ontlasten of daarin gevonden worden, die men als misvormingen van het gansche ei beschouwen moet, en waarin men zelfs geen spoor van de vrucht meer vindt, noemt men *zuigers* (*molae*). Elke zuiger is een ontaard ei, dat na de bevruchting in de baarmoeder is gekomen; te onregte brengt men die ligchamen (*concrementen*) tot de zuigers, welke zonder bevruchting in de baarmoeder gevormd en opgesloten zijn.

§. 181.

Als soorten der zuigers onderscheidt men den bloedigen (*mola cruenta*), den waterbevattenden (*mola aquosa*), den lucht bevattenden (*mola ventosa*), naardat de vliezen van het ei met bloed, water of lucht gevuld zijn; den tros- of blaasachtigen (*mola botryoides, vesicularis, racemosa*), als de moederkoek in waterblaasjes (*hydatides*) veranderd is; den vleeschachtigen en peesachtigen (*mola carnosa et tendinosa*), als de met de baarmoeder verbondene vliezen van het ei in vleeschklompen overgaan, of een peesachtigen aard aannemen; den kalkachtigen (*mola calcarea*), als er zich eene kalkaardige stof in en aan de eivliezen vastzet, en den zamengestelden (*mola dissimilaris*), als er zeer verschillende, van elkander afwijkende zelfstandigheden te gelijk, als haren, vliezen, kleine beenderen, vleesch-

achtige, peesachtige of kalkaardige en dergelijke deelen zich in de plaats van het ei vertoohen. (*)

J. B. DE LAMZWEERDE, *Hist. nat. molarum uteri*. L. B. 1686. cum. fig. 8.

HAUKOPF, *Diss. de mola etc.* Goett. 1764.

BUECHNER, *Diss. generatio molarum ex principiis novis deducta*. Halae, 1769.

BAUMER, *Progr. de placentarum uterinarum in molas vesicarius mutatione*. Giess. 1776.

STARK'S, *Archiv etc.* 4ten Band. 1. St. S. 110. fg.

OSIANDER'S *Hebammenbuch*. S. 303.

A. L. G. ZECHIN, *Diss. de molarum conformatione*. Goett. 1818. 8.

§. 182.

Wanneer door nog niet genoeg bekende oorzaken de voeding en de vrije ontwikkeling der vrucht verhinderd worden, (waarover welligt doelmatige proeven op dieren en waarnemingen op buideldieren, kanguru's enz. nadere ophelderingen zullen kunnen verschaffen) en de vrucht als het ware op een der lagere trappen van ontwikkeling (§. 172.) staan blijft, dan ontstaan er afwijkingen van den gewonen vorm, die men gewoonlijk *ziekten der eerste vorming* (*vitia primae conformationis*) noemt.

§. 183.

Wanneer zulk een gebrek der vorming uitwendig zeer duidelijk is, zoodat de gedaante van het ligchaam der

(*) Onderscheidene soorten van zuigers vindt men afgebeeld bij HALLER, *Elem. physiol.* Tom. VIII. p. 231. HALLER, *de monstribus in Opusc. min.* Laus. 1762—1768. 4. Tom. III. — RUISCH, *Thesaurus etc.* pl. V. afb. 5. 6. *Observat.* 27. fig. 24.

vrucht buitengewoon is veranderd (hetwelk echter zeldzaam het geval is), dan noemt men dit *wanſtaltigheid* (*conformatio monstrosa*) of *misgeboorte*; *monster*; (*monstrum*). Soms heeft b. v. eene vrucht een dubbeld hoofd, een dubbeld lijf, of meer armen en voeten dan het behoort (*monstra per excessum*); of er ontbreken gewichtige deelen aan de vrucht, b. v. het hoofd ontbreekt geheel of gedeeltelijk, de ledematen of de borst en hare ingewanden zijn gebrekkig (*monstra per defectum*), of er zijn twee of drie vruchten met elkander zamengegroeid, hetwelk op verschillende wijze of op verschillende plaatsen des ligchaams kan gebeuren. (*) (†)

(*) Het is voor den verloskundige van het grootste belang, met de meest voorkomende wanſtaltigheden bekend te zijn, en dezelve steeds voor den geest te hebben; want offchoon zij ook dikwijls geenen invloed op den gang der verlossing hebben (zoo als bij voorbeeld de *acephali*), zoo behoort echter de verloskundige dezelve te kennen, dewijl hij ze anders gemakkelijk voor andere deelen (bij voorbeeld voor de voorliggende moederkoek) zoude kunnen houden, en daardoor aanwijzingen zouden kunnen opvolgen, die voor de vrouw nadeelig konden zijn.

De oorzaken der verkeerde vorming der vrucht liggen nog geheel in het duister, zelfs weten wij niet of zij alleen bestaan (zoo als FRORIEP §. 182 zegt) in eene verhindering van den vrijen wasdom, dan of derzelver grond reeds gelegd wordt op het oogenblik der eerste wording. HALLER, *Opusc. min.* III. cap. IX. p. 17. sq. 152. sq. TREVIRANUS, *Biologie*. Th. III. p. 443—459. — Alhoewel de natuur in het vormen van monsters in het algemeen geen vasten regelmaat schijnt te houden, moeten wij ons echter tevens verwonderen over de overeenkomst

- E. ELBEN, *de aencephalis, s. monstros cordis carentibus*.
Met 22 pl. Berlin, 1821. gr. 4to.
- K. W. FD. SCHLEGEL, *Diss. de aencephalorum historia et origine*. Berl. 1812. 4.
- F. TIEDEMANN'S *Anatomie der kopflosen Missgeburten*.
M. G. K. Landsh. 1813. fol.
- G. SANDIFORT, *Ontleedkundige beschrijving van twee hersenlooze misgeboorten, in de genees-, heel-, verlos-, schei- en natuurkundige verhandelingen der eerste klasse van het Koninkl. Nederl. Inst.* 1. Afl. met 4 pl.
- G. SANDIFORT, *Ontl. beschr. enz. over twee hoofdelooze misgeboorten; aangeh. werk.* 3 Afl. met 11 pl.
- G. VROLIK, *over de zonderlinge misvorming eener vrucht enz., aangeh. werk.* 2. Afl. met 5 pl.

die somwijlen bij dezelve plaats heeft. Dus is bij voorbeeld het gespleten gehemelte meest altijd vereenigd met eene gespletene bovenlip, en zelfs zijn deze meest altijd gepaard met een meerder getal vingeren en eene dubbelde baarmoeder.

(†) „ Tot de door FRONIER het laatst genoemde soort „ van misvormingen behooren de gevallen, waarin men „ eene of meer vruchten geheel en al in de buikholte of „ door de huid van eene andere vrucht ingesloten vindt. „ Men noemt dit *monsterachtige insluiting (inclusio monstrosa)*. De ingeslotene vrucht is altijd slechts zeer „ onvolkomen en onregelmatig gevormd, doch de insluitende meestal overigens welgemaakt. Zie A. CAPADOCE, „ *de foetu intra foetum. Diss. inaug.* Leid. 1818. 8. — „ *Memoire sur la monstruosité par inclusion, par le Dr.* „ OLLIVIER (D'ANGERS); getrokken uit de *Archives générales de médecine.* — Deze aantekening is van VAN ERPECUM.

§. 184.

Tot de gebreken der vorming behooren ook de dikwijls voorkomende *wanstaltigheden* van bijzondere leden en deelen (*fabrica aliena et situs mutatus*), b. v. elke *scheiding* van zulke deelen, die eigenlijk zamenhangend zijn moesten: als de splijting der lippen en van het gehemelte, de gespletene ruggegraat, met vereenigde schaambeenderen, met de gevolgen daarvan, * enz.; elke *vereeniging* van deelen, die in den regelmatigen toestand gescheiden zijn moesten: als de zamengroeiing der oogleden, der openingen van den neus, van den mond, van de ooren, van den aars, enz.; ophooping van water in onderscheidene holigheden van het ligchaam, eene sterke kromming van de ruggegraat en van de ledematen, horrelvoeten, enz.; als ook de aangeborene huidziekten en het bleinachtig uitslag (*pemphigus neonatorum*), enz.

* G. VROLIK, *Memoires sur quelques sujets intéressants, d'anatomie et de physiologie, traduits du Hollandais, par M. FALLOT, avec 13 pl.* Amst. 1822. 4.

Dezelfde, *Verhandelingen over het buitenliggen der blaas enz.*, in *Verh. van het K. N. Instituut*. 2. aflev.

J. P. KLUYSKENS, *Waarneming over eene ongemeene wanstaltigheid aan de vingers van beide de handen*, in de aangehaalde *Verh. van het Kon. Ned. Instituut*. 1ste aflev.

P. LASSUS, *Heelkundige Ziektekunde*. Amst. 1827. 3 St. vert. door A. VAN ERPECUM, die aldaar zeer goed over het aangeboren blaasgebrek handelt.

§. 185.

De wangestalten en meer andere misvormingen, veranderen en belemmeren den voortgang der verlossing,

of maken de herkenning daarvan moeilijk , zeer vele misvormingen echter , vooral die , welke dikwijls in het inwendige des ligchaams plaats hebben , als er bij voorbeeld ingewanden aan de eene zijde liggen , die eigenlijk aan de andere zijde moesten liggen , en de wanstaltigheden der huid (de zoogenaamde moeder-vlekken , uitwasfen , enz.) hebben gewoonlijk op den gang der verlossing niet den minsten invloed.

§. 186.

Dat overigens sommige gebreken van den vorm , door eene zekere aandoening van de verbeeldingskracht (*het verzien*) der zwangere vrouw , kunnen veroorzaakt worden , gelijk men gemeend heeft en ten deele nog meent , moet men , bij een onbevangen en bedaard onderzoek , met regt in twijfel trekken. (*)

(*) Offchoon het vooral bij vrouwen niet geraden is de misvormingen der vrucht aan verbeelding toe te schrijven , en het ook geenzins waarschijnlijk is , dat deze alleen de oorzaak derzelve is , dewijl ook bij de dieren , zelfs bij hen , die uit een ei geboren worden , misgeboorten plaats hebben , zoo pleiten echter de getuigenissen van be-roemde schrijvers voor dit gevoelen ; de natuurleer der voortteling is ons te weinig bekend om de zaak stellig voor onmogelijk te verklaren ; de leer der sympathien ligt ook nog te veel in het duister , en vanwaar komt de verandering der melk op het oogenblik van eene schrik der moeder , welkers genot stuiptrekkingen en den dood des zuigelings kan veroorzaken ? — *Felix ille qui rerum potuit cognoscere causas.* —

Bij de door FRORIEP aangehaalde schrijvers kan men nog voegen: HALLER, *Opusc. minora anat. argumenti*. Bern, 1762—68. 8. J. R. F. AUTENRIETH, *Supplementa ad his-*

toriam embryonis humani. Tüb. 1797. 4. BH. CH. FAUST,
ALB. AB. HALLER, *Diss. duorum monstrorum anatome et
de causis monstrorum ulterior disquisitio.* Goett. 1742.

J. B. ENGELHARDT, *Diss. sistens morbos hominum a prima
conformatione usque ad partum.* Jenae, 1792.

S. T. SOEMMERING, *Abbildungen und Beschreibungen
einiger Missgeburten etc.* Mainz, 1791. fol. m. pl.

KNACKSTEDT, *anatomische Beschreibung einer Missgeburt,*
Petersb. 1791.

SCHWEICKHARDT, *Beschreibung einer Missgeburt.* Tüb. 1801.

*anat. Beschreibung zweyer Missgeburten nebst Unter-
suchung. v. d. wahrscheinl. Entstehen der Missgeburten
überhaupt.* Gotha, 1780. 8. M. J. MACQUELYN, in het
Geneeskundig Magazijn van STIPRIAAN LUISCIUS enz.
I. Deel. 2. Stuk. bl. 1—27. ARN. WIENHOLT'S, *sieben
Vorlesungen über das Entstehen der Missgeb. nebst Be-
schreibung und Abbildung einer zwillings Missgeburt.*
Rudolst, 1806. 8. J. CLESIIUS, *Etwas für Eheleute über
Entstehen und Verhütung der Missgeburten etc.* Hadamar,
1812. 8. G. F. FLEISCHMAN, *de vitiis congenitis circa
thoracem et abdomen etc.*; m. 5. pl. Erl. 1810. gr. 4. J. F. MEC-
KEL, *de duplicitate monstrosa.* Halle en Berlijn, 1812. 4.
J. F. BLUMENBACH, *de anomalis et vitiosis quibusdam nisus
formativi aberrationibus* Comm. m. 2. pl. Goett. 1813. 4.
E. BARTHELS, *de monstrorum origine.* Breslau, 1816.
C. LOBSTEIN, in *Repertoire general d'anatomie et de phy-
siologie pathologiques etc.* Paris, 1826. 4. m. 5 pl. *Jour-
nal für Chirurgie und Augenheilkunde von C. GRAEFE und
V. WALTHER.* IX. B. 3. St. Berl. 1826. 8. TIEDEMAN und
TREVIRANUS, *Zeitschrift für Physiologie.* II. Band. 1. H.
Halle, 1826. 4. Madame BOIVIN, *Nouvelles Recherches
sur l'origine, la nature et le traitement de la mole vesi-
culaire etc.* Paris, 1827. 8. m. 1 pl.

VINC. MALACARNE, *de' mestri umani de' caratteri fondamentali su cui ne se stabilirono la classificazione e delli indicazioni che presentano nel parto.* Padova, 1801.

JOH. BANG'S, *Abhandlung über eine Missgeburt, etc. nebst Vermuthungen über d. Ursachen der Missgeburt etc. Aus dem Dänischen.* Kopenh. 1801. 8.

J. C. ZIMMER, *physiologische Untersuchungen über Missgeburten, nebst Beschreibung und Abbildung einiger zwillings Missgeburten.* Rudolstadt, 1806. 8.

D. H. BUSCH, *Beschreibung zweier merkwürdiger menschl. Missgeburten etc.* Marb. 1803. 4. m. pl.

A. G. OTTO, *monstrorum sex humanorum anatomica et physiologica disquisitio.* Francof. ad Viadr. 1811. 4to. met platen.

F. G. GMELIN, *allgemeine Pathologie des menschlichen Körpers.* Tub. 1813. 8. S. 313.

JOH. FR. MECKEL, *Handbuch der pathologischen Anatomie.* I Bd. Leipzig, 1812. 8. S. 44.

JOH. FEILER, *Ueber angeborne menschliche Missbildungen im Allgemeinen und Heimaphroditen in's besondere, Ein Beiträg zur Physiologie, Pathologie und gerichtl. Arzneiwissenschaft.* Landshut, 1820. 8. m. pl.

OSIANDER'S *Handbuch der Entbindungskunst.* I B. 2 Abth. XVII. Kapitel. S. 712. ffg.

J. F. BURDACH in zijn zesde *Berichte von der K. anatomischen Anstalt zu Königsberg.* Leipzig, 1823. 8. m. pl, geeft een zeer belangrijk overzicht over zamengegroeide en dubbelde misgeboorten.

VIERDE HOOFDDEEL.

VAN DE TEEKENEN DER ZWANGERHEID.

§. 187.

Om te kunnen bepalen of eene vrouw al of niet zwanger, en van welken aard de zwangerheid is, geeft men acht op de verschijnselen, waarvan men, door eene langdurige ondervinding weet, dat zij de zwangerheid gewoonlijk verzellen, en die daarom *teekenen der zwangerheid* genoemd worden. Daar echter bijna alle deze teekenen zelfs de van §. 139 tot 150 opgegevene, dat is, de door de zwangerheid verwekte veranderingen van het ligchaam der vrouw, die men door de zintuigen kan waarnemen, ook door andere omstandigheden of oorzaken, bij niet zwangere vrouwen kunnen worden voortgebracht, zoo verdienen zij van den kant van den verloskundige allezins eene bijzondere en naauwkeurige beschouwing.

§. 188.

De teekenen van de onlangs plaats gehad hebbende bevruchting, die men gemeenlijk bij of kort na een vruchtbaren bijslaap waarneemt, hoe vele ook in getal, zijn zoowel gezamenlijk, als in het bijzonder, zeer bedriegelijk. Daartoe behoort een ongewoon verhoogd gevoel van wellust bij den bijslaap, eene ligte huivering, die zich van uit het onderlijf door het ligchaam verspreidt, vliegende hitte, eene eenigzins pijnlijke kramp in het onderlijf, gevoel van kwalijkbevinding, ligte duizeligheid, dikwijls zelfs flauwten en misfelijkheid onmiddellijk na den bijslaap,

opneming en terughouding van het mannelijk zaad, en de geneigdheid om de beenen over elkander te slaan. (*)

KNEBEL, *Grundriss einer Zeichenlehre etc.* S. 364.

I. *Van de teekenen der eenvoudige zwangerheid.*

§. 189.

De verdeeling van de teekenen der zwangerheid in zekere en onzekere, is ondoelmatig, daar wij niet een enkel teeken kennen, dat ten allen tijde der zwangerheid volkomen zeker en onbedriegelijk was. Tegen de verdeeling in toevallige en noodwendige kan men insgelijks veel inbrengen. Een oppervlakkig overzicht levert ons de volgende verdeeling op: 1) *Teekenen*, die wij *uit de voornaamste werktuigen* des ligchaams, met uitzondering van de teeldeelen, verkrijgen; 2) *Teekenen*, die wij *door zekere plaatselijke verschijnselen* verkrijgen; 3) *Teekenen*, die ons *de teeldeelen* opleveren; en 4) *Teekenen*, die men bij het kind waarneemt.

§. 190.

Tot de teekenen der eerste soort behooren: a) *toevallen van aandoening van het zenuwgestel*: huivering en kramp in het onderlijf en in het overige ligchaam, met daarop volgende vliegende hitte (§. 188.)

(*) Sommige voegen hier nog bij, eene eenige dagen durende pijn in de liesch, of aan het binnenste der heup, en een zaadachtigen smaak in den mond. Alle de opgenoemde teekenen echter zijn van geringe waarde, en de herkenning der zwangerheid in de eerste tijdperken vooral zeer moeilijk. Zie W. J. SCHMIDT, *Samml. zweifelhafter Schwangerschaftsfälle u. s. w.* Wien, 1818. S. 138. fig.

loomheid, duizeligheid, flauwte, afkeer van den bijslaap, (sommijlen echter ook *furor uterinus*) kwade luim, hooge aandoenlijkheid van het gevoel en den reuk, neiging tot ongewone gemoedsbewegingen, in sommige gevallen ook stuipen, tandpijn, hoofdpijn, het ophouden van voorheen aanwezige ziekten, enz.; *b) toevallen van aandoening van den omloop der vochten*, en van de *ademhalings-werktuigen*: b. v. kortademigheid, bloedophooping van allerlei soort, neusbloeding, bloedspuwing, bloedbraking, enz., veranderingen in den stondenvloed (§. 292.); *c) toevallen van de spijsverteerings-werktuigen*: gevoeligheid in de maagstreek, opzetting van den buik door winden (naar BAUDELOCQUE), misfelijkheid, speekselvloed *, walging, braking, (vooral des morgens vroeg), afkeer van zekere spijsen, zonderlinge trek tot vele eetbare en niet eetbare dingen, kolijk, verstopping, enz.; *d) toevallen der pisafscheidende en pisonthastende werktuigen*, zeer menigvuldige drang tot pislözing, somtijds onwillekeurige of ook wel pijnlijke, moeilijke, belette pisonthasting enz.; *e) toevallen van de werkzaamheid der huid*; vermeerderde of verminderde afscheiding, eene zuurachtig riekende uitwaseming, verandering van de kleur der huid op verschillende plaatsen; belroos, uitflag op het voorhoofd en op het gansche gelaat, dat gewoonlijk bleek en als ingevallen is, vergrooting en verdonkering der zoogenoemde moedervlekken, vlekken (levervlekken) in het gelaat en op den buik, enz. — Tot de teekenen der tweede soort (die ten deele *van die der eerste en derde soort afhangen*), behooren: uitzetting of zwelling van den hals en dikwijls ontwikkeling van eene krop, pijn

ter zijde van den venusheuvel en in de liesstreek (§. 105.), zwelling en uitzetting van de billen in den eersten tijd der zwangerheid, zwakte, beving en slaap der voeten, de beenen en de schaamlippen, aderspatten, vooral aan de binnenzijde der beenen. — Uit alle deze teekenen der eerste en tweede soort kan men geen zeker besluit ten aanzien der zwangerheid opmaken, dezelve kunnen zoowel door onderscheidene ziekelijke aandoeningen, als door de zwangerheid te weeg gebragt worden. — Daar zij bovendien bij de wezenlijke zwangerheid somtijds ontbreken, zoo kan men uit hun bestaan niet tot het bestaan der zwangerheid, noch uit hun afwezen niet tot het niet bestaan der zwangerheid met zekerheid besluiten.

Het uitspuwen van een wit taai speekfel, dat zich op den vloer in ronde vlekken uitbreidt, wordt in America (waar men dit verschijnsel „*spitting*”, „*English shillings*” of „*spitting cotton*” noemt), als een stellig teeken beschouwd, en DEWEES zegt, dat hij het bijna altijd als zoodanig heeft bevonden. (DEWEES, *a compendious system of midwifery*.)

§. 111.

Tot de teekenen der derde soort moet men nu brengen: *a) het wegblijven of het veranderen van den stondenvloed* (§. 113. 114.); doch deze is somtijds ook door andere (ziekte-) oorzaken dan de zwangerheid onderdrukt, en daarentegen neemt men ook nu en dan in de zwangerheid een volkomen geregelde stondenvloed waar, gelijk het ook bekend is dat eenige vrouwen alleen in de zwangerheid de stonden hadden, die alsdan volkomen regelmatig waren; *

b) zwelling van den onderbuik; volgens de (§. 140—149.) opgegevene orde, met het weder platter worden in de tweede maand (§. 141.) en de langzame veranderingen van den navel verbonden; dit is een niet ongewichtig teeken. (Intusfchen gelden al de hiertoe behoorende veranderingen niet bij zulke vrouwen, die een hangbuik hebben, en bij deze moet men op den graad van het overhangen, enz. acht geven). Buiten-dien kunnen ook ophoopingten van water, uitwasfen, polypen, verhardingen in de baarmoeder en het onderlijf, enz. eene dergelijke zwelling te weeg brengen.

c) De veranderde ligging van de baarmoeder; deze is, als zij in de (§. 140—149.) opgegevene orde plaats heeft, evenzeer een niet onbeduidend teeken. Opgezette darmen, flapheid der fcheede, van de ronde banden en de bekleedfelen des buiks, als ook eene te fterk voorwaarts gebogene ruggegraat, veranderen echter nu en dan ook de doorgaans niet zeer bestendige plaatfing van de baarmoeder; *d) veranderingen in de gedaante en rigting van het fcheededeel der baarmoeder* (§. 140—149.) zijn gewichtige teekenen (als men altijd het oog vestigt op de eigenaardigheden van bijzondere perfonen, bij welken het fcheededeel buiten de zwangerheid zeer kort of zeer lang is); doch wanneer deze veranderingen niet in de juiste orde plaats hebben, zijn dezelve ook geene onbedriegelijke teekenen. Men vindt toch de verandering van de dwarfe spleet in eene ronde opening ook enkele malen buiten de zwangerheid; en bij vrouwen, die meermalen zwanger geweest zijn, waar geene volkomene dwarfe spleet meer bestond, kan dit teeken alleen met wijziging van dienst zijn; ook blijft bij vele dezer

vrouwen, die meermalen zwanger geweest zijn, de dwarse spleet zelfs gedurende de zwangerheid duidelijk.

e) *Het voorliggende deel des kinds.* Het hangt van de engte des bekkens, van de ligging des kinds, en van het getal der vruchten af, of dit teeken vroeger of later van dienst kan zijn; dikwijls bespeurt men het in het geheel niet duidelijk. Groote gezwellen in de holte van het bekken en in den onderbuik kunnen toch ook een volkomen gelijksoortig verschijnsel verwekken. Wordt evenwel het voorliggende deel zeer naauwkeurig gevoeld en onderscheiden, dan is dit wel het zekerste teeken der zwangerheid.

f) *De veranderingen in de borsten* behooren tot de onzekere teekenen, daar zij in de zwangerheid kunnen ontbreken, en buiten de zwangerheid door ziekelijke aandoeningen van de baarmoeder ten deele kunnen worden te weeg gebracht. (*)

OSIANDER'S *Resultate von Beobachtung an den Brüsten während der Schwangerschaft*, in zijne *Denkwürdigkeiten*. II. B. 2. St.

* BEYERLE in STEIN'S *Annalen der Geburtshülfe*. III. St. S. 166.

DEWEES, *a Compendious system of midwifery*. §. 237.

BAUDELOCQUE, *L'art des accouchemens*. Tom. I. p. 209.

(*) Offchoon bij sommige vrouwen enkele verschijnselen (b.v. het ophouden van te voren aanwezige ziekten, zoo als *chlorosis*, *hysterie* enz., de verandering van temperament, tand- en andere pijnen, zwelling van den hals enz.) de zwangerheid doen vermoeden, zoo zijn echter de zekerste en gewigtigste 1) het ophouden van de altijd geregelde stonden-vloed; 2) het geregeld evenredig uitzetten der buik; 3) het voelen van den bodem der baarmoeder;

§. 192.

Als teekenen der vierde foort, moeten wij de volgende opnoemen: *a) Beweging des kinds*. Deze is, als zij duidelijk bespeurd wordt, in de tweede helft der zwangerheid een zeker teeken. Door gezwollen, zakwaterzucht van den onderbuik, opzettingen, kramp en wormen in het darmkanaal kan er echter, vooral bij vrouwen die naar kinderen verlangen, ligtelijk eene gewaarwording, die naar de beweging van het kind gelijkt, en alzoo zeer ligtelijk eene misvatting, geboren worden. *b) De hartslag der vrucht*, die allereerst ** door den kundigen heelmeeester MAJOR te Geneve, die het oor onmiddelijk tegen den buik eener hoogzwangere vrouw hield, gehoord en van den polsflag der moeder onderscheiden is, en welken de Heer DE KERGARADEC daarna door het borsthoortuig of *stethoskoop* naauwkeuriger onderzocht en beschreven heeft. *** *c) Het verschijnsel*, door DE KERGARADEC onder den naam van *moederkoekskloppingen*, *kloppingen met een blazend geruisch*, opgegeven, eene klopping,

4) dat van de beweging des kinds en het zoogenaamd ballottement; 5) de veranderingen van het scheidedeel, benevens de meting van de baarmoeder of der lange as derzelve; hetwelk geschiedt door de eene hand aan de baarmoedermond en de andere aan den bodem te leggen. — Zonder het uit- en inwendig onderzoek met de hand is veelal geene stellige bepaling der zwangerheid mogelijk. Hoezeer het verzuim daarvan bedriegen kan, zie men b. v. in VON SIEBOLD's *Lucina*. IV. Band. S. 212. A. E. VON SIEBOLD, *Journal für Geburtshülfe, Frauenzimmer und Kinderkrankh.* IV. B. 3. St. S. 472. MOLL en ELDIK's *praktisch tijdschrift* enz. IV. Jaarg. 1. St. bl. 55—60. en II. Jaarg. 1. St. bl. 70.

die met een geluid van blazing verbonden, met den pols der moeder overeenstemmende, en bij eene vlakte van drie tot vier vierkante duimen bepaald is, zou van de vierde maand af bespeurd worden, en *schijnt* in de vaten van de baarmoeder, ter plaatse waar de moederkoek daaraan is vastgehecht, haren zetel te hebben. Dr. OLLIVRY te *Quimper* verzekert, dat hij, zijne hand onmiddellijk na de verlossing in de baarmoeder brengende, bevonden heeft, dat de plaats, waar hij voor de verlossing de ruischende klopping gehoord had, volkomen met de plaats der aanhechting van den moederkoek overeenstemde en dat het *geruisch op het eigen oogenblik ophield, toen de navelstreng werd doorgesneden.* * * * *

* „Deze kloppingen van het hart der vrucht zijn, even als bij volwasfenen, dubbelde slagen, doch zij zijn sneller en gewoonlijk eens zoo menigvuldig, als de pols der moeder (van honderd twintig tot honderd zestig in de minuut). Van de zesde maand af, en somtijds nog vroeger, hoort men ze duidelijk. De streek van den buik waar men ze hoort, is verschillend naar de plaatsing des kinds, en gewoonlijk van een vrij grooten omvang. Somtijds is deze plaats bijna een voet lang en drie of vier duimen breed; doch men kan altijd het eigenlijke punt, waarvan zij uitgaan, ligtelijk bepalen door de kracht van het geruisch, dat toe- of afneemt, naar dat men zich van dit punt verwijdert, of hetzelfde nadert,” enz. Somtijds hoort men het geruisch van deze slagen zelfs uren — ja dagen — lang niet, hetgene wel eens van de groote zwakte der hartslagen kan afhangen, doch waarschijnlijk nog meermalen daarvan, dat de vrucht op dien tijd van de vliezen van het ei verwijderd is en die met een gedeelte van haren rug

aanraakt; want om de slagen wel te hooren, moeten noodzakelijk de tronk van de vrucht, de vliezen, de baarmoeder en de wanden des buiks, met elkander in onmiddellijke aanraking zijn. Als er zich een gedeelte van het darmkanaal tusfchen de wanden des buiks en de baarmoeder plaatst, dan is dit genoegzaam om te beletten, dat de hartslagen gehoord worden, en dewijl het water een flechter geleider van het geluid is, dan vaste ligchamen, zoo moet ook het vruchtwater, wanneer het zich in te groote hoeveelheid tusfchen de vliezen en het ligchaam der vrucht bevindt, de overbrenging van het geluid belemmeren. (R. T. H. LAENNEC, *Traité de l'auscultation médiate etc. Seconde édition*. Paris, 1826. 8. Vol. II. p. 458).

** *Bibliothèque universelle*. Tome IX. Nov. Genève 1818.

*** *Mémoire sur l'auscultation appliquée à l'étude de la grossesse* par M. LEJUMEAU DE KERGADEDEC. Paris, 1822. — Ook in het Hoogd. Weimar, 1822. 8.

**** LAENNEC, *Traité de l'auscultation médiate*, 2. edit. Vol. II. p. 463.

OLLIVRY in *Journal général de médecine française et étrangère etc.* Paris, 1822. Juillet.

Gazette de santé. 1821. N°. 12. N°. 16.

HENNE in VON SIEBOLD'S *Journal für Geburtshülfe u. s. w.* VIII. Band. 4. St. S. 186. — MOLL en ELDIK'S *praktisch tijdschrift enz.* 7. Jaarg. 6. St. p. 570.

PROBART in *The medical repository and review*. London, 1828. Mai.

§. 193.

De proeven, ter bepaling van het geslacht der vrucht genomen, hebben bijna allen gefaald, en de teekenen die men tot deze bepaling heeft opgegeven: b. v. dat eene grootere opzetting in de regterzijde een jongen, en in de linkerzijde een meisje doet ver-

moeden, dat bij de dragt van een jongen de melk, die in de borsten der moeder bevat is, dikker, en bij die van een meisje dunner zijn zoude; — zijn volstrekt bedriegelijk en ongerijmd. Even zoo min kan men zekere gevolgtrekkingen maken uit de waarnemingen omtrent het wel of kwalijk bevinden der zwangere vrouw en omtrent den tijd der bezwangering (met betrekking tot den vroeger of later wederkomen den stondenvloed, of tot het wasfen of afnemen der maan).

OSLANDER'S *Denkwürdigkeiten für die Heilkunde etc.*

II. B. 2. St. S. 394.

Dezelfde, *Annalen etc.* II. B. 2. St. S. 231.

§. 194.

Er bestaat alzoo geen enkel volstrekt zeker teeken, dat alleen en in alle gevallen het bestaan der zwangersheid beflissen kan, behalve de werkelijke aanvang van den geboortearbeid, waarbij de deelen des kinds in den geopenden baarmoedermond door de vliezen heen, duidelijk voelbaar worden, en derhalve geen twijfel meer mogelijk laten. In de meeste gevallen verkrijgt men, door de zamenkomst van vele der opgegevene teekenen, een graad van waarschijnlijkheid, die steeds grooter wordt, hoe meer teekenen er bestaan en hoe langer zij duren; (als men b.v. de bewegingen en de slagen van het hart des kinds, de duidelijk voelbare deelen van hetzelfde, den regelmatigigen wasdom van het ligchaam, de daarmede overeenkomende veranderingen des scheidedeels en van den mond der baarmoeder, de overeenstemming der overige verschijnselen, waarneemt.) Het is over het geheel een der moeilijkste posten van den verloskundige, als hij

over de zwangerheid moet beslissen : dwaling kan hier zeer gemakkelijk plaats hebben , en daarom kan men de voorzigtigheid niet genoegzaam aanbevelen.

ROEDERER , *de temporum in graviditate et partu aestimatione*. Goett. 1757.

STEIN , *de signorum graviditatis aestimatione*. Goett. 1760.

GEO. GOTTL. ROCKSTROH , *de signis verae graviditatis saepe dubiis*. Lips. 1781.

J. CH. LODER , *Progr. quo probatur , circularem aperturae orificii uterini formam pro certo ineuntis graviditatis signo haberi non posse*. Jenae, 1785.

ERN. G. BRENNER , *de fallacia signorum in graviditate*. Marp. 1790.

A. E. VON SIEBOLD , *Diss. sistens diagnosin conceptionis et graviditatis saepe dubiam*. Wirceb. 1798.

GUIL. THEOPH. KELCH , *de symptomatibus et signis graviditatis verae simplicis*. Regiom. 1799.

MAUGARS , *Diss. sur les signes de la conception et des différentes espèces de la grossesse*. Paris, 1802. 8.

STEIN'S *Annalen* , 1stès Stück. S. 224.

WIGAND , *von den Zeichen der Schwangerschaft in den ersten zwei bis drei Monaten* , in *Hamb. Magaz. f. d. Geburtshülfe*. I. B. 1. St.

J. L. J. WOLF , *de exploratione orificii uteri gravidi signis saepe dubiis stipata*. Viteb. 1803. 4.

J. A. SCHMIDTMÜLLER , *die Krankheiten der Schwangern etc.* S. 51.

F. POLLAU , *Diss. de intumescentiis ventris graviditatem mentientibus*. Virceb. 1799. 4.

CH. P. F. HERRMAN , *de signis morborum graviditatem mentientibus*. Landsh. 1810. 4.

E. W. CH. SCHMIDT , *de diagnosi graviditatis et morborum quorundam eam simulantium*. Lips. 1812. 4.

F. B. OSIANDER's *Handbuch der Entbindungskunst*. Tubing, 1819. I. Th. 2. Abth. XIX. Kap. §. 477—501.

L. F. F. FLEMMING, *de signorum graviditatis et morborum quorundam graviditatem mentientibus differentia*. Lips. 1820. 4.

II. *Van de teekenen der veelvuldige zwangerheid.*

§. 195.

De teekenen, welke het bestaan van meerdere vruchten, b. v. van *tweelingen*, zouden moeten beslissen, zijn nog onzekerder, dan de teekenen van de eenvoudige zwangerheid. Behalve dat de verschijnselen, die wij als teekenen der eenvoudige zwangerheid hebben opgegeven, zich gewoonlijk vroeger en in sterkeren graad openbaren, worden de volgende omstandigheden nog daartoe gerekend.

§. 196.

Het onderlijf, dat aanmerkelijk en buitengewoon spoedig wordt uitgezet, is door eene spleet of groef, die meerendeels van boven naar beneden, doch somtijds ook eenigzins schuins door het midden loopt, als in twee deelen, welke hard en verheven zijn, gedeeld; de navel is dwars uitgerekt, en de vroeger ontwaarde beweging des kinds wordt aan beide zijden tevens waargenomen, (hoezeer dit laatste ook door de dwarse plaatsing van ééne vrucht kan voortgebracht worden).

§. 197.

In het laatste tijdperk der zwangerheid, daalt het ligchaam bijna in het geheel niet; bij magere vrouwen kan men de beide kinderen, schoon onduidelijk, uit-

wendig voelen, en het scheededeel blijft een hoogen stand houden (welk verschijnsel evenwel ook van een naauw bekken en veel vruchtwater kan afhangen); het liggen is de lijdere over het geheel ongemakkelijk, doch vooral het liggen op de zijde, waarbij de vruchten bijzonder onrustig zijn.

§. 198.

Bij het onderzoek in de laatste maanden, is de zwaarte en wederstand van den inhoud der baarmoeder grooter, dan men van één kind kan vermoeden; (evenwel kan de buitengewone grootte van het kind, uitwasfen in het onderlijf en in de baarmoeder, waterzucht, enz. hetzelfde uitwerksel hebben. De zwangerheid duurt gewoonlijk korter dan veertig weken, en gedurende de verlossing vindt men alsdan minder bedriegelijke teekenen ter onderscheiding.

§. 199.

Eene zwangerheid van *drielingen*, *vierlingen*, enz. heeft evenzeer geene bepaalde bijzondere teekenen: hetgene men daarvoor echter eenigzins zoude kunnen houden, zijn de opgegevene teekenen van den dragt van tweelingen in een sterkeren graad: b. v. eene nog meer duidelijke beweging en het nog sterker uitgezette onderlijf, enz.

SIEBOLD, *Diss.* j. c. p. 65.

III. *Van de teekenen der zwangerheid
buiten de baarmoeder.*

§. 200.

De (ganschelijk onbestendige) verschijnselen, die het bestaan van eene *zwangerheid buiten de baarmoeder*

doen vermoeden, en die men daarom als teekenen aanneemt, zijn de volgende: de zwelling van den buik, met een gevoel van zwaarte en drukking (en *bij sommige soorten dezer zwangerheid* met hevige pijnen), is slechts aan de eene zijde bemerkbaar, terwijl de voet der zelfde zijde zich als in een staat van verdoo-ving bevindt; de ledige baarmoeder wordt, in verhouding tot de dikte van den buik, weinig uitgezet; het scheidedeel ondergaat eene verandering, gelijk in de tweede maand der regelmatige zwangerheid, en heeft eene schuinsche rigting naar de zijde van het bezwan-gerde werktuig *: de eerst eenigzins gezwollene borsten worden spoedig slap, en bevatten in het ge-heel geene melkachtige vloeistof; ten aanzien van den stondenvloed heeft er eene groote verscheidenheid plaats: dezelve kan ontbreken, of (het zij regelmatig of onregelmatig) voorhanden zijn; daarbij openbaren zich menigmaal koortsachtige toevallen, enz.

* FEILER.

§. 201.

De beweging der vrucht wordt op eene geheel ongewone plaats waargenomen; de vrucht is bij de buikzwangerheid duidelijker (op eene andere wijze dan bij de zwangerheid der baarmoeder) door de be-kleedselen der buikholte, de scheede of den endeldarm te onderscheiden. Vroeger of later ontstaan er, bij meerdere of mindere verandering van den baarmoeder-mond, vergeefsche hevige barensweeën *. — Voor de bijzondere soorten van de zwangerheid buiten de baarmoeder (§. 129.) kent men geene eigene teekenen; evenwel zou de ontlasting van eene slijmige en bloe-

derige zwartkleurige vloeistof, op het tijdstip waarop te voren de stondenvloed plaats had, een teeken van de *zwangerheid der buizen van FALLOPIUS* zijn, welke inzonderheid ook met eene zeer hevige pijnlijke spanning in de zijde verbonden is, en ** waarbij de vrouw gewoonlijk omkomt door de bloeding, die door de openbarsting der buizen verwekt wordt. Evenceens zoude de *zwangerheid van den eijerstok* altijd met hevige pijnen verbonden zijn. Alleen bij de uitdrijving der vrucht (§. 130.), of, wanneer die in het ligchaam terug blijft, na den dood der vrouw, krijgt de herkenning volkomene zekerheid. (*)

(*) De hevige pijnen bij de buitenbaarmoederlijke zwangerheid worden veroorzaakt door de spanning en uitrekking der bezwangerde deelen. — Onder de hier opgenoemde teekenen zijn die van het niet veranderen der baarmoeder en van het scheidedeel de zekerste. Wanneer de vrucht niet in de baarmoeder gevonden wordt, zet deze zich minder uit, en men kan zich door de eene hand in de scheede en de andere op den buik te brengen, niet van de beweging der vrucht verzekeren. Indien de vrucht den gewonen ouderdom van tien maanmaanden bereikt heeft, ontstaan er pogingen ter uitdrijving, en de baarmoeder trekt zich zamen, even als of de vrucht in hare holte bevat ware, offchoon ook de buiten de baarmoeder gelegene vruchten niet langs den gewonen weg kunnen worden geboren. Soms baant zich de natuur een weg door eene ontsteking in de spieren van de buikholte met verettering of versterking; soms echter moet de natuur door de kunst geholpen worden, de opening vergroot of de buiksede bewerktelligd worden. Vergelijk HALLER, *Elem. physiol.* T. VIII. p. 47. CAMPER, *Demonstr. anat. pathol.* T. II. cap. 5. p. 16. en vooral de bij §. 129 aangeh. verhand. VAN HEIM. THUESSINK, LENHOSSEK, KLUYSKENS enz.

- P. A. BOEHMER, *Observat. anat. rar.* Fasc. I.
- KROHN, *Fœtus extra uterum historia.* Lond. 1791. fol.
- STARK'S *Archiv.* VI. Band. 1. St.
- W. TURNBULL, *a case of extrauterine gestation of the ventral kind.* Lond. 1791. fol. m. pl.
- W. JOSEPHI, *Ueber die Schwangerschaft ausserhalb der Gebärmütter etc.*
- J. G. WALTHER, *Geschichte einer Frau etc.*
- * BOER'S *Abhandlungen etc.* 3. Band. S. 231. fg.
- J. S. SAXTORPH, *Observ. de graviditate tubaria et abdominali in Act. reg. societatis Havniensis.* Vol. V, Hafn. 1818.
- LOSCHGE, *Beob. einer Schwangerschaft innerhalb des breiten Mutterbandes in HORN'S Archiv. für med. Erfahr.* Sept.—Oct 1818.
- Beobachtungen von Eierstockschwangerschaft und Bauchschwangerschaft von FUCHSIUS HELLMANN und von WAHLBOURGH in SIEBOLD'S Journal für Geburtshülfe,* II. B. 2. St. 3. St. p. 488. en III. B. 4. St. p. 123.
- Storia ragionata d'una gravidanza della tuba Falopiana destra di* STANISL. GROTANELLI. Pisa, 1818.
- An analysis of the subject of extrauterine foetation and of the retroversion of the gravid Uterus by* J. KING. Lond. 1818.
- C. FR. H. SAMMHAMMER, *Diss. sistens impedimentorum pathologicorum graviorum diagnoseos graviditatis extrauterinae commentationem, adnexa singularis casus historia.* Bresl. 1819.
- De graviditate extrauterina. Diss. auct. J. DE DROSTE-HULSHOFF.* Berol. 1819.
- CARUS, *zur Lehre von Schwangerschaft und Geburt physiol. und therapeut. Abhandlungen.* Leipz. 1822, 1. Abth. S. 50.
- Benevens de bij §. 109 aangehaalde schrijvers.

IV. *Van de kenteekenen van den dood des kinds gedurende de zwangerheid.*

§. 202.

De dood van het kind kan door verschillende oorzaken, die op de zwangere moeder werken, te weeg gebracht worden. Daartoe behooren vooral ongemeene ligchaamsinspanningen, uitwendig geweld, zware ziekten, hevige gemoedsaandoeningen, sterke aderlatingen en hevig werkende geneesmiddelen, enz. Dikwijls echter sterft het kind in de baarmoeder, zonder dat men daarvan eenige oorzaak kan vermoeden.

§. 203.

De gewone, hoezeer ook somtijds volstrekt bedriegelijke *teekenen des doods* zijn: ophouding der beweging, dikwijls nadat die de laatste maal nog vrij sterk geweest was (*); het voortdurend gemis van den hartslag, bij het onderzoek door het borsthoortuig (*de auscultatie*); ophouding van de uitzetting der baarmoeder en van den buik, die platter wordt, eene andere gedaante aanneemt, dan hij tot nu toe gehad heeft, en eenigzins koeler op het gevoel wordt, een lastig gevoel van zwaarte in de regter- of linkerzijde, al naardat de vrouw op deze of gene zijde ligt, het is haar, als of zij een zware klomp regts of links in haar ligchaam voelde vallen. De baarmoeder is verslapt en indrukbaar (wegens het ophouden van de levensuitzetting (*orgasmus*)), die door het

(*) De sterke beweging op het laatst beschouwe men als eene stuipachtige beweging, die den dood voorafgaat. Dat alle deze teekenen zeer bedriegelijk zijn, heeft de ondervinding maar al te zeer geleerd,

leven der vrucht werd onderhouden, DUGÉS). Er ontstaan gewoonlijk rilling, huivering, flauwte en velerlei ziekteverschijnselen bij de lijderes: de borsten worden kleiner, enz. Evenwel ontbreken ook somwijlen deze toevallen, en de vrouwen bevinden zich volkomen wel.

G. L. CHUEDEN, *de signis foetus vivi ac mortui*. Goett. 1796.
recus. in ROEDERER, *Opusc.* Vol. II.

E. G. BOSE, *de diagnosi vitae foetus et neogeniti*. Lips. 1789.

C. G. MYLIUS, *de signis foetus vivi et mortui*. Jenae, 1789.

V. *Van de teekenen der misvorming van het ei.*

§. 204.

De teekenen van een geheel ontaard ei (§. 180—181.) zijn de volgende: daar zulk een zuiger (die zelden langer dan vier maanden in het ligchaam der vrouw blijft, spoedig groeit, zoo wordt ook de buik reeds vroeger aanmerkelijk, hoezeer niet gelijkmatig, uitgezet, en hij is bij de uitwendige drukking pijnlijk. De borsten zwellen op en bevatten eene waterachtige vloeistof; het scheidedeel verandert spoediger, doch niet in de opgegevene orde (§. 139—149.); de vrouw bespeurt geene kindsbeweging, maar alleen een zeker gevoel van drukking. — Dat deze teekenen alle misleiden kunnen, zal men ligtelijk inzien. — Teekenen voor het bestaan van monsterachtige vruchten (§. 183—185.) zijn er niet.

V. SIEBOLD, *Lucina*, II. B. 3. St. bl. 74. III. B. 2. St. bl. 238.

VI. *Van de tijdrekening in de zwangerheid.*

§. 205.

Men rekent in de zwangerheid, — of van haren

aanvang af: 1) naar de bevruchting, 2) naar het wegblijven der maandslonen, — of ten naastenbij van het midden, 3) naar de eerste merkbare bewegingen des kinds. Als eene vrouw, die opmerkzaam op haren toestand geweest is, stellig aan het einde der zwangerheid meent te zijn, dan zegt men, dat hare rekening uit is. Alle drie deze tijdperken kunnen echter misleiden. (§. 188—192.). — Door de opmerking van al de veranderingen, die allengskens plaats grijpen (§. 139—149.) kan de tijdrekening wel vrij juist zijn, doch ook de misrekening (zelfs door den meest ervarenen) niet altijd vermeden worden.

SCHULTES, *Ehestandsalmanach für die Jahre 1799 und 1800*, in de daarbij behoorende *Kalender*.

KLUGE'S *Schwangerschaftskalender*, in VON SIEBOLD'S *Journal etc.* Bd. VI. St. I. S. 127.

DESBERGER, *Schwangerschaftskalender für Aerzte und Geburtshelfer*, u. s. w. Berl. 1827.

R. C. H. WIEDEMAN, *Lesebuch für Hebammen u. s. w.* 2. verm. Aufl. Kiel, 1827. 8.

C. G. CARUS, *Lehrbuch der Gynaekologie etc.* 2. Aufl. Leipzig, 1822. II B. S. 90.

F. G. VOIGTEL, *fragmenta semiologiae obstetriciae*. Halae 1790. 4. met pl.

KNEBEL, *Grundriss zu einer Zeichenlehre etc.*

Dr. C. P. ELIAS, *Versuch einer Zeichenlehre der Geburtshilfe*. Marburg, 1798. 8.

DERDE AFDEELING.

De Leer der Verlossing, Geboorte, of Baring.

EERSTE HOOFDDEEL.

VAN DE VERLOSSING IN HET ALGEMEEN.

§. 206.

De verlossing is die verrigting van het vrouwelijk ligchaam, waardoor het ei, dat is de vrucht met de deelen die haar omkleeden, wordt losgemaakt en ter wereld gebragt. Zeer dikwijls verstaat men onder verlossing slechts alleen het geboren worden van het kind. — Niet zelden ook worden (doch ten onregte) door verlossing, nu eens het pasgeboren kind, dan weder de deelen van het ei, ja door sommige vroedvrouwen zelfs, de teeldeelen der vrouw bedoeld. ()*

(*) Offchoon sommige schrijvers aan de woorden: *verlossing*, *geboorte* en *baring* verschillende beteekenissen hechten, door *verlossing* de kunsthulp, die door den verloskundige wordt toegebragt; door *geboorte* het ter wereld komen van het kind, en door *baring* het ter wereld brengen van hetzelfde verstaan, — nemen wij deze woorden echter hier in dezelfde beteekenis, en verstaan daardoor de daad van het in het licht verschijnen der vrucht met hare aanhangfels, doch wel voornamelijk van de eerste; en wij zeggen dus eene vroege, late of ontijdige verlossing of geboorte, enz.

§. 207.

Ter verklaring van de verlossing is het noodzakelijk, dat men met twee hoofdvereischten daarvan bekend zij: 1) de in het ligchaam der moeder plaats hebbende, oorspronkelijk *active*, bij de verlossing echter grootendeels onwillekeurige beweging, die wij *werkzaamheid ter geboorte* willen noemen, dewijl zij op eene dadelijke wijze werkt op de uitdrijving van het kind en het ei; zij staat niet zoo als vele verloskundigen meenen, onder werktuigelijke wetten, maar zij is afhankelijk van de wetten van de gansche bewerktuiging der vrouw; 2) de verhouding, in welke het ligchaam des kinds tot de teeldeelen der moeder staat, en de wijze waarop het door dezen kan naar buiten gedreven worden, of het *werktuigelijke der verlossing*, hetwelk eene bijna volkomene werktuigelijke verklaringswijze toelaat, en waarvan wij in het derde en vierde hoofddeel van deze afdeeling meer in het breede zullen spreken.

§. 208.

De onwillekeurige *bewegingen of inspanningen ter verlossing* (§. 207.) zijn de zamentrekkingen van de zelfstandigheid der baarmoeder. De *willekeurige inspanningen*, die door de onwillekeurige worden opgewekt, en deze ook wederkeerig ondersteunen, worden vooral door de buikspieren en het middenrif (§. 68.) bewerkstelligd; opdat echter deze spieren behoorlijk zouden kunnen werken, is het noodig, dat de borst vooraf door andere spieren (§. 69.) opgetrokken en zoowel als het bekken vast bepaald worde. Op het einde der verlossing echter worden deze bewegingen,

die aanvankelijk geheel willekeurig zijn, ook bijna onwillekeurig, en de vrouw kan den aandrang om, even als bij een moeilijken stoelgang, naar beneden te persen, volstrekt niet meer wederstaan.

§. 209.

Wat de eigenlijke oorzaak van de zamentrekkingen der baarmoeder zij, is in weerwil van de menigvuldige en gedeeltelijk zeer ongerijmde veronderstellingen daaromtrent, nog niet geheel en al duidelijk, en vooral is het nog niet bepaald, waardoor deze bewegingen van de baarmoeder bij de verlossing altijd op zekere tijden en in eene zoo bepaalde volgorde plaats hebben. — Even als de veranderingen van de baarmoeder in de zwangerheid naar bepaalde wetten plaats grepen, die in de natuur der bewerktuiging van de vrouw gegrond zijn, zoo volgen ook de veranderingen bij de verlossing bepaalde wetten (§. 210.), die wij evenwel nog niet genoegzaam kennen. (Misschien is de naaste oorzaak der verlossing daarin gelegen, dat de vrucht, bij haren volkomen wasdom, de levensbetrekking, waarin zij tot de baarmoeder stond, verbreekt, en als een uitwendig vreemd ligchaam op de baarmoeder en de scheede begint te werken.) — Het blijft overigens opmerkelijk, dat de bijzondere levenswerkzaamheid der baarmoeder, die gedurende de zwangerheid verhoogd is (§. 136.), op het einde der zwangerheid, en zelfs na den dood der zwangere vrouw, wanneer reeds alle overige deelen hares ligchaams geene teekenen van leven meer geven, nog gedurende eenigen tijd voortduren kan; van daar dat ook de kinderen nog na den dood der moeder kunnen

geboren worden. Evenwel kan in vele gevallen, waar het kind eenigen tijd (zelfs vierëntwintig en meer uren) na den dood der moeder geboren werd, de uitdrijving der vrucht een bloot gevolg zijn geweest van de ontwikkeling van gasvormige vloeistoffen, die na den dood in de holligheden des ligchaams, en vooral in den onderbuik, plaats heeft. (*)

SOLEYREZ DE RENHAC, *Diss. de partu viribus maternis absoluto*. Paris, 1771.

HENNING *praes.* NURNBERGER, *Diss. de causis partus naturalis*. Viteb. 1784.

PH. F. MECKEL *et* ROSENBERGER, *de viribus partum efficientibus*. D. j. c.

(*) Waarnemingen van zamentrekkingen der baarmoeder twee of drie dagen na den dood der vrouw, vindt men bij EBEL in HUFELAND's *Journal der pract. Heilkunde*, 1822. Juni. S. 72. SCHENK, *Aldaar*, 1821. April. S. 97. HENMANN in *Med. Chir. Zeitung*, 1824. N^o. 44. S. 301. MOLL en ELDIK's *tijdschrift*, 1. Jaarg. 1. St. bl. 66. 1. Suppl. 2. St. bl. 181. 4 Jaarg. 2. St. bl. 183. Vooral ook bij NIETHE, *Diss. de partu post mortem*. Berol. 1827. 8.

Dat de oorzaak van de zamentrekkingen der baarmoeder niet zoo als sommigen meenden, door honger of dorst, behoefte om adem te halen, of in prikkeling van het darmpek opgewekt wordt; dat de baarmoeder niet door de scherpte van het lamsvocht, of door de sterke uitzetting van derzelver vezelen, geprikkeld wordt, en deze laatste hare zamentrekkingen veroorzaakt, wordt wederlegd door de waarnemingen van doode kinderen, bij welke de verlossing echter op den bepaalden tijd plaats heeft. — Dat de oorzaak meer in de zwangerheid zelve te zoeken is, blijkt uit de waarnemingen van zwangerheid buiten de baarmoeder, bij welke op den bepaalden tijd de zamentrekkingen ook

BAUDELOCQUE's *Verloskunde*, vert. en met aanm. voorzien,
door A. SOEK. II. D. 1. Hoofdst.

NAEGELÉ, *Erfahrungen und Abhandlungen*. S. 116. fg.

A. TORALLY, *Dissertation sur l'accouchement apres la
mort*. à Paris, 1804. 4.

§. 210.

Bij de zamentrekkingen der baarmoeder, waardoor zij in alle hare afmetingen van omvang vermindert, komt zij in eene meer naauwkeurige aanraking met de wanden van het ei en met het kind. Het veroorzaakt daardoor, dat het ei tegen dat gedeelte aangedrukt wordt, waar niet alieen geene zoo sterke zamentrekkingen plaats hebben, maar in hetwelk men gewoonlijk, wel verre van wederstand, veeleer toegeeflijkheid en vermeerdering van ruimte ziet volgen; voornamelijk met betrekking tot den mond der baarmoeder, die door de werking van de zamentrekkingen meer en

uit de baarmoeder plaats hebben. Vergelijk HALLER, *Elem. physiologiae*. Tom. VIII. p. 420. Wanneer men zich de trapwijze ontwikkeling der baarmoeder, (bij welke aan het einde der zwangerheid de *incitabiliteit* tot den hoogsten trap geklommen is, en bij welke het spiervermogen thans eene volkomene ontwikkeling en kracht verkregen heeft) te binnen brengt, en zich deze als een levend ligchaam voorstelt, dat op aangebragte prikkels terug werkt, alsmede dat op de uitzetting der vezelen, volgens de wetten der *incitabiliteit*, noodwendig eene terugwerking en poging om wederom in te krimpen, moet volgen, zal men hierin eene genoegzame reden vinden, ter verklaring van deze zamentrekkingen. Men leze hierover G. SALOMON, *Handl. tot de Verloskunde*, I. D. III. afd. 2. Hoofdst. J. H. WIGAND, *de geboorte van den mensch*, I. D. §. 15. volgg. REIL's *Archiv. u. s. w.* Th. VII. S. 402—501.

meer geopend wordt. De verhouding, waarin de bodem en de hals der baarmoeder gedurende de zwangerheid tot elkander staan, is niet bloot werktuigelijk, al neemt men ook de verscheidenheid der zelfstandigheid (§. 102. 137.) in aanmerking. Of daarbij eene polarische verdeeling * van uitzetting en zamentrekking plaats hebbe, welke zich bij de verlossing in eene verhouding bevindt, die regtstreeks aan die bij de zwangerheid is tegenovergesteld, moet nog door een nader onderzoek toegelicht en beslist worden.

REIL'S en AUTENRIETH'S *Archive für die Physiologie*. VII. B. S. 401. fg.

WIGAND'S *Beiträge zur Geburtshülfe*. 3. Heft. 4. *Abchnitt*.

JOERG in het *Journal der Erfindungen*. St. 43. S. 5.

DEZELFDE, in het *neueste Journal der Erfindungen*. I. B. 1. St. S. 62. fg.

§. 211.

Daar in de meeste gevallen de zamentrekkingen der baarmoeder met pijnen verbonden zijn (die overigens niet volstrekt noodzakelijk, en daarom ook niet altijd even hevig zijn, en waarvan men tot dusverre geene voldoende verklaring gegeven heeft), noemt men dezelve *weeën*, *barensweeën*, *vlagen* (*dolores ad partum*). Men verdeelt dezelve gewoonlijk in *ware* en *valsche* (*dolores veri et spurii*); de valsche weeën echter, die men in het geheel niet tot de weeën brengen mag, zijn slechts krampen in verschillende deelen van den buik; de *ware* weeën daarentegen zijn wezenlijke zamentrekkingen der baarmoeder, die *regelmatig* en *onregelmatig* zijn kunnen, en gedurende de verlossing een verschillenden naam dragen.

COTTH. LUD. FREIMANN, *Diss. inaug. sist. hist. partus lentisino ullo ad partum dolore*. Goett. 1821. 4. Alwaar de schrijver een geval verhaalt, waarbij de verlossing des morgens ten acht ure zonder eenige pijn begonnen en des avonds ten zes ure afgelopen was, zonder dat er eenige voelbare weeën aanwezig geweest waren. Hij bevestigt de zaak met acht getuigen.

Dr. VETTER's und Dr. TENNER's *zwo Abhandlungen aus der Geburtshülfe, ueber die Wehen vor und nach der Geburt*. Leipz. 1796.

NAEGELÉ, t. a. pl. bl. 172.

§. 212.

De *ware regelmatigige weeën* hebben eene eigenaardige bepaalde rigting: (de met dezelve verbondene pijn daalt van de lendenwervelen naar de schaambeenderen af;) zij houden niet lang aan, doch vertoonen zich met gedurige verheffingen. De hevigheid van de pijn staat gewoonlijk in evenredigheid met de kracht der zamentrekking, die men ontdekt door de veranderingen van den mond en het hardworden van den bodem der baarmoeder, welke uitwendig (door den onderbuik, die als in eene punt uitloopt) voelbaar is, en slechts enkele malen, b. v. als er eene werktuigelijke belediging of organische ziekte van de baarmoeder bestaat, of als de vrouw eene hooge mate van gevoeligheid bezit, lijdt dit eene uitzondering. Na eene der ware weeën volgt er (uitgenomen bij ziekten der baarmoeder) telkens eene genoegelijke rust, en de ware weeën, bijaldien zij (door eene ongelijkmatige werking van bijzondere gedeelten der baarmoeder) al onregelmatig zijn, worden meest altijd door zacht opwekkende middelen versterkt (indien er namelijk

geen werkelijk overwigt van de terugwerking in het bloedvaatgestel plaats heeft). De zoogenaamde *valsche weeën* hebben geene bepaalde, maar eene zeer verschillende rigting, zij brengen eigenlijk in het geheel geene merkbare verandering in den onderbuik en de baarmoeder te weeg; er volgt op dezelve geene kennelijke verpoozing, en door gepaste middelen worden zij gewoonlijk gelenigd of geheel gestild. (*)

J. P. EHRHARD, *de doloribus partum promoventibus*.
Halae, 1762.

GRUNER resp. HEUSINGER, *de dolorum spasticorum natura et medela*. Jena, 1784.

§. 213.

De meeste schrijvers over de verloskunde verdeelen de verlosfing op eene hun eigene wijze *, die evenwel niet altijd overeenkomstig is met de natuur. Eene

(*) Sommige schrijvers voegen hier nog eene derde foort van weeën bij, die zij *gemengde weeën* noemen. Deze hebben plaats wanneer barende (vooral eerstbarende en bejaarde) vrouwen niet alleen door ware weeën, maar ook door hevige lenden- en andere pijnen tevens worden aangedaan. — Het pijnlijke der geboorte-arbeid is minder gelegen in de baarmoeder zelve, dan wel in de overige bij- en in het bekken gelegene deelen, welke laatste door het kind te sterker gedrukt worden, naarmate zij deszelfs voortgang meer verhinderen. Indien de pijn voornamelijk haren zetel in de zelfstandigheid der baarmoeder had, moest deze in de dwarsche ligging van het kind steeds grooter zijn, dan wanneer het hoofd voorkwam; de pijn is integendeel minder, omdat de voorliggende deelen van het kind niet in het bekken kunnende indalen, de zenuwen minder drukken, dan het hoofd gemeenlijk doet.

verlosfing is *volbragt*, *volcindigd* (*partus perfectus*), als het voortbrengfel der bevruchting, dat bij de zwangerheid in het ligchaam der vrouw was, met al de daartoe behoorende deelen, geboren is: zij is *onvolkomen* (*partus imperfectus*) zoo lang er nog iets achtergebleven is: b. v. als er van tweelingen slechts één, of bij een enkelvoudig ei slechts het kind zonder den moederkoek en de vliezen geboren is. Als de verlosfing regelmatig op het einde der zwangerheid, dat is, omstreeks de veertigste week, volgt, dan noemt men haar *tijdig* (*partus maturus*); komt zij later, dan wordt zij *overtijdig* of *laat* (*partus serotinus*) genoemd; heeft zij vroeger dan op den gewonen tijd plaats, dan noemt men haar of *miskraam* (*abortus*), als zij voor de zestiende week invalt, wanneer doorgaans de vrucht nog in de ongeschondene vliezen bevat is; of *ontijdig* (*partus immaturus*), als zij tusfchen de zestiende en achtentwintigste week

Dat de ontsluiting der baarmoedermond niet blootelijk werktuigelijk geschiedt door de naar beneden geperst wordende waterblaas, blijkt uit de waarnemingen van ontslotene baarmoedermonden reeds lang voor dat deze gedaald is; ook opent zich de baarmoedermond fomwijlen in een oogenblik, hetwelk geen gevolg van eene mechanifche uitzetting zijn kan; tevens volgt deze ontsluiting veel beter door opium of een dampbad, dan door de door OSLANDER (*Grundriss der Entbindungskunst*, Th. II. S. 287.) zoo zeer aanbevolene uitrekking door de vingers of instrumenten. De ontsluiting der teeldeelen wordt ook zeer bevorderd door den vermeerderden toevloed van flijm en het doorzweeten van water met flijm vermengd, hetwelk fomwijlen als een weiachtig vocht uit dezelve ontlast wordt.

komt; en eindelijk *vroegtijdig* (*partus praematurus*) als zij tusſchen de achtentwintigſte en achtendertigſte week voorvalt **.

* J. PH. ECKARD, *Parallèle des accouchemens naturels et non naturels*. Strassbourg, 1803. p. 23. volg.

FLAMANT, *Tableau synoptique des accouchemens d'après une nouvelle méthode nosologique*.

POWER, *Treatise of midwifery*. Chap. IV. p. 106—126.

** J. TH. CH. BERNSTEIN'S *Beiträge zur Wundarzneikunst und gerichtlichen Arzneikunde*. Jena, 1804. 8. S. 71. fg.

J. A. SCHMIDTMÜLLER'S *Beiträge zur Vervollkommnung der Staatsarzneikunde*. Landshut, 1806. 8. S. 139. fg.

SCHMIDTMÜLLER, *der Stand der Geburtshülfe der neuesten Zeit*. S. 176.

§. 214.

In een practisch opzigt (voor zoo verre de behandeling betreft), wordt de verlosſing door ons in *regelmatige* en *onregelmatige* verdeeld. Eene *regelmatige* verlosſing is die, welke, volgens de theorie en de ondervinding, zonder eenig nadeel voor het leven en de gezondheid der moeder en des kinds, alleen door de krachten der natuur kan voleindigd worden, en waarbij de toegebragte hulp slechts dient, om afwijkingen en gevaar te voorkomen, en om de inſpanning der geboorte door minder wezenlijke, hoezeer voor beſchaafde menſchen niet ongewigtige dingen te bevorderen. Het is juist niet noodzakelijk, dat eene *regelmatige* verlosſing gemakkelijk en ſpoedig afloope; zij kan evenzeer een tragen gang gaan, indien de traagheid slechts niet voor moeder en kind gevaarlijk is. Eene *onregelmatige* verlosſing is daarentegen met een werkelijk of dreigend gevaar voor moeder en kind verbonden; zij kan of in het geheel niet, of ten

minste niet zonder vermeerdering of vermenigvuldiging van het gevaar blootelijk door de krachten der natuur volbragt worden, en vordert daarom altijd de hulp der kunst.

O. TOATS, *Diss. de partu qui maternis viribus absolvitur*, Duisb. 1775.

T. U. WARNEKROS, *de partibus regularibus et irregularibus*. Jena, 1803. 4.

NAEGELÉ, t. a. pl. S. 80. fg.

A. F. NOLDE, *über die Gränzen der Natur und Kunst in der Geburtshülfe*. 2. Aufl. Erfurt, 1816.

§. 215.

Ten aanzien van haren afloop, is de verlossing of *gelukkig*, als noch het leven, noch de gezondheid der moeder en des kinds lijden, of zij is *ongelukkig*, wanneer dit niet geschiedt en het doel der verloskunde (§. 2.) in het geheel niet, of slechts onvolkomen bereikt wordt, gelijk dit, helaas! bij de *onregelmatige* verlossingen niet zelden het geval is.

TWEEDE HOOFDDEEL.

VAN DE GEWONE VERSCHIJNSELEN BIJ DE VERLOSSING.

§. 216.

Tot een gepast overzicht van den geheelen loop der verlossing, verdeelt men haar in *vijf* verschillende *tijdperken* of tijden van verschillenden duur, op welken de verloskundige zeer naauwkeurig letten moet, als hij zich omtrent vele dingen juist wil uitdrukken of die aan anderen wil leeren.

§. 217.

Als de aanvang van het *eerste tijdperk* op handen is, dan wordt dit meestal aangeduid door eene zekere angst of kleinmoedigheid, die niet wel te beschrijven is, en dikwijls ook door verschillende geringe ziekelijke toevallen, die bij de zwangere vrouw voorkomen, bij voorbeeld: veelvuldige, dikwijls wederkomende aandrang tot waterlozing, enz. somtijds eene bijna koortsachtige opzetting, huiveringen, enz. Het lijf, de baarmoeder, daalt nog eenigzins lager, dan zij gewoonlijk in den laatsten tijd der zwangerheid reeds werkelijk is, (§. 149.) de scheede scheidt veel slijm af, en schijnt wijder te worden, de mond der baarmoeder kan gemakkelijk bereikt, doch dikwijls zeer moeilijk onderscheiden worden, en het hoofd des kinds, dat in het benedenste zeer verdunde gedeelte van de baarmoeder, even als in eene blaas, gelegen is, is bijna onbeweeglijk.

§. 218.

De zamentrekkingen van den mond der baarmoeder zijn in het eerste tijdperk meer moeilijk dan pijnlijk, en bestaan eigenlijk alleen in eene merkbare trekking, welke van de lendenwervelen, langs de heupen naar en tot de schaambeentreek schijnt te gaan. Deze noemt men *voorzeggende weeën*, (*dolores praesagientes*) *knijpers*, enz. Zij komen veelal des avonds het eerst, houden des nachts bij het liggen gemeenlijk weder op, hebben in den beginne meer lange, doch langzamerhand kortere tusschenpoozingen, en dringen de vrouw om met het spreken en het gaan op te houden, zoo lang zij duren. Gedurende deze weeën

gevoelt men den buik als gespannen, en het gansche onderdeel van de baarmoeder is rondom het uitgewischte scheedegedeelte zoo dun als kaartpapier. — Op het einde van dit tijdperk, dat van verschillenden duur kan zijn, begint de baarmoedermond, bij eene voor het eerst bezwangerde vrouw, bij welke het tot hiertoe vast gesloten was, zich te openen, en bij eene herhaalde zwangerheid, waar hij reeds vroeger geopend was (§. 149.), zich te verwijden, zoodat men de vliezen kan voelen. (*)

§. 219.

In het *tweede tijdperk* worden de weeën reeds pijnlijker, gaan van de zijde des bovensten lendenwervels, door de schaamstreek tot in de dije en de knie, en als zij zich opdoen, dringen zij de vrouw stil te staan en zich met de handen aan iets vast te houden. Dewijl de baarmoedermond door deze weeën altijd meer geopend, en daardoor den weg tot den doorgang van het kind gebaad en voorbereid wordt, noemt

(*) De mond der baarmoeder is veelal schuins naar achteren tegen het heiligbeen gelegen, en soms moeilijk voor den ongeoeffenden te vinden. Ook is het voor dezen somwijlen niet gemakkelijk het benedenste zeer verdunde gedeelte der baarmoeder van het met de vliezen alleen bedekte kindsdeel te onderscheiden. — Reeds in dit tijdperk ontlast zich niet zelden slijm, welke in de urine gevonden wordt, in de gedaante van lange, met bloed somwijlen gemengde strepen. Volgens OSIANDER is dit slijm bij brunetten bruin-geelachtig, en met het darmpek eenigzins overeenkomende. Den gang der geboorte vindt men fraai beschreven bij C. VAN DEN ENDEN, in zijne *Verloskundige waarnemingen*, 2 deelen, Amst. 1789. 8.

men dezelve *voorbereidende wecën* (*dolores praeparantes*). De uit de teeldeelen afvloeiende slijm is, wegens de verwijding des baarmoedermonds en de nu beginnende loswording der vliezen, met eenige bloedstrepen vermengd, en dan zegt men dat zij *teekent*, of dat er *ontsluiting* is.

§. 220.

Binnen den baarmoedermond, die zich nu meer opent, worden de vliezen (die bij de wecën gespannen en buiten dezen flap zijn,) voelbaar, en als men dan bespeurt, dat zij als een kleine halve kogel in de scheede afdalen, dan zegt men, dat de *vochtblaas doordringt*, of dat *het water begint te groeijen*. Voor en na elke wee voelt men het hoofd des kinds (het spreekt van zelve dat ook andere deelen des kinds kunnen voorliggen, doch daarover spreken wij hier niet) achter de blaas, en bemerkt, dat deze somwijlen kleine draaijende bewegingen maakt. Is de baarmoedermond vier vingeren breed geopend, en de blaas (wier gedaante zich meestal rigt naar den stand en de uitzetting van den baarmoedermond, naar de hoeveelheid van lamsvocht en naar het voorliggende deel des kinds) zeer gespannen benedenwaarts gedreven, dan zegt men: *de blaas zal barsten of springen*. Als de vliezen, welke de blaas vormen, voor de groote spanning wijken en openbarsten, dan zegt men: *het water is gebroken* (*ruptura velamentorum spontanea*), en het lamsvocht dat men achter de blaas en voor het hoofd des kinds bespeurde, vloeit als het *eerste kindsvocht* of *water* weg.

L. F. FRORIEP, *Hysteroplasmata oder Nachbildungen der Vaginalportion des Uterus und des Muttermundes*. Weimar, 1802. Mit dem Tuschirapparate. N^o. 9—15.

VON SIEBOLD's *Hysteroplasmata* (aangeh. §. 149.) N°. 18
tot 23.

§. 221.

In het derde *tijdperk* worden de weeën zeer pijnlijk: de pijn strekt zich tot in de voeten uit; zij duren langer en komen meermalen terug; dezen noemt men de *eigenlijke barensweeën* (*dolores ad partum proprie sic dicti*). Gedurende de werking van dezen, beginnen de knieën te sidderen, de vrouw wordt genoodzaakt, om niet alleen eene geschikte ligging aan te nemen en zich vast te houden, maar ook om, door de inspanning der willekeurige spieren (§. 207.), de *weeën* te ondersteunen, *te verarbeiden*. Daarbij wordt het gelaat der vrouw rood en heet, de pols wordt sterker en menigvuldiger, en het ganſche ligchaam begint te zweeten. De vrouw heeft aanhoudenden drang tot ſtoelgang en tot waterloozing, haar ongeduld neemt toe, haar klagen en jammeren wordt aanhoudender, en vooral lijdt zij pijn in de ſtreek van het kruis, waarop zij ook altijd bij het klagen de handen legt.

§. 222.

Na het breken van het water (§. 220.), wordt het hoofd, door de verbrokene vliezen heen, in den mond der baarmoeder benedenwaarts gedreven, en als zijn grootſten omvang door den baarmoedermond wordt omgeven, dan zegt men, *dat het hoofd inſnijdt of in de krooning ſtaat*. Het vormt zich nu geheel naar het bekken, de beenderen van het bekkeneel worden over elkander geſchoven, en daardoor moet de huid van het hoofd plooijen maken, die, wanneer het hoofd ſterk gedrukt wordt, opzwellen, en het zoo-

genaamde *hoofdgezwel* (*caput succedaneum*) vormen. (*) . (Beter zou het misfehien zijn , dat men dit *gezwel van het kindsdeel* noemde , daar het wel bij elk deel , dat bij de verlosfing het eerst in de fcheede komt , gevormd kan worden). Eindelijk wordt het hoofd zoo verre naar beneden gedreven (waarbij dikwijls , vooral bij de eerste verlosfing , de rand des baarmoedermonds eenigzins infcheurt , en wel het veelvuldigst in de nabijheid van zijnen linkerhoek , hetwelk met eene geringe bloeding verbonden is ,) , dat het aan den uitgang des bekkens ftaat , vlak achter de uitwendige teeldeelen , zoodat men het zelfs zien kan , als men de teeldeelen eenigzins van elkander verwijdert.

§. 223.

In het *vierde tijdperk* treedt het hoofd nog meer tufchen de uitwendige teeldeelen , drijft de fchaamlippen van elkander , en komt alzoo *in den doorzet*. Bij elke wee wordt het eenigzins tufchen de fchaamlippen voortgedrongen en doet den bilnaad uitzetten ; na de wee wijkt het echter weder terug , waarbij de bilnaad weder flap wordt. De endeldarm wordt door de drukking verbreed , en de drekftof door den geopenden , in de breedte uitgebreiden aars uitgedreven. Eindelijk wordt het ftaartbeen geheel achterwaarts gedrukt , het hoofd gaat ook zelfs na de wee niet meer terug , de bilnaad blijft buitengewoon gefpannen , loopt het

(*) Daar deze plooijen hetzelfde beloop met de naden hebben , wordt hierdoor de erkenning der ligging gemakkelijik ; wanneer echter de zwelling groot is , wifcht deze de plooijen weder uit en maakt de herkenning moeilijik. — Zie VAN ELDIK , *Verlofk. verhand.* 1. St. p. 9. (*) en p. 17.

grootste gevaar om ieder oogenblik in te scheuren, en intusschen helpen de myrtevormige lichamen en de inwendige schaamlippen den ingang van de scheede verwijden. Als nu het achterhoofd, na eene herhaalde hevige drukking, onder den schaamboog te voorschijn komt, en het gelaat alsdan over den bilnaad voorwaarts dringt, dan zegt men: *het hoofd snijdt door, het hoofd is in den doorzet.* (*)

§. 224.

De weeën, welke in dit tijdperk werken, zijn de zoogenaamde *sidderende* of *schuddende weeën* (*dolores conquassantes*); zij zijn uitermate pijnlijk, en volgen elkander zeer spoedig op, en dewijl zij ook nog met de pijnen van de uitzetting der teeldeelen verbonden worden, zoo doen zij den angst en het ongeduld der vrouw, en hare uitdrukkingen van pijn en kerming om hulp, tot den hoogsten top klimmen. Het gansche ligchaam der vrouw, vooral haar gelaat, is in een sterk zweet, er ontstaat hevige dorst, en zeer dikwijls, even als in het vorige tijdperk, ook braking, de ademhaling wordt kort, en de adem daaren-

(*) Indien het hoofd in den doorzet is, zoo is zulks voor de vrouw zeer smartelijk, en verbeeldt zij zich (vooral de eerstbarende die geene ondervinding heeft), dat men haar met de hand bezeert. Zelden blijft het hoofd lang in deze rigting, maar wordt meestal met de eerstvolgende wee, die gemeenlijk spoedig volgt, uitgedreven. Veelal wordt het toompje ingescheurd en met de scheepswijze groef vereenigd, en ook niet zelden scheurt een klein gedeelte van den bilnaad in. J. J. RÖMER, *partus naturalis brevis expositio*. Gott. 1786.

boven bij het ondersteunen der weeen nog altijd binnengehouden; de armen, de beenen en het onderlijf sidderen, de blik is wild en flikkerend, of het oog is gesloten, de mond wordt tot weenen vertrokken, en somtijds kan de vrouw zich niet onthouden van luidkeels te schreeuwen. Het allerpijnelijkste is echter het tijdstip, waarop het hoofd doorzet, en de bilnaad zich over hetzelfde terugtrekt en flap wordt, want alsdan is de barende bijna zonder bewustheid.

§. 225.

Zoodra nu het hoofd geboren is, houden de pijnen voor eenige oogenblikken op; doch dit is niet van langen duur, en er komen spoedig nieuwe ween: het hoofd des kinds keert zich met het gelaat naar eene der dijen van de moeder, (meestal naar de regter dije) de schouders treden, de eene vroeger dan de andere, met eene draaijende beweging voorwaarts, en daarop volgt nu het overige ligchaam des kinds, waarover het nog teruggebleven lamsvocht (*het tweede water*) wegvloeit; en hiermede is ook de geboorte van het kind, te gelijk met het vierde tijdperk volbragt. (*)

§. 226.

Het kind geeft zijn aanwezen gewoonlijk door een doordringend geschrei te kennen, waarbij de adem-

(*) Dikwijls volgt ook met dezelfde wee, die het hoofd heeft uitgedreven, het geheele ligchaam. Het aanzicht draait steeds naar die zijde, naar welke de borst des kinds gelegen was, en de achterste schouder, die daar het heiligbeen ligt, komt het eerst uit.

haling aanvankelijk wel ongeregeld is, doch zij wordt in korten tijd regelmatig. Het verband des kinds met de navelstreng is nu onnoodig, en wordt daarom gewoonlijk opgeheven. De moeder geniet eene zoete weldadige rust en geeft zich aan hare onbeschrijfelijke moedervreugde over. — Zijn er tweelingen, dan blijft de baarmoeder gewoonlijk nog uitgezet; de weeën worden weder sterker, de vliezen van het tweede kind vormen eene nieuwe vochtblaas, en de geboorte van het tweede kind gaat, in regelmatige gevallen, volstrekt met dezelfde verschijnselen verbonden, als die van het eerste. Intusschen is de tijd van de verlossing van het tweede kind zeer verschillend, dewijl hetzelfde gewoonlijk wel in het eerste uur na de geboorte van het eerste kind volgt, doch ook zonder nadeel voor moeder en kind eenigen tijd daarna (ja zelfs zeventien dager later) kan geboren worden.

§. 227.

In het *vijsde tijdperk* trekt de baarmoeder zich, als er geen kind meer in dezelve bevat is, tot de grootte van twee of drie gesloten vuisten zamen, en wordt achter en boven de schaambeenderen als een vaste kogel gevoeld. Na een half of geheel kwartier uurs, en naar omstandigheden ook wel later, begint de uitdrijving van den moederkoek. Daarbij komt er uit den baarmoedermond, die zich op nieuw opent, eene grootere of kleinere hoeveelheid bloed, hetwelk of *vloeibaar op eens*, (doch bij vrouwen, die meermalen gekraamd hebben, ook wel *in eenige malen*) te voorschijn komt, of als het zich in de holte der baarmoeder heeft verzameld, in kleine stukjes plotseling uit.

gedreven wordt. De thans werkende zamentrekkingen, die men *de eerste naweën, nageboorte weeën, of bloedige weeën (dolores post partum)* noemt, drijven den moederkoek en de vliezen (het afvallend vlies dat ten minste voor een gedeelte in de baarmoeder blijft, uitgezonderd) omgekeerd in de scheede, waaruit zij gewoonlijk dadelijk te voorschijn komen, doch waarin zij ook dikwijls, bij eene horizontale houding van de vrouw, zoo lang blijven liggen, tot dat zij van houding verandert, en eenige beweging maakt. Zoodra als de nageboorte is uitgedreven, is ook de verlossing geheel geëindigd.

J. J. BERGER, *de perfectissimi enixus signis*. Hafn. 1759.

J. J. ROEMER, *Diss. sistens partus naturalis brevem expositionem*. Goett. 1787 en 1791.

DENMANN'S *essay ou natural labour*, in de *Neue Samml. auserl. Abhandl. für Wundärzte*. B. XX.

SAXTORPH'S *Erfahrungen über die vollkommene Geburt*. Kopenh. 1786.

KNEBEL'S *Grundriss zu einer Zeichenlehre*. S. 155.

WIGAND'S *Beiträge*. I. H. S. 71.

DEZELFDE, *Geboorte van den mensch*, II. D.

NAEGELE, t. a. pl. S. 95.

HALLER, *Elementa physiologiae*. Tom. VIII.

RITGEN, in *Gemeinsame Deutsche Zeitschrift*. I. B. 2. H. Weim. 1826.

MENDE. Aldaar. 3. H. 1827. en in de meeste Handboeken der verloskunde.

DERDE HOOFDDEEL.

VAN DE REGELMATIGE VERLOSSINGEN, EN VAN HET WERKTUIGELIJKE BELOOP DERZELVEN.

§. 228.

Zal de verlossing op eene regelmatigte of natuurlijke wijze (§. 214.) volbragt worden, dan worden de volgende omstandigheden vereischt: 1) de zwangerheid moet haar natuurlijk einde bereikt hebben; 2) de moeder moet vrij zijn van wezenlijke gebreken in de vorming of rigting der teeldeelen (of der deelen die dezen om geven), en de inspanning ter verlossing moet met de behoorlijke kracht en in de vereischte verhouding tot de persoonlijke gezondheid der moeder plaats hebben; 3) het kind moet zich in eene regelmatigte plaatsing en ligging bevinden; dat is: zijne lengte-as moet in de as van de baarmoeder en die van het bovenste bekken vallen; 4) het kind moet geene gebrekkige gedaante hebben, zoodat er tusssen zijn ligchaam en het bekken der moeder geene onevenredigheid bestaat (ook moeten de moederkock en de vliezen geen ziekelijk maakfel noch een ziekelijk verband hebben); 5) geene gevaarlijke ziekten of andere toevallige omstandigheden moeten voor het leven en de gezondheid van de moeder of het kind doen vreezen.

I. *Van de hoofdgeboorten.*

§. 229.

Herkenning: men voelt aan den ingang van het benedenste bekken, door de vliezen, een gelijkvormig

gewelfd, hard, kogelachtig ligchaam, waaraan men, als de vliezen gebroken zijn, het gehaarde gedeelte des hoofds, en door hetzelfde, als het voornaamste onderscheidingsteeken, de fontanellen en de naden (§. 168 volg.) waarneemt. Bij alle regelmatige hoofdgeboorten, behalve wanneer er aanmerkelijke hoofdgezwollen bestaan, geven de fontanellen en naden een volkomen onderrigt aangaande de ligging des hoofds. (*)

LOSCHGE, *Progr. de commodis ex singulari infantum calvariae structura oriundis*. Erl. 1795.

§. 230.

Altijd treedt het hoofd, *dat*, (even als het overige ligchaam) *bij zijnen doorgang steeds zijne afmetingen naar de afmetingen der verschillende openingen van het bekken draait*, met zijne regte afmeting der bovenste bekken opening geheel of bijna geheel in de *conjugata* der bovenste opening komt. Deze ligging van het hoofd kan echter zeer verschillende rigtingen aannemen (waartoe men al de anderen kan terugbrengen); hieruit ontstaan even zoo vele foorten van hoofdgeboorten, die in haar werktuigelijk beloop eenigzins verschillen. (†)

(*) Wanneer er nog weinig ontsluiting plaats heeft, en het achterhoofd of de kruin voorligt, is het voor den onge oefenden, die slechts een gedeelte van een kogel voelt, niet altijd even gemakkelijk de ware ligging te bepalen.

(†) BAUDELOCQUE neemt nog twee andere liggingen aan, namelijk met de lange afmeting van het hoofd in de *conjugata* van het bekken, d. i. met het achterhoofd naar het *promontorium sacri*, of naar de schaambeensvereeniging;

Aanmerking. *De plaatsing des hoofds, onmiddellijk vóór dat het in de bovenste bekkenopening treedt, is verschillend. Meestal staat hetzelfde met zijne regte afmeting midden tusschen de schuinsche en dwarse afmeting; buitendien kan het boven de conjugata of scheef tegen eene der zijden van het bekken, (als wanneer het eerst in de schuinsche afmeting glijdt, als het in het kleine bekken treedt,) — of ook volkomen boven of reeds in de schuinsche afmeting staan.*

MATH. SAXTORPII's *gesammelte Schriften etc.* S. 14. fg.

C. M. THODET, *de partus mechanismo.* L. B. 1777.

BOER's *Abhandlungen.* I. Th. III. Bd. S. 22.

AD. VAN SOLINGEN, *het werktuigelijke der verlossing verklaard, betoogd en herleidt tot één algemeen grondbeginsel.* Leiden, 1799. 8.

SCHMITT's *geburtskijfliche Fragmente.* S. 38. fgd.

J. C. G. JOERG, *brevis partus humani historia.* Spec. I. j. c.

DEZELFDE, *Versuche.* S. 108. fgd.

deze liggingen zijn echter zeer zeldzaam, dewijl door het ronde van het voorhoofd en van het *promontorium* het hoofd altijd naar de eene of andere zijde moet overhellen. Hij noemt de *derde* en *zesde* kruinliggingen. De *vierde* en *vijfde* van BAUDELOCQUE worden bij FRORIEP de *derde* en *vierde* genoemd. — Daar de kennis van het werktuigelijke der verlossing niet alleen opmerkens- en bewonderenswaardig, maar ook tevens hoogstbelangrijk is, en aan haar dat gedeelte der verloskunde, hetwelk betrekking heeft tot de hulp bij zware verlossingen, het aanzijn te danken heeft, en wij, om niet te uitvoerig te worden, in dit handboek over dit onderwerp geene aantekeningen durven maken, verwijzen wij den lezer naar de belangrijke verhandelingen van VAN SOLINGEN, BAKKER, SCHWEIGHAUSER, RITGEN, vooral van NAEGELE in C. VAN ELDIK's *Verloskundige verhandelingen.* I. Deel. 2. St.

HASELBERG's *Untersuchungen und Bemerkungen über einige Gegenstände der praktischen Geburtshülfe*. Berl. 1807. 8.

NOLDE's *Beiträge*. III. St. S. 126. ff.

STEIN's *Annalen*. IV. St. S. 81. ff.

FR. CARL NAEGELE, *über den Mechanismus der Geburt*. in MECKEL's *Deutschen Archiv. für die Physiologie*, 5. Band. 4. Heft. S. 483—531.

RITGEN, in het *Gemeinsame Deutsche Zeitschrift*. I. B. 2. Stuk.

MENDE, *aldaar*. I. Band. 3. Stuk.

§. 231.

Bij de *eerste soort*, welke het meest voorkomt, kan men de *kleine fontanel* boven en achter de linker heupkom voelen; de groote fontanel ligt tegen de regter darm-heiligbeensvereeniging: *achterhoofd*, *rug* en *stuit* liggen naar voren en links, *borst* en *buik* naar achteren en regts. — Op het einde van het tweede tijdperk (§. 222.), wordt het hoofd eenigzins om zijne dwarse as (§. 169.) gedreven, zoodat de kin nog meer op de borst gedrukt wordt, de kleine fontanel aanmerkelijk dieper dan de groote komt te staan, en de *grootste* afmeting (§. 169.) van het hoofd, eenigzins naar de middellijn van het bekken, loodregt op de afmetingen der bekkenholte is gerigt.

§. 232.

Wordt het hoofd nu door de *eigenlijke barensweeën* in de bekkenholte benedenwaarts gedreven, dan moet het, om de gelchikstte ruimte voor zijne afmetingen te vinden, zich zoodanig draaijen, dat zijne regte afmeting, die thans eene, met de *conjugata* geheel

evenwijdige rigting (§. 40.) heeft, schuins in de regte afmeting der bekkenholte (§. 41.) te staan komt, zoodat op het einde van het derde tijdperk der verlossing, de kleine fontanel in den uitgang tegen de schaambeensboog gekeerd, en het voorhoofd geheel in de uitholling van het heiligbeen ligt. De weeën drijven alsdan het hoofd op de beneden- en achterwaarts liggende schuinsche vlakten, die door het heiligbeen gevormd worden; deze voeren het onder den schaambeensboog, tegen welken het hier zeer goed passende bolle achterhoofd zich steunt. Nu wordt de uitgang des bekken vergroot, door het achterwaarts wijken van het staartbeen voor het nedergedrukte hoofd, de kin van het kind verwijdert zich weder van de borst, en het hoofd draait zich, terwijl het aangezigt zich over den bilnaad ontwikkelt, bij den doorzet om zijne dwarse as. (*)

(*) Het hoofd ligt voor het indalen niet zoo als de schrijver zegt met de regte afmeting op de *conjugata*, maar boven de schuinsche afmeting en tracht zich in de *conjugata* te plaatsen. — Indien het hoofd alleen op zijne dwarse as draaide, zou de geboorte onmogelijk zijn, dewijl de regte afmeting van het hoofd grooter is, dan de regte onderste van het bekken, en dus daardoor den doorgang verhinderd zoude worden; doch het hoofd wordt onder het draaijen van zijne dwarse as tevens beneden en voorwaarts onder de schaambeensboog geschoven, waardoor het voorhoofd ruimte krijgt om over den rand des bilnaads te glippen. — Bijaldien het hoofd volstrekt geen wederstand vindt, daalt het, niet door de weeën maar door eigene zwaarte in de holte van het bekken. — Volgens de laatste door BAUDELOCQUE medegedeelde overzigten, staat deze eerste soort van verlossingen, ten opzichte van

Aanmerking: *Deze draaijende beweging, die ten naastenbij een achtste gedeelte van een cirkel beschrijft, geschiedt somwijlen, in zeldzame gevallen, eerst op het einde van het derde tijdperk der verlossing, zoodat het hoofd nog geheel schuins staat, en met de kleine fontanel naar het eironde gat gekeerd is, wanneer het zich alreede aan de benedenste bekkenopening achter de uitwendige teeldeelen bevindt. Ook komt het somwijlen, met zeer hevige weeën, die somtijds met te veel onstuimigheid door de barende vrouw verarbeid worden, in eene meer of mindere schuinsche rigting tot den doorzet, — een geval, hetwelk echter altijd ongewoon blijft, en ligtelijk nadeelig kan zijn.*

§. 233.

Als het hoofd met zijne regte afmeting schuins in de regte afmeting der bekkenholte treedt (§. 232.), dan komen de schouders in de dwars afmeting van de bovenste opening; wordt het kind nog meer, en het hoofd in en door den uitgang benedenwaarts gedreven, dan moeten de schouders eene wending ondergaan, en met hunne grootste breedte in de regte afmeting van de bekkenholte komen, en uit dezen stand der schouders in de bekkenholte, kan men verklaren, waarom het hoofd des kinds, als het uit de uitwendige teeldeelen is voortgedrongen, zich met het aangezicht naar

hare menigvuldigheid tot de tweede, bijna als $4\frac{3}{4}$ tot 1, en de eerste tot de derde als 346:1. — *L'art des accouchemens*, 5. edition, §. 671. — De oorzaak van het meer geboren worden in de eerste ligging is mischien gelegen in de plaatting des moederkoeks, welke gemeenlijk regts en achterwaarts in de baarmoeder vastgehegt is. Zie VAN SOLINGEN, t. a. pl. §. 130.

eene der dijen (gewoonlijk naar die der regterzijde) van de moeder moet draaijen. De schouders nemen echter ook in den uitgang denzelfden stand aan, die de regte afmeting van het hoofd had: de eene plaatst zich onder tegen den schaambeensboog, en de andere glijdt vroeger over het staartbeen naar voren. Zoodra de beide schouders geboren zijn, volgt de kegelvormige romp spoedig na, en draait zich bij het uitdringen evenzeer eenigzins om zijne lengte-as, zoodat het kind bij de verlossing eene spiraalvormige lijn beschrijft.

§. 234.

De *tweede*, niet zoo menigvuldige, *soort der hoofd-geboorte* is die, waarbij de pijnnaad met de andere schuinse afmeting van de bovenste opening overeenstemt, zoodat *de kleine fontanel boven en achter de regter heupkom* gevoeld wordt, en *de groote fontanel bij de linker darm-heiligbeensvereeniging* staat, en *aangezigt, borst en buik achter-bovenwaarts en links, achterhoofd, rug en sluit voorwaarts en regts* gekeerd zijn. Het werktuigelijk beloop is in den aanvang volkomen eveneens (§. 231.); wanneer echter het hoofd, om met zijne regte afmeting in de groote afmeting der bekkenholte te komen (§. 232.) zich van achteren eenigzins van de linker- naar de regterzijde moet keeren, dan kan het gebeuren, dat de endeldarm, met harde stoffen gevuld zijnde, deze draaijing belemmert. In dit geval kan er, in plaats van de draaijing met het aanzigt naar achteren, eene voorwaartsche draaijing plaats hebben, wanneer alsdan het achterhoofd in de uitholling van het heiligbeen komt te liggen, en de uittreding van het hoofd even

als bij de volgende derde soort geschiedt. Ten aanzien van het voortdringen der schouders en van den romp, heeft in deze soort van geboorte geen verschil met de vorige soort plaats.

§. 235.

Bij de *derde*, nog meer zeldzame *soort der hoofd-geboorten*, beantwoordt de pijlnaad aan dezelfde schuinsche afmeting der bovenste opening, als bij de eerste soort, doch juist in eene omgekeerde verhouding, zoodat *de groote fontanel zich achter en boven de linker heupkom bevindt, en de kleine boven de regter darm - heiligbeensvereeniging* voelbaar is. *Aangezigt, borst en buik liggen voorwaarts en links, achterhoofd, rug en stuit achterwaarts en regts.* Ook hier daalt, in den beginne (§. 231.), het achterhoofd eenigzins dieper en de kin nadert de borst nog meer. Wordt nu het hoofd door de eigenlijke barensweeën dieper in het bekken gedreven, dan draait het achterhoofd zich zoo lang tegen de uitholling van het heiligbeen, totdat het voorhoofd, hetwelk zich aan de voorzijde van de linker- naar de regterzijde beweegt, tegen den schaambeensboog komt te liggen. De uitdrijving van het hoofd is in deze ligging nu dikwijls bezwaarlijk, daar het voorhoofd niet zoo goed als het achterhoofd onder den schaambeensboog door voorttreden kan. In het vierde tijdperk der verlossing wordt het achterhoofd op de uitholling van het heilig- en staartbeen nederwaarts gedreven en het spant den bilnaad buitengewoon, totdat deze zich eindelijk over het langzaam van onderen voortgestuwde achterhoofd tegen den nek kan terug-

trekken. Nu eerst wordt het aangezigt, hetwelk gedurende het naar buiten dringen van het achterhoofd tevens weder naar boven gaat, zoodanig onder den schaambeensboog voortgedreven, dat de kin zich van de borst verwijdert, het hoofd zich om zijne dwarse as draait, en het achterhoofd zich tegen den aars der moeder terugbuigt. Soms tijds gebeurt het * dat het achterhoofd, bij het afdalen van het hoofd, in het bekken, naar voren draait, en aldus het hoofd uit zijne derde ligging in de tweede overgaat **. Wanneer het hoofd geboren is, draait het zich met het aangezigt ook tegen eene der dijen van de moeder, en de geboorte der schouders en des romps geschiedt op de voorheen opgegevene wijze.

* Volgens NAEGELE is dit gewoonlijk het geval (?). Vergelijk zijne voorheen bij §. 230 aangehaalde verhandeling. S. 500. en bij VAN ELDIK, bl. 22 volg.

** *Pratique des accouchemens ou mémoires et observations choisies sur les points les plus importants de l'art par Mme LACHAPELLE, publiés par A. DUGÉS, à Paris, 1821. p. 164, 248.*

§. 236.

Bij de vierde soort is het even als bij de derde, behalven dat de groote fontanel zich niet boven de linker, maar boven en achter de regter heupkom bevindt, en de kleine fontanel boven de linker darmheiligbeensvereeniging kan gevoeld worden; aangezigt, borst en buik liggen voorwaarts en regts, achterhoofd, rug en sluit achterwaarts en links. Het werktuigelijke beloop is even als bij de derde soort. — Het kan evenwel ook hier plaats hebben, dat het achterhoofd zich bij de werking der eigenlijke

barensweeën, misfchien wegens de uitzetting van den endeldarm, niet in de uitholling van het heiligbeen kan begeven, maar zich naar voren in de ftreek van de linker heupkom draait, waarbij dan het gelaat achterwaarts tegen de regter darm-heiligbeensvereening komt. Daardoor wordt deze vierde foort tot eene hoofdgeboorte van de eerfte foort, en veel gemakkelijker ten einde gebragt. * (*)

* *Pratique des accouchemens*, par LACHAPELLE. Vol. I. pag. 169.

Aanmerking. Volgens de waarnemingen in het verloskundig instituut te Parijs gedaan, was de verhouding ten aanzien van de menigvuldigheid der verschillende hoofdliggingen als volgt:

(*) Bij de derde en vierde foort, waarbij de kin zeer fterk tegen de borst, en de rug zeer fterk tegen het *promontorium* gedrukt wordt, het hoofd zich niet zeer gemakkelijk naar de fchaambeenderen fchikt en deszelfs uitgang moeilijk is, kan het kind door de natuur geboren worden; doch bijaldien er flechts iets aan het bekken of aan het kind fcheelt, blijft het hoofd in de benedenfte engte zitten, en de verlosfing wordt voor de natuur onmogelijk of zoo bezwaarlijk voor de vrouw, dat men de uitkomst niet durft afwachten, en de hulp der kunst moet worden gebezigd. De beletfelen echter, die de endeldarm aanbiedt, zijn niet zoo menigvuldig, dat men daarvoor groote vrees behoeft te hebben. Men vergelijke BAUDELOCQUE en VAN SOLINGEN, t. a. pl. Over de verhouding der verfchillende hoofdliggingen tot elkander zie men ook J. F. LOBSTEIN, in het *Journal de medicine redigé par LEROUX*, Paris, 1816. Juin. C. VAN ELDIK, *Verloskundige verhandelingen*, bl. 21 volgg. — RITGEN, in *Gemeinsame Deutsche Zeitschrift*. II. Bd. 3. Heft. — MENDE, *aldaar*. I. B. 3. Heft.

Onder 15,652 geboorten (van 1803 tot 1811) waren er

14,677 schedelligingen: daarvan bevatten

11,634 de eerste hoofdligging.

2,853 de tweede ———

112 de derde ———

78 de vierde ———

*Zie Pratique des accouchemens, par LACHAPELLE. Vol. I.
pag. 107.*

Onder 21,960 geboorten in het zelfde gesticht, van 1 Jan.

1812 tot 31 Dec. 1820 voorgevallen, waren er

20,698 schedelligingen: en daarvan kwamen

15,809 in de eerste hoofdligging.

4,659 in de tweede ———

164 in de derde ———

66 in de vierde ———

*Pratique des accouchemens, par LACHAPELLE. Vol. III.
Tab. II.*

II. Van de aangezichtsgeboorten.

§. 237.

Voor het breken van de vliezen kan men doorgaans niets *zekers* omtrent het bestaan en de volbrenging dezer geboorten opgeven; kort na het breken van het water echter, zoo lang er geen aangezichtsgezwel (dat zich evenzeer als het hoofdgezwel kan vormen), gevonden wordt, is de herkenning van het voorliggende deel niet zwaar. De vorm van het voorhoofd, der oogholten, van den neus, den mond en van de kin, is zoo onderscheidenlijk, dat men de dwaling wel vermijden kan. Zijn de deelen echter reeds door het aangezichtsgezwel veranderd, dan is de onderscheiding zeer moeilijk, vooral daar men bij het onderzoek met de uiterste voorzigtigheid moet te werk gaan,

om niets te kwetsen. Het aangezigt kan zeer gemakkelijk voor den stuit gehouden worden.

§. 238.

Gewoonlijk brengt men de aangezichtsgeboorten tot de zoogenaamde onregelmatige verlosfingen, houdt die voor ten uiterste gevaarlijk, en gelooft, dat het kind, daar zijn hoofd sterk achterwaarts gebogen wordt en er eene sterke spanning van de vaten van den hals plaats heeft, aan eene soort van beroerte moet omkomen, als men de verlosfing aan de natuurkrachten overlaat. Dit gevoelen is evenwel zeer onjuist. Indien er anders geene omftandigheid bestaat, die eene onregelmatige verlosfing te weeg brengt, dan kunnen de aangezichtsgeboorten (gelijk door een meer dan genoegzaam getal van onpartijdige waarnemingen bewezen is) zeer wel zonder nadeel voor het kind en de moeder, door de natuurkrachten volbragt worden; en men moet dezelve daarom slechts dan tot de onregelmatige verlosfingen brengen, wanneer de overige omftandigheden, tot eene regelmatige verlosfing (§. 228.) vereischt, in eenig opzigt ontbreken.

HESSE, *de partu ob iniquum capitis situm, facie praevia, difficili*. Goett. 1797. 4.

BOEHMER, *Diss. de partu ob faciem ad orificium uteri conversam praeternaturali*. Viteb. 1800.

§. 232.

In de eerste tijdperken der verlosfing kan het aangezigt in zeer vele rigtingen voorkomen: later kan men echter alle rigtingen tot de vier volgende soorten brengen, waarbij de lengte van het aangezigt altijd

in de schuinsche afmeting staat : (als de lengte van het aangezigt in de dwarse afmeting van den ingang met het voorhoofd naar de regter- of linkerzijde staat , dan gaat ook deze ligging in eene der vier volgenden over ; en wat de ligging des hoofds met de lengte van het aangezigt in de *conjugata* van het bekken betreft , deze kan , bij eene niet gebrekkige vorming des bekkens alleen dan plaats hebben , als het hoofd zeer klein is.) 1) Het voorhoofd en de oogholten staan achterwaarts en regts , en de kin voorwaarts naar de linker heupkom ; 2) het voorhoofd staat achterwaarts en links , en de kin naar de regter heupkom gekeerd ; 3) het voorhoofd staat voorwaarts en links , de kin achterwaarts en regts ; 4) het voorhoofd staat insgelijks naar voren , maar regts , en de kin naar achteren en links. Bij de beide eerste soorten is de kin , nadat de lengte des aangezigts in de regte afmeting is getreden , in den uitgang , (waarbij de bilnaad zeer gespannen wordt) onder den schaamboog , het voorhoofd echter achterwaarts naar het staartbeen gerigt. Bij de twee laatste soorten (die het moeilijkst zijn , en die hoogst zeldzaam door de natuur , en alleenlijk door zeer krachtige weeën , bij een ruim bekken en een klein kind , kunnen volbragt worden) , is de verhouding bij den uitgang juist omgekeerd : (wanneer namelijk , gelijk doorgaans plaats heeft , de derde aangezigtsligging niet , onder de verlossing , door de krachten der natuur in de eerste veranderd wordt. B.) De rigting van het overige ligchaam is gemakkelijk te bepalen. (*)

(*) De twee eerste liggingen zijn gemakkelijker , dewijl de kin ligter onder den schaambeensboog uitwijkt , dan het

ZELLER's *Bemerkungen etc.* S. 43.

BOER's *Abhandlungen etc. etc.* I. Th. 3. Band. S. 27.

II. Th. I. B. 173. Nieuwe uitgave I. B. S. 153.

WARNEKROS, *geb. Abhandl.* I. Heft. S. 11. fgd.

SIEBOLD, *iüber die Gesichtsgcburt in Lucina.* V. B. 3. St. S. 141.

Pratique des Accouchemens par LACHAPELLE, troisième memoire. Positions de la face. p. 367.

voorhoofd, terwijl in de twee laatste liggingen het voorhoofd eerst achter den schaambeensboog moet oprijzen, ten einde de kin over den bilnaad glijde.

L. BOER heeft het eerst de gezichtsgeboorte als regelmatige geboorte beschreven: hij zegt (daarin voorgegaan door SIMON ZELLER, verloskundige bij het kraamvrouwengesticht te *Weenen*, (in zijne *Bemerkungen iüber einige Gegenstände der praktischen Entbindungskunst.* Wien. 1789. 8.)): dat deze liggingen niets anders zijn dan minder gewone, en alleen dan kunsthulp vorderen, wanneer ook andere hoofdliggingen tegenstand ontmoeten: als bij vernauwing des bekken, enz., dat het kind in iedere aangezigtsligging gemakkelijk door de natuur geboren wordt; dat de aangezigtszwellung bij deze geboorte volstrekt weinig beteekent, en dat van tweehonderd zoodanige door hem waargenomene verlosfingen slechts vier gestorven waren en bij één de tang noodig was. *Abhandl.* I. B. I. St. S. 21. II. B. I. St. S. 173. — Dan offchoon het kind zonder gevaar en zelfs spoedig in deze ligging kan geboren worden, zoo als ik eenige malen heb waargenomen, houd ik het (zoo als ook mijn onvergetelijke leermeester Prof. BAKKER leerde) met BAUDELOCQUE daarvoor: dat het kind bij deze ligging veel meer te lijden heeft, dat men steeds best doet, indien zulks mogelijk is, het hoofd in de gewone ligging te brengen, en dat deze ligging slechts weinige bijkomende ongunstige omstandigheden behoeft, om moeilijk en zelfs

§. 240.

Hiertoe behooren ook de geboorten, waarbij het hoofd zich met zijne eene zijde tot de geboorte aanbiedt, hetwelk met de regter- en de linkerzijde, en wel in zeer verschillende rigtingen mogelijk is, als wanneer ook de onvolkomene (volkomene(?)) oorliggingen kunnen voorkomen. Ook dezen heeft men tot de klasse der onregelmatige verlosfingen, die kunsthulp vereischen, willen brengen; doch van haar geldt hetzelfde als van de aangezichtsgeboorten: wanneer geene andere omstandigheden (inzonderheid gebreken van het bekken) eene onregelmatigheid verwekken, dan kunnen deze zoogenoemde *scheeve liggingen* zeer wel door de krachten der natuur volbragt worden. — Als er zich echter met het aangezicht of de zijde des hoofds tevens een gedeelte van den hals tot de geboorte voordoet,

gevaarlijk te worden. Wanneer het aangezicht reeds in het bekken is ingedaald, en er geene bijzondere hindernissen aanwezig zijn, is het best de natuur geheel ongestoord te laten werken; wanneer echter het aangezicht nog niet is ingedaald, komt het mij beter voor het achterhoofd op de beste wijze in het kleine bekken te doen nederdalen, zoo als ook FRORIEP dit leert. — Wanneer men echter bij aangezichtsgeboorten ziet, dat de te groote inspanning voor de vrouw gevaarlijk wordt, moet de tang gebezigd worden. Hoe veel evenwel de natuurkrachten ter volbrenging van langdurige en moeilijke verlosfingen vermogen, bewijzen de door RICHARD, FREIBUTER en WEISE (die aangezichtsgeboorten der vierde soort beschrijft) medegedeelde waarnemingen. HARLESS, *neue Jahrbücher der teutsche Medicin.* XII. B. 2. St. en VON SIEBOLD's *Journal für Geburtshülfe etc.* VII. B. 3. St.

of als er aangezigtsliggingen of scheeve liggingen bij een te zeer uitpuilend voorgebergte, bij eene te korte *conjugata* enz. voorkomen, dan is zeker het geval anders, en niet tot de regelmatige, maar tot de gebrekkige liggingen (§. 254.) te brengen, en dikwijls bijzonder moeilijk en ongelukkig (*).

SAXTORPH, *theoria de diverso partu ob diversam capitis ad pelvim relationem mutuam*. Hafn. 1772. 8.

BUCHARD, *de foetus capitis situ obliquo etc.* Jena, 1797.

NOLDE, *Beiträge*. 3. St. S. 239. fgd.

De capitis foetus humani pelvim intrantis situ vario, variorumque ejusdem pelvi exeuntis, (specimine inauguralis pro obtinendis summis in medicina honoribus agit JOH. GUIL. CASSEBEER. Sectio prima vel pars historica. Marb. 1815. De capitis etc. etc. sectio altera vel conspectus varii capitis situs ejusque mutationum ex observ. scholae Marburgensis, nec non doctrina de vario capitis situ applicata ad praxin. Marb. 1818. 8.

III. Van de voetgeboorten.

§. 241.

Men gelooft dat er reeds gedurende den laatsten tijd der zwangerheid eenige kenteekenen der aanstaande

(*) Alleen bij één kind of bij een groot bekken wordt de vrucht in deze ligging gemakkelijk geboren. In verre de meeste gevallen is het verkieslijk, (zoowel bij het scheef als dwars liggend hoofd), het niet op de natuurkrachten te laten aankomen, maar bij tijds, het zij door eene geschikte ligging der barende, het zij door veranderde ligging van het hoofd, de natuur te hulp te komen. Even als bij de aangezigtsgeboorten is aangemerkt, hangt ook hier zeer veel van de omstandigheden af.

voetgeboorte (*partus agrippinus* s. *agripparum*) bestaan, als de welving van den buik oneffen is, als men het hoofd in de scheede niet voelt voorliggen, en men daarentegen door eene zachte drukking op den buik een eirond ligchaam waarneemt. Dat deze teekenen echter zeer bedriegelijk zijn, behoeft naauwelijks herinnerd te worden. Gewigtiger zijn reeds de teekenen voor het breken van de vliezen gedurende de verlossing: eene tragere en meer pijnelijke ontsluiting van den baarmoedermond, eene blaas, die in de gedaante van eene worst naar beneden hangt (die echter ook menigmaal van de onregelmatige gesteldheid van den baarmoedermond afhankelijk schijnt), en in deze blaas onduidelijk voelbare voeten. Bij het breken van de vliezen vloeit gewoonlijk al het lamsvocht op eenmaal weg, en daarna kan men duidelijk de voeten (vergelijk §. 259.) en ook den stuit voelen. Voor het overige is het, ten aanzien van de volbrenging der verlossing door de natuurkrachten hetzelfde, of er zich één voet of beide de voeten ter geboorte voordoen: het eerste noemt men eene *onvolkomene*, het laatste eene *volkomene* voetgeboorte. (*)

§. 242.

De voeten kunnen op velerlei wijze, naar alle pun-

(*) De nadeelen van deze soort van geboorten zijn: eene minder regelmatige verwijding van den baarmoedermond, en wanneer de verlossing lang duurt, verkouding van de uitgezakte deelen des kinds, en somtijds drukking der navelstreng, vooral tuschen het hoofd en het bekken; waarom ook deze soort van geboorte dikwijls door de hulp der kunst geholpen of bespoedigd moet worden.

ten van den omvang des ingangs van het bekken gerigt, tot de geboorte voorkomen; zoo lang echter de heupen niet in het bekken zijn gedrongen, is het vrij onverschillig, hoe de ligging des kinds zij. De heupen nu kunnen 1) in de van voren en links naar achteren en regts loopende schuinsche afmeting staan, en buik en borst achterwaarts en links liggen; of zij staan 2) in de van voren en regts naar achteren en links loopende schuinsche afmeting, en borst en buik zijn dan naar achteren en regts gekeerd; of 3) borst en buik staan voorwaarts en regts, en de heupen in de van voren en links naar achteren en regts loopende schuinsche afmeting; of eindelijk, 4) borst en buik zijn naar voren en links gerigt, en de heupen worden in de van voren en regts naar achteren en links loopende schuinsche afmeting gevonden. Wanneer ook de heupen in den aanvang in de dwarse afmeting staan, dan gaan zij evenwel spoedig in de schuinsche afmeting en in eene der opgegevene liggingen over. Men herkent deze verschillende liggingen voornamelijk uit de rigting der teenen en hielen. (*)

(*) Indien b. v. de eene voet gelegen is onder den schaamboog, met de hiel naar de linkerzijde, dan ligt ook het kind met den rug naar diezelfde zijde. Dat deze voet de bovenste en in dit geval de linker zij, onderscheidt men uit de ligging der groote teen, welke naar beneden en naar den anderen voet gekeerd is. — Wanneer zich twee voeten te gelijk voordoen, volgt daaruit nog geenszins dat de eene de linker en de andere de regter is, dewijl zij aan twee onderscheidene kinderen kunnen behooren, hetwelk men nimmer uit het oog moet verliezen: want door beide deze voeten in het bekken en naar buiten te brengen,

§. 245.

Naarmate de heupen door de weeën naar beneden gedreven worden, draaijen deze zich naar de rigting van de regte afmeting der bekkenholte en van haren uitgang, totdat eindelijk de eene heup onder den schaambeensboog, de andere over het heiligbeen voortglijdt, van waar zij dan beide eenigzins naar boven gedreven worden. Als men de werking der natuur niet verstoort, en de voetgeboorten aan zich zelve overlaat, dan komen de armen, met de ellebogen voor, gewoonlijk in die ligging ter wereld, welke zij in den laatsten tijd der zwangerheid hadden (171.); (*) (wanneer men echter, om de verlossing te bespoedigen, aan de voeten trekt, dan verheffen zich de armen bij het intreden der schouders in den ingang des bekken; zij leggen zich tegen de zijdedeelen van het hoofd en worden gewoonlijk eerst daarmede ge-

zou men eene onbedachtzaamheid begaan, waarvan de gevolgen niet te berekenen waren. Zelfs wanneer de voeten door de natuur alleen worden uitgebragt, moet men hierop steeds letten, ten einde de voeten van meer dan één kind niet te gelijk te laten uitkomen. Zie J. F. HENKEL, *Abhandl. der Fussgeburten*. Berlin, 1776. 8. K. LAPORTE, *Diss. expon. versionis foetus, partusque praeviis pedibus conditionem etc.* Marp. 1811. 8. BENEDIX, *de partu Agrippino*. Berl. 1828. 8.

(*) Doch dit is op verre na niet altijd het geval: want somwijlen strekken zich, zonder dat men er aan getrokken heeft, de armen boven het hoofd uit en dalen met hetzelfde in het bekken, de intreding van het hoofd wel eens zoodanig verhinderende, dat zij eerst moeten worden uitgebragt.

boren.) De schouders draaijen zich in de bekkenholte ook naar de groote afmeting, weshalve de eene voorwaarts, de andere achterwaarts komt te liggen.

§. 244.

Zoodra dit gebeurt, komt ook het hoofd in den ingang, en dat wel geheel met zijne regte afmeting, schuins in de schuinsche of eenigzins ook in de dwarse afmeting der bovenste opening; doch naar de verschillende soort van geboorte (§. 242.), is het aangezigt of meer naar achteren of meer naar voren gekeerd. Het hoofd wordt bij de intreding in het bekken eenigzins om zijne dwarse as gedraaid, waardoor de kin nog meer op de borst gedrukt wordt, en de schuinsche of langste afmeting bijna loodregt op de afmetingen der bekkenholte te staan komt. Terwijl nu het hoofd door de weeën dieper in het bekken benedenwaarts wordt gedreven, komt het, even als bij de hoofdgeboorte, alleenlijk met de punt van de kin, in plaats van met de kleine fontanel, vooruit, met zijne regte afmeting in de regte afmeting der bekkenholte.

§. 245.

Bij de *eerste* en *tweede* soort der voetgeboorte legt het achterhoofd zich in den uitgang onder tegen den schaambeensboog, en terwijl het hoofd zich om zijne dwarse as draait, glijdt het aangezigt over den bilnaad voorwaarts. Bij de *derde* en *vierde* soort zet het aangezigt zich vast tegen den schaambeensboog, onder welchen het niet zoo goed kan voortdringen, en het achterhoofd dringt over den zeer gespannen bilnaad door. — Somwijlen heeft hier ook juist het omge-

keerde plaats, zoodat namelijk (na eene zeer sterke spiraalvormige wending van het kind) het hoofd, bij de eerste en tweede soort, aan den uitgang met het aangezicht achter den schaamboog, bij de derde en vierde soort echter, aan den uitgang met het aangezicht, in plaats van naar voren, veel gemakkelijker achter over het staartbeen vooruit dringt.

§. 246.

Dat sommige voetgeboorten met gevaar voor het kind verbonden zijn, moet niet toegeschreven worden aan de voetgeboorte als zoodanig, maar of aan zulke omstandigheden (§. 269, 270, 272, 276.), welke ook bij andere liggingen de verlossing onregelmatig maken zouden, of aan vele op vooroordeelen gegronde overijde pogingen der kunst (§. 187.). Alleen de vertraging van de uittreding des hoofds, na de geboorte van den romp, kan eigenlijk gevaarlijk worden.

IV. *Van de kniegeboorten.*

§. 247.

Het aannemen van kniegeboorten, dat is, als de knieën het eerst in den baarmoedermond komen, is eigenlijk overtollig, daar elke kniegeboorte in eene voetgeboorte veranderd wordt, en eigenlijk als kniegeboorte, dat is, zoo lang de knieën voorliggen, weinig opmerking verdient. Men noemt haar *onvolkomen*, als er slechts ééne knie voorligt, en *volkomen*, als beide de knieën voorliggen. Voor het breken der vliezen heeft men geen onbedriegelijk onderscheidend kenmerk dezer geboorten; daarna echter voelt men de knieën als twee kleine, ronde verhevenheden, die op

de oppervlakte oneffen en nabij elkander geplaatst zijn, en wier meer naauwkenrige ligging men uit de rolronde zachte dijen, de beenachtige, harde scheenbeenderen en uit de ligging van het gewricht opmaakt. Ten aanzien van het werktuigelijk beloop geldt hier volkomen alles, wat (§. 242.) van de voetgeboorten gezegd is. (*)

V. *Van de stuitgeboorten.*

§. 248.

Als het kind zich met de billen ter geboorte voordoet, dan zegt men: dat het *dubbeld* komt, en noemt de geboorte ook wel eene *billen-* of *dubbelde geboorte*. Voor het breken der vliezen zijn de stuitgeboorten zeer zelden stellig van de hoofdgeboorten te onderscheiden; doch houdt men het voor een teeken der eersten, als het onderste gedeelte der baarmoeder op het gevoel week, zich meer breed uitgezet dan kogelrond voordoet, als het ligchaam niet behoorlijk gedaald, en als de blaas niet kogelvormig maar langwerpig rond voorwaarts gedrongen is (†). — Na het bre-

(*) De onvolkomene kniegeboorte komt veel menigvuldiger voor dan de volkomene, veroorzaakt somwijlen moeilijkheid, naardien de teruggebleven knie meermalen op den ingang van het bekken blijvende haken, de hulp der kunst noodzakelijk doet zijn. Wanneer de knie nog in de scheede ligt, kan dezelve somwijlen met den elleboog verwisseld worden, vooral, wanneer zich slechts eene knie voordoet. Zie BAUDELOCQUE, *L'art des accouchemens*. Tom. I. §. 757. 5. edit. p. 335.

(†) Daar de vorming der waterblaas van te vele omstandigheden (b. v. de ongelijkheid van het weeffel der

ken der vliezen, vindt men een zacht, door de aars-
spleet in twee deelen gescheiden, kogelvormig lig-
chaam, en onder de beenderen des bekken's onder-
scheidt men vooral de beide zitbeensknobbels zeer
duidelijk. De aars is wel eens voor den mond (§. 237.)
gehouden, maar de uitvloeiende pekstof, en het niet
voorhanden zijn der tong, zijn hier echter beslissend;
de gemeenlijk eenigzins gezwollene teeldeelen, en het
begin der dijen, nemen wijders allen twijfel in de
herkenning weg. — (Bij kinderen van het mannelijk
geslacht kan echter de balzak, die dikwijls ongelooflijk
gezwollen is, de herkenning moeilijker maken.) De
onderste ledematen zijn of in het kniegewricht gebo-
gen en somwijlen over elkander gekruist, als wanneer
men de voeten naast den stuit, of tegen het onderlijf
uitgestrekt gevoelt.

§. 249.

De stuit treedt gewoonlijk op vierderlei wijze
in het bekken, de heupen staan in de schuinſche
afmeting, en wel 1) voeten, buik en borst naar ach-
teren en links, 2) naar achteren en regts, 3) naar
voren en regts, en 4) naar voren en links. Zij kun-
nen in den aanvang wel andere rigtingen (b. v. volgens
de dwarse en regte afmeting) hebben, doch nemen
bij het intreden gewoonlijk eene der bovengemelden aan.

vliezen, waardoor deze op de eene plaats meer dan op de
andere worden uitgezet; de hardheid van eenig deel van den
hals en mond der baarmoeder, waardoor de eene zijde der
blaas terug gehouden en daardoor de gedaante derzelve
veranderd kan worden) afhangt, is op dezelve als kentee-
ken weinig staat te maken.

§. 250.

Als de heupen voorbij den ingang gedrongen zijn, dan komen zij, onverschillig in welke rigting zij ingetreden zijn, zoodanig in de bekkenholte te staan, dat de eene heup voorwaarts tegen den schaamboog, de andere echter tegen het heiligbeen gerigt is. Werken de weeën nu nog sterker, dan beschrijft de naar achteren gerigte heup bij de uittreding eene grootere ruimte, doch komt gewoonlijk evenwel vroeger te voorschijn, dan de voorste heup, die tegen den schaamboog gelegen is. Het werktuigelijke beloop der geboorte van het overige ligchaam en van het hoofd is gelijk aan die, welke bij de voetgeboorte is opgegeven, en men moet ook hier niet (§. 243, 244, 245.) vergeten, dat het kind, door de spiraalvormige wending, in den uitgang eene geheel andere rigting heeft, dan in den ingang.

SCHEFFEL, *de foetu natibus in partu prodeunte*. Gött. 1770.

G. W. SPANGENBERG *praes.* WRISBERG, *Diss. sistens observationum obstetriciarum de partu clunibus praeviis peracto decadem*. Goett. 1780. 4.

C. A. VITRIARI, *Diss. de partu difficili et saepe praeternaturali ob nates foetus ad os uteri conversas*. Jena, 1787.

SCHOENMEZEL, *de partu natibus praeviis absolvendo*. Heidelberg, 1787.

§. 251.

Na de hoofdgeboorten zijn de stuitgeboorten het menigvuldigst: de laatste zijn eenigzins moeilijker dan de eersten, doch gemakkelijker dan de voet- en kniegeboorten. Bij de stuitgeboorten worden namelijk de

teeldeelten gemeenlijk genoegzaam uitgerekte, om daarna het hoofd gemakkelijker door te laten, terwijl integendeel bij de voetgeboorten de deelen niet zoo goed tot den doorgang van het hoofd zijn voorbereid. Voorheen was men gewoon de stuitgeboorten onder die verlosfingen te tellen, die men niet aan de natuurkrachten mag overlaten, dewijl zij *a*) zeer pijnlijk zijn; *b*) dewijl de beklemming van den stuit moeilijk is weg te ruimen; *c*) dewijl men voor eene groote kneuzing voor moeder en kind, en *d*) voor drukking der navelstreng zoude te vreezen hebben. Doch geen van deze vier gevallen heeft bij regelmatige stuitgeboorten plaats: — als de drie eerste gevallen plaats hebben, dan bestaat er altijd eene gebrekkige verhouding tusschen het kind en de deelen der moeder, waardoor de verlosfing onregelmatig wordt, en alsdan in de daad de hulp der kunst vordert; en als de navelstreng naast de stuit is uitgezakt (want alleen bij de *uitsakking* der navelstreng is hier eene drukking derzelve tusschen de stuit van het kind en het bekken der moeder mogelijk), dan maakt dit evenzeer de anders regelmatige stuitgeboorte onregelmatig, en de hulp der kunst noodwendig. (*)

(*) De redenen, waarom de vroedkundigen der vorige eeuw de stuitgeboorten tot voetgeboorten maakten, bestond vooral daarin, dat men bij de voetgeboorte altijd van de verlosfing meester is en het kind des noods kan uitbrengen, terwijl dit niet zoo gemakkelijk gaat als de billen reeds zoo ver in het bekken gedaald zijn, dat zij niet terug kunnen gebragt worden, en de ontplooiing in het kleine bekken onmogelijk is. Dikwijls is men buiten de gelegenheid om in dit geval eene keuze te doen, als ge-

WEGER, *de partu praeternaturali propter clunes ad os uteri conversas*. Argent. 1773.

J. L. BOER'S *Abhandlungen etc.* I. Th. 3. Bd. S. 34. fg.

MURRAY def. DAHL, *de partu praeternaturali cum clunibus praeviis*. Upsal. 1797.

DETHARDING, in STARK'S *Archiv*. IV. Band. S. 300.

VIERDE HOOFDDEEL.

VAN DE ONREGELMATIGE VERLOSSINGEN.

§. 252.

Wanneer de (§. 228.) opgegevene vereischten tot de regelmatige verlossing geheel of gedeeltelijk ontbreken, dan ontstaat er eene onregelmatige verlossing. Men moet trachten om de vereischten eener regelmatige verlossing naauwkeurig te leeren kennen, dewijl alle verlossingen, waarbij dezelve ontbreken, doch ook *alleen deze*, vorderen, dat de kunst tuschen beide kome, om haar, als de natuurkrachten dit niet ver-

roepen zijnde, wanneer reeds de billen in het kleine bekken zijn ingedaald. Het zijn voornamelijk de laatste gevallen, welke geleerd hebben dat het kind in deze ligging gemakkelijk geboren kan worden, en dat, wanneer de arbeid zich voorspoedig instelt, de vrouw jong en wel bij krachten is, en er volstrekt geene omstandigheden voorhanden zijn, welke de natuurlijke geboorte in het algemeen belemmeren, men dezelve gerust aan de natuur mag overlaten. — Vergelijk VAN DEN ENDEN, *Verlosk. Waarnemingen*. XXXI—XXXV. p. 108—121. — BAUDELOCQUE, §. 765—770. §. 1259—1285. — G. W. SPANGENBERG, *de partu clunibus praeviis, etc.* Gott. 1780. 4.

mogen, ten einde te brengen, en als zij met gevaar mogten verbonden zijn, dit aftewenden of te vermindern. Deswegens is de voorzigtige waarneming van hetgene de natuur vermag, bij de uitoefening der verloskunde van veel meer nut, dan overijlde aanwending van eene kunstbewerking.

GERDESSEN, *von den Ursachen der widernatürlichen Geburten*. Glogau, 1791.

SAM. MERRIMAN, *synopsis of the various kinds of difficult parturition*. Lond. 1813.

I. *Van de onregelmatige verlosfingen wegens eene gebrekkige ligging des kinds.*

§. 253.

Hiertoe behooren alle gevallen, waar de lengte-as van het kind niet in de bovenste as van het bekken valt. Als oorzaken dezer gebrekkige liggingen moet men de volgende aannemen: eene te groote helling des bekkens (§. 67.) (*), een geheel onregelmatige plaatsing en ongelijke tezamentrekkingen der baarmoeder, eene te groote hoeveelheid van lamsvocht, eene te lange of te korte navelstreng, hevige bewegingen der moeder en stuipen van het kind (?). De algemeene kentee-

(*) Wanneer het bekken eene te groote helling heeft, kan het hoofd noch de voeten, en in het algemeen de lengte-as van het kind niet goed in het bekken treden, dewijl (b. v. wanneer de baarmoeder of het bekken te veel naar voren helt, en de lange as gelegen is in eene horizontale rigting) deze deelen alsdan door de weeën gedreven worden in eene rigting, waardoor zij niet in het kleine bekken treden, maar over den rand van hetzelfde heenschuiven en eene dwarse ligging vormen. Indien de baar-

kenen van eene aanstaande onregelmatige ligging des kinds zijn de volgende: men voelt het lijf van buiten ongelijkmatig uitgezet; de beweging van het kind is gewoonlijk meer benedenwaarts in de zijden van den buik der vrouw bemerkbaar, en de buik is niet gezakt, als naar gewoonte; bij het uitwendig onderzoek vindt men het onderste gedeelte der baarmoeder noch kogelvormig gewelfd, noch zoo hard, als bij regelmatige verlosfingen; van een voorliggend deel kan men niets, ten minste niets duidelijk, onderscheiden; de verandering van den hoogstaanden mond der baarmoeder en de vorming der blaas geschieden langzaam, en niet

moeder zijdwaarts overhelt, wordt daardoor het ligchaam des kinds op of tegen het tegenovergeplaatste darmbeen gedreven, en hierdoor ontstaat, even als door de onregelmatige zamentrekking der baarmoeder, eene verkeerde werking der baarmoeder en onregelmatige ligging van het kind. Deze krampachtige onregelmatige zamentrekkingen brengen sommige vezellagen van de baarmoeder meer dan andere in beweging, en veroorzaken eene werking, waardoor het eene gedeelte van het kind zich vrijer beweegt dan het andere, waarvan eene onregelmatige ligging het gevolg is. — Eene te groote hoeveelheid lamsvocht veroorzaakt te groote uitzetting der baarmoeder, en laat aan het kind de vrijheid zich op verschillende wijzen te bewegen, waardoor, (hetzij deze bewegingen vrijwillig of stuipachtig zijn, hetzij dezelve door het ligchaam der moeder aan het kind medegedeeld worden, of van het kind zelven uitgaan,) gemakkelijk verplaatsing en verkeerde ligging van het kind ontstaan kunnen. — Dat niet altijd de groote ruimte van de baarmoeder tot omwendingen en verkeerde plaatsing noodzakelijk zijn, bewijzen die gevallen, waarin het voorliggende deel des kinds zelfs na het afgeloopen water zich

gelijk bij regelmatige verlosfingen. (*) Indien er geene dan natuurlijke verhoudingen voorkwamen, en deze steeds aan zich zelve werden overgelaten, dan zou het getal der onregelmatige liggingen van het kind niet zeer groot zijn, en er welligt slechts dwarse liggingen met voorligging van de achterzijde des romps en arm- en fchouderliggingen ** in verschillende rigtingen, voorkomen. Doch daar de verloskundige niet alleen met de pogingen der natuur, maar ook, en bijna nog menigvuldiger, met gebrekkige en

zelve verplaatste. Zie WENDELSTADT, in VON SIEBOLD's *Lucina*, III. B. 2. Heft. S. 357. Een dwars liggend kind zag PRIMUS door de natuur op het hoofd wenden. *Gemeinsame Deutsche Zeitschrift*. II. B. 1. St. Eene alleen door de krachten der natuur voortgebragte voetgeboorte, waarbij in den aanvang de armen uitgezakt waren, zag SCHNEIDER, in E. VON SIEBOLD's *Journal*, VIII. B. 3. St. 1828. Ook F. W. HEMMER beschrijft een geval, waar bij een overigens goed gevormd bekken, arm en fchouder doorgezakt waren, het kind echter eindelijk in een gedrongen ter wereld kwam. *Heidelb. Klin. Annalen*, IV. B. 2. St. — De navelstreng te lang zijnde, geeft aanleiding tot menigvuldige omslingeringen, waardoor het een of ander deel des kinds teruggehouden of verplaatst kan worden. Eene navelstreng, die zoo kort is, dat zij de beweging van het kind verhindert, is ten uiterste zeldzaam.

(*) Dit geschiedt langzamer, dewijl de uitzetting van den baarmoedermond nu geheel door hare eigene inwendige werking geschieden moet, en niet door het voorliggende deel des kinds geholpen wordt, en dewijl bij eene dwarse ligging de deelen van het kind geheel boven den rand van het kleine bekken blijven liggen.

onvolledige kunsthulp te doen heeft, zoo moet men er zich op gevat maken, dat de ligging des kinds zeer verschillend zijn kan. Om echter de verschillende liggingen grondig en spoedig te herkennen, wordt er eene naauwkeurige kennis van de gansche uitwendige gedaante van het kind, eene naauwkeurige onderscheiding van het voorliggende deel, en vooral eene goede voorstellingskracht vereischt, ten einde men uit de plaatsing van het voorliggende deel terstond de rigting van het geheele kind kunne bepalen. (*)

JOH. EM. WILH. GROSSMANN *praes.* BOEHMER, *Diss. sistens anatomiam foetus maturi externam, ab obstetricibus instituendam.* Viteb. 1795. 4.

** L. J. BOER, *supplement zur natürlichen Geburtshülfe und Behandlung der Schwangeren, Wöchnerinnen und neugebornen Kinder.* Wien. 1826. 8. S. 23.

A. DUGÉS, *Manuel d'obstetrique ou précis de la science et de l'art des accouchemens.* Paris, 1826. 12^o. p. 103. Ook in het Nederd. A. DUGÉS, *Handboek der Verloskunde.* Brusfel, 1828. 8.

(*) Hetwelk echter moeilijker is, naarmate de mond der baarmoeder minder wijd geopend en de omtrek van het voorliggend deel kleiner is. Zie M. SAXTORPH, *theoria de diverso partu ob diversam capitis ad pelvim relationem mutuum.* Copenh. 1772. 8. — CH. F. SILBER, *de viribus naturae medicatricibus in situs foetus iniquos.* Tub. 1799. 8. — J. K. GEHLER, *de capitis foetus situ in partu oblique apta solutione.* Lips. 1792—1793. 4. De gevoelens der verloskundigen van HIPPOCRATES tot op onze tijden omtrent de verschillende foorten van onregelmatige verlossingen, zie men bij BUSCH, *Gemeins. Deutsche Zeitschrift.* III. B. 3. St. 1828.

§. 254.

I. Voorliggende *hals*: a) *de achtervlakte van den hals of van den nek*, biedt eene harde oppervlakte aan, welke men, wegens de doornuitwasfen der halswervelen ligtelijk kan onderscheiden: de grenzen van deze vlakte worden van boven door het uitpuilende behaarde achterhoofd, en aan den kant van den romp, door de van elkander verwijderde fchouderbladen en hunne randen gevormd. b) *De zijdelijke vlakte van den hals* is van eene meer gelijkmatige zachtheid, dan de achtervlakte en de voorfte halsvlakte; naar den kant van het hoofd is zij door den hoek van den onderkaak en het oor, en naar dien van den romp door de deelen van den fchouder bepaald. c. *De voorfte hals- of keelvlakte* onderscheidt zich door het kraakbeenige ftrottenhoofd en tongbeen, waardoor geheel eigenaardige oneffenheden en kuilen gevormd worden. Als nabijliggende deelen lette men op de fleutelbeenderen, op het bovendeel des borstbeens, en in het algemeen op het bovenfte gedeelte van de voorfte vlakte der borst en de boogswijze afgeronde onderkaak. Elk van deze vlakten nu kan op zeer onderscheidene wijze voorliggen, naardat de lengte-as van den hals met deze of gene afmeting van den ingang des bekkens evenwijdig is, waardoor alsdan vele onderfoorten van halsliggingen ontftaan.

Aanmerking. *Tot de onregelmatige liggingen van het kind behooren (onder de bij §. 239 opgegevene omftandigheden) in zeker opzigt ook de derde en vierde aangezigtligging, waarbij het voorhoofd en de schedel naar voren zijn gerigt, (en gedurende de verlossing niet in eene gunstige ligging zijn veranderd geworden, in welk geval zij ligtelijk in eene halsligging kunnen overgaan. B.)*

§. 255.

II. Voorliggende *borst*. Vóór het breken der vliezen kan men niet veel onderscheiden, doch de blaas is groot en meestal slap. *a) De achterste vlakke der borst, of de ruggestreek*, is plat, en breeder dan de voorste borstvlakte; in het midden derzelve loopt de beweegbare, met vooruitspringende uitsteekfels voorzien, wervelkolom, en van boven kan men de schouderbladen voelen; *b) de zijdelingsche vlakten* zijn niet zoo breed als de achtervlakte, doch meer verheven; de hoepelsgewijs liggende ribben, met hare tusschenruimten, zijn duidelijk voelbaar; bovenwaarts ligt de okselholte, benedenwaarts de zijdelijke deelen van den buik, die men onder de onware ribben vindt. De naburige deelen moeten beslissen of de voorliggende zijdevlakte de regter of de linker is. *c) De voorste borstvlakte*, de eigenlijke borst, is van boven smaller dan van onderen, vlak, en alleen in het midden, waar het borstbeen ligt, eenigzins verheven; ter zijde van deze verhevenheid voelt men de uit de huid oprijzende tepels. Het borstbeen, welks bijzondere stukken alleen door kraakbeen verbonden zijn, en aan welks zijden men de kraakbeenderen der ribben voelt, verbindt zich van boven met de sleutelbeenderen, en van onderen verliest het zich in het kraakbeenige, beweegbare zwaardswijze uitsteekfel, dat binnenwaarts wijkt, en den hartkuil vormt. Naarmate nu de rigting der voorliggende vlakke, ten aanzien van de afmetingen van den bekken-ingang verschillend is, ontstaan er onderscheidene onderfoorten der borstliggingen.

§. 256.

III. Voorliggend *onderlijf*: a) *De achtervlakte van het onderlijf, de lendenstreek*, onderscheidt zich door de wervelkolom, die haar middendeel inneemt, en aan welke geene ribben worden waargenomen; zij worden van boven door de onderste onware ribben en van onderen door het achterste gedeelte des bekken bepaald. b) *De zijdelijke vlakte* vormt eene volkomene gelijkmatige zachte streek, die ligtelijk voor de drukking der vingers wijkt; van boven wordt de grenslijn door de korte ribben, van onderen door de heupbeenderen gemaakt. Om te bepalen of de regter- of de linkerzijde voorligt, moet men letten op den loop der onware ribben, op de ligging van het darmbeen, en, zoo mogelijk, op den oorsprong van den navelstreng aan de voorste vlakte. c) *De voorste vlakte van het onderlijf, de eigenlijke buikstreek*, wordt van al de anderen vooral onderscheiden door de plaats van de inplanting der navelstreng, en alsdan vindt men deze, die bij een levend kind klopt, voorliggende of uitgezakt. Bovenwaarts komt men aan de bogen, die door de onware ribben gevormd worden, in wier midden de zoo genaamde hartkuil ligt; van onderen voelt men de beenderen des bekken. De menigvuldige rigting van de verschillende liggingen vormt weder menigvuldige onderfoorten van de onderlijfsliggingen.

§. 257.

IV. Het voorliggend *bekken*, waarvan vele onderfoorten bestaan, heeft plaats, als het benedenste gedeelte van den romp voorligt. a) *De zijdevlakte des bekken, de darmbeensstreek*, geeft het gevoel

van een gezwel, dat rondachtig, week, en niet ongelijkvormig is aan het hoofd, offchoon het geene naden en fontanellen heeft, terwijl men tevens op de aarspleet en de nabijgelegene teeldeelen moet letten, om te onderscheiden, tot welke zijde de voorliggende heup behoort. Deze *heupliggingen* gaan somwijlen in volkomene stuitliggingen (§. 248.) over, en worden dan regelmatig. *b)* De *voorste vlakte* wordt door de meestal gezwollene teeldeelen, en hare verschillende liggingen door de naburige dijen met hare geleidingen herkend.

§. 258.

V. *Schouderliggingen* worden gekenmerkt door hare harde ronding, die kleiner is dan het hoofd, in den arm overgaat, en zich in de nabijheid van het schouderblad, van het sleutelbeen en van de ribben bevindt. De opperarm onderscheidt zich van de dije, waarmede men hem wel eens zoude kunnen verwisselen, door eene geringere dikte, en daardoor, dat hij slechts aan eene (de binnen-) zijde vleezig is. — Het gewrichtshoofd van het opperarmbeen zou echter ook wel voor eene knie gehouden kunnen worden, als de naburige deelen (welke ook aanduiden tot welke zijde de schouder behoort) deze dwaling niet beletteden. De onderscheidene rigting der schouders op den ingang van het bekken, vormt verschillende onderfoorten. (*)

(*) Is b. v. de hand met den duim naar de regterzijde der moeder en tevens met de elleboog naar het heiligbeen gekeerd, dan kan dit geene dan de regter zijn, enz. — Over deze verschillende liggingen leze en herleze men BAUDELLOCQUE EN VAN DEN ENDEN, in hunne aangeh. werken.

§. 259.

VI. *Armliggingen, armgeboorten*, zijn dikwijls reeds voor het breken der vliezen te herkennen. Men noemt ze *volkomen*, als beide de armen voorliggen: *onvolkomen*, als er slechts ééne arm ter geboorte voorkomt. Men heeft den arm wel eens voor het been, en de hand voor den voet gehouden, tot groot nadeel voor het kind; doch voor den opmerksamen onderzoeker bestaan er evenwel genoegzaam duidelijke onderscheidingsteekenen. De elleboog is op het gevoel veel minder breed, dan de knie, waarbij nog de somwijlen beweegbare knieschijf zich van het steeds onbeweegbare elleboogsuitsteeksel onderscheidt. De voorarm begint met den elleboog in eene rolronde gedaante; meer benedenwaarts naar de hand wordt hij vierhoekig, en de beide beenderen van den voorarm zijn duidelijk voelbaar. Men vindt aan den arm geene knokkels, en de hand is met den voorarm niet met zulk een hoek verbonden, als de voet en de hiel met het been; de geheele hand is korter dan de voet, en de dikste vinger (de naar alle zijden beweegbare duim) is niet tevens de langste, gelijk dit met de bijna onbeweeglijke groote teen het geval is, die met de overige teenen bijna in eene schuinsche vlakke ligt. De rigting van de handvlakte en van den duim, benevens het elleboogsgewricht, beslist, of de linker- of de regterarm voorligt; (*) (om terstond te onder-

(*) Het is niet gemakkelijk steeds de regter- van de linkerzijde te onderscheiden, vooral als er eene bij deze ligging niet ongewone zwelling van den arm plaats heeft. Het voelen van het hoofd, van den ruggegraat of van het borstbeen moeten hieromtrent beslissen.

scheiden of de regter- of de linkerhand voorligt, behoeft men slechts te onderzoeken of zij op de gewone wijze met de regter- of de linkerhand van den verloskundige kan gevat worden) ook de rigting des arms, zoowel als die van het gansche ligchaam, kan zeer verschillend zijn.

§. 260.

Behalve deze opgenoemde hoofdsoorten en onder-soorten van de liggingen des kinds, kunnen er ook nog vele andere voorkomen, die als het ware uit de opgenoemden worden zamengesteld. Daartoe behooren b. v. de gevallen, waar de arm met het hoofd, met de billen, of met andere deelen voorliggende is, of waar de halve borst en de halve buik voorliggen, enz. — (*) Hij, die met eene levendige en juiste voorstellingskracht begaafd is, en de algemeene liggingen des kinds en derzelve kenteekenen wel kent (en daartoe kan men *alleen door een menigvuldig onderzoek van het ligchaam van kinderen op het fantôme en bij barende vrouwen geraken*), zal

(*) Onder de verkeerde liggingen komen die van de achterzijde des ligchaams, namelijk die, welke den rug en de lendenwervelen aanbieden, het meest voor. BAUDELOCQUE (§. 1397.) meent de oorzaak daarvan te zijn, dat het kind bij deze ligging in deszelfs opgerolde ronde gedaante blijft, terwijl het zich ontplooijen moet om de voorzijde aan te bieden. Daar de drukking hier vooral werkt op de deelen, die zulks minder kunnen verdragen, is deze ligging niet zonder gevaar. De zijdelingse schouder- en armliggingen komen nog al menigvuldig voor. BAUDELOCQUE, §. 1501. De zeldzaamste schijnen de keel- of halsliggingen te zijn. BAUDELOCQUE, §. 1246.

ook menigvuldige bijzondere gevallen , die hem voorkomen , gemakkelijk kunnen onderscheiden , zonder dat het noodig was , de verschillende liggingen des kinds door nog meerdere onderafdeelingen te verdeelen.

MAYGRIER , *nouvelle méthode de manoeuvrer les accouchemens* , Paris an X. 1802. Hoogd. door MARTENS , 1804. 8.

Table synoptique des accouchemens , d'après une division naturelle et une reduction des positions du foetus avec la manoeuvre de chacune d'elles par A. P. MEIRIEU etc. Paris , 1821.

§. 261.

Bijzonder onregelmatig is ook de verlossing , als tweelingen zich beide te gelijk , met welk deel het ook zijn moge , tot de geboorte voordoen. Dit kan het geval zijn , of , wanneer beide kinderen slechts een gemeenschappelijk lamsvlies bezitten , of , als de door het lamsvlies gevormde tusschenwand op eenige wijze gedurende de verlossing is verbroken. In zulk een geval , dat voor de moeder en de kinderen beide gevaarlijk is , is de herkenning bijzonder moeilijk , en kan men geene genoegzame voorzigtigheid aanbevelen.

II. *Van de onregelmatige verlossingen , door ziekten en gebreken van het ligchaam der moeder.*

§. 262.

De tweede klasse der onregelmatige verlossingen is bijzonder gewigtig , dewijl door de oorzaken , die eene verlossing van de zijde der moeder onregelmatig doen worden , ook eene anders regelmatige verlossing (§. 228—251.) in eene onregelmatige kan veranderd

worden. Alle de hiertoe behorende oorzaken zijn of algemeen door het ligchaam der moeder verspreid, of zij hebben haren zetel in de deelen, die met de verlosfing in een naauw verband staan.

§. 263.

A. Tot de *algemeene oorzaken* behooren: 1) een aanmerkelijke graad van zwakte, die of van de algemeene (welligt jeugdige) ligchaamsgesteldheid afhankelijk en aangeboren, of door gebrek aan voeding, nederdrukkende gemoedsaandoeningen, of door misbruik van aderlatingen en ontlastende middelen veroorzaakt kan zijn, of uit eene hevige, welligt nog voorhanden zijnde ziekte kan ontstaan. De vrouw kan de weeën alsdan of in het geheel niet, of slechts met gevaar van eene volkomene uitputting verwerken. Men mag zich evenwel niet door eene fchijnbare zwakte, die (vooral tegen het einde der verlosfing) dikwijls voorhanden is, laten bedriegen (*). 2) *Stuip-trekkingen*: als zij hebbelijk zijn, b. v. bij hysterifche vrouwen, duiden gewoonlijk geen bijzonder gevaar aan; doch als zij integendeel eerst kortelings door

(*) Wanneer de krachten in het begin van den arbeid niet ontijdig verfpild worden, zal, bij overigens gunstige omftandigheden en gezondheid der vrouw, de zwakheid zeer zelden eene oorzaak der onregelmatige geboorte zijn. Zelfs bij de teederfte en zwakfte vrouwen kan dikwijls de terugwerking der baarmoeder op de in dezelve gebragte hand zoo hevig zijn, dat dezelve geheel verdoofd wordt. Het is hier vooral van belang fchijnbare en ware zwakte wel te onderscheiden. Men raadplege E. VON SIEBOLD, *Handboek over de kennis en genezing der ziekten van het vrouwelijk geflacht*. III. D. 2. St. bl. 129—149.

in- of uitwendige oorzaken voortgebracht zijn, dan maken zij de verlossing gevaarlijk en onregelmatig. De voorboden van dreigende stuipen zijn: ongewone onverschilligheid, ongepaste antwoorden, een onwelve-
gelijk gedrag, plotselinge, drukkende hoofdpijn, zuch-
ten, geeuwen, spanning boven de oogen, eene strakke,
verwarde, wilde blik, schijnbeelden voor de oogen
en kleine trekkingen van den oog- en mondhoek (*).
B. *Bezwijmingen*, die door verschillende oorzaken
verwekt worden, en dikwijls in een volkomen staat
van schijndood kunnen overgaan (†).

(*) De stuiptrekkingen behooren tot de gevaarlijkste
aandoeningen der zwangeren en barenden. Zoodra men de
door den schrijver opgenoemde voorboden bespeurt, moet
men trachten de oorzaak derzelve te ontdekken, en de
nadeelige uitwerking bij tijds te voorkomen. Indien men
volstrekt geene oorzaken der stuipen kan ontdekken, be-
spoedige men de verlossing, zonder evenwel door eene
geweldige behandeling de prikkeling te vermeerderen. —
Men raadplege wijders over dit belangrijke onderwerp, BAU-
DELOCQUE, §. 1095 volgg. E. VON SIEBOLD, *Handboek enz.*
II. D. 4. St. bl. 469—504. HAMILTON, in *Journal der*
ausländ. Literatur. 1802. Jul. N^o. 1. Sept. N^o. 2. —
SCHENK, in HUFELAND'S *Journal u. s. w.* 1820. Dec. S. 82.
HIPPOCRATES, *Magazyn enz.* IV. D. 1. St. bl. 25 volgg.
WIGAND, *de geboorte van den mensch, enz.* I. Deel.
bl. 271 volgg. DEWEES en J. DE BRAAUW, in MOLL en
ELDIK, *Tijdschrift enz.* II. Supplementband. 4. Stuk.
bl. 289—322. en I. Suppl. 4. St. bl. 348, 355. I. Jaarg.
4. St. bl. 59—66.

(†) Ook bij deze slaauwten hangt het gevaar alleen van
de oorzaken af; indien zij dadelijk weder overgaan, zijn
zij, vooral bij hysterische vrouwen, van weinig beduide-

- KEEP, *de convulsionibus parturientium*. Argent. 1747.
- ENGELMANN, *de motibus convulsivis et convulsionibus a partu difficili*. Altd. 1752.
- SCHAFONSKY, *de gravidarum, parturientium et puerperarum convulsionibus*. Argent. 1763.
- J. C. MEIJER, *de convulsionibus parturientium etc.* Traject. ad V. 1784. 4.
- WEGELIN in STARK'S *Archiv*. I. B. 4. St. N^o. 7.
- PETRI, *de convulsionibus gravidarum, parturientium et puerperarum*. Gott. 1791.
- SCHAEFFER in HORN'S *Archiv*. I. B. 2. H. S. 199.
- G. F. HOFFMANN, *über die Ursachen und Heilmittel der sogenannten Gichter oder Convulsionen etc.* Frankf. a. M. 1795.
- GEHLER'S *kleine Schriften*. I. B. S. 195 und 432.
- BOER'S *Aphorismen über Fraisen etc. in Abhandlungen*. III. B. 7. Buch. S. 192. ff.
- J. L. FRITZ, *de convulsionibus gravidarum et parturientium*. Wirceb. 1809. 8.
- K. G. KUHN, *progr. de eclampsia parturientium*. Leipz. 1812. 4.
- De eclampsia exquisita in partu auct. C. F. WAGNER*, Marb. 1817.

§. 264.

4) *Moeijelijke ademhaling*, waardoor het doorzetten der weeën onmogelijk of bezwaarlijk en gevaarlijk gemaakt wordt. De oorzaken der moeijelijke ademhaling

nis; doch als zij met stuipen vergezeld zijn, uit eene verborgene oorzaak, inwendige verbloeding door het bersten van een der groote bloedvaten in de buik- of borstholte, scheuring der baarmoeder enz. veroorzaakt worden, zijn zij doodelijk. Vergelijk E. VON SIEBOLD, *Handboek enz.* II, D. 4. St. bl. 461—468. BAUDELOCQUE. Tom. I. §. III 13.

zijn : buitengewone vetheid , waterzucht , vooral borst-
waterzucht , longontsteking , longtering , eene hevige en
hardnekkige hoest , die voor bloedstortingen doet be-
ducht zijn , een groot kropgezwel , een mismaakt lig-
chaam , een bogchel , enz. , waarbij de tot de verlossing
vereischte houding en de noodige inspanning tot het
doorzetten der weeën niet kunnen worden volgehouden.
Als deze kwalen evenwel slechts in eenen geringen
graad bestaan , kunnen deze verlossingen nog door de
krachten der natuur volbragt worden ; gelijk ook door
eene onverstandige inspanning bij de verlossing vele
dezer toevallen , en zelfs het luchtgezwel , eerst ge-
vormd kunnen worden (*).

A case of rupture on the lungs in parturition by BALFOUR
in medical and surgical journal. 1811.
DUGÉS , t. a. pl. p. 238.

§. 265.

5) *Hevige bloedstorting* uit een deel des ligchaams *
gedurende de verlossing , vooral bloedspuwing , die

(*) De geneeskundige kennis moet den graad van het
gevaar bij alle oorzaken trachten te bepalen , hetwelk echter
dikwijls moeilijk is. Onmogelijk is het , al de omstandigheden
dezer toevallen te beschrijven ; zij verschillen zoo zeer in
eigen aard en graad van hevigheid , dat een gezond prak-
tisch oordeel meer ontdekt , dan eene uitvoerige beschrij-
ving bevatten kan. Men lette op den gang der verlossing ,
zorge voor eene geschikte ligchaamshouding , en neme ,
zoo veel mogelijk is , alles wat nadeelig zijn kan , weg :
(zoo als , bij voorbeeld , ophooping in de blaas en dikke
darmen) , en bewerkstellige bij benaauwde borst en adem-
haling eene aderlating , enz. Vergelijk E. VON SIEBOLD'S
Handboek , II. Deel. 4. St. bl. 395—403.

bij het doorzetten der weeën nog vermeerderd wordt; en bloedvliet uit de teeldeelen **, vooral uit de baarmoeder. Ten aanzien van het ontstaan der bloedstortingen, verdeelt men die, welke bij barende vrouwen voorkomen, alle in actieve, passieve en plaatselijke. (Vergelijk den tekst beneden §. 277. 278. N°. 8) (*). 6) Volstrekt *ondragelijk hevige pijnen* bij de verlossing *** (die evenwel ook door onregelmatige krampachtige weeën (§. 211. 267.) kunnen worden voorgebragt), waarbij het kind echter

(*) Het gevaar bij bloedstortingen ontstaat of uit het bloedverlies zelve, of uit de bijzondere toevallen, welke het uitgestorte bloed veroorzaakt (b. v. in de longen). Alle moeten zij, indien zij ernstig zijn, door geneesmiddelen of door het bespoedigen der verlossing te keer gaan worden. Diegene, welke door de weeën zelve worden opgewekt en verergerd, zoodanig, dat de barende vrouw dezelve niet zonder gevaar tot aan het einde der verlossing kan doorstaan, vereischen het bespoedigen der verlossing. — De meest gewone bloedstortingen ontstaan uit het losworden van een gedeelte des moederkoeks, waardoor het bloed tuschen de wanden van de baarmoeder en het kind uitgestort wordt. Deze vloeijing houdt niet op, voor dat de vaten van de baarmoeder zich sluiten, en dit geschiedt gemeenlijk niet dan nadat het kind geboren is. Gelukkig derhalve, indien de bloedstorting niet begint of gevaarlijk wordt, voor dat de baarmoedermond behoorlijk ontsloten is, en tot zoo lang bezige men, naar omstandigheden, uit- en inwendige middelen, als: het aanleggen van koud water, ijs of sneeuw, aromatieke wrijvingen van tinct: camphorae op den buik, inwendig tinct cinamomi, aether sulph. acidus, liquor, stipticus, opium, enz. Dan daar deze middelen slechts palliatief werken, moet men

niet vordert, en men stuipen heeft te duchten. (*)

7) *Zeer hevige en aanhoudende braking*; eene geringe braking in het derde en vierde tijdperk der verlossing is echter niets ongewoons (§. 224.),

8) *Slagader- en adergezwellen*, die dreigen open te barsten, of werkelijk opengebarsten zijn. (Zie boven N^o. 5.)

(†) *Breuken*, die met beklemming en ontsteking bedreigd worden. *Vaneenscheu-*

daarmede niet te lang aanhouden; maar indien de voorbereiding tot de geboorte slechts eenigzins genoegzaam is, de verlossing ondernemen. Soms is alleen het breken der vliezen voldoende om de bloedstorting zoodanig te verminderen, dat men zonder gevaar de uitwerking der weeën kan afwachten. — Daar de bloedstorting dikwijls geheel en al inwendig is, deze even gevaarlijk is als de uitwendige, en men bij dezelve de hoeveelheid bloed minder berekenen kan, zij men tegen dezelve op zijne hoede, vooral wanneer verzwakking, bleekwording, een dof gevoel van opzetting, zwaarte en vermeerderde warmte in den buik, flaauwte enz. aanwezig zijn. Vergelijk BAUDELLOCQUE, Tom. I. §. 1081. sqq. E. VON SIEBOLD, *Handboek* enz. III. Deel. 1. Stuk. bl. 47—65. III. Deel. 3. en 4. Stuk. bl. 295—309. en de aldaar aangeh. litteratuur.

(*) Zoodra de verlossing zelve minder gevaar in zich sluit dan de toevallen, is dezelve aangewezen. BAUDELLOCQUE verhaalt §. 1113. een geval van aaneengroeijing van het net met de baarmoeder, waardoor de maag en het *colon* bij iedere wee sterk getrokken werden en de weeën bijzonder pijnlijk waren. Deze en dergelijke aandoeningen vereischen de kunstmatige verlossing.

(†) Men leze over de slagader en adergezwellen D'OUTREPONT, in *Gemeinsame Deutsche Zeitschrift für Geburtskunde*. III. B. III. St. E. VON SIEBOLD, *Handboek*. II. D. IV. St. bl. 369—384.

ring van sommige spieren, b. v. van de lendenpier, van de regte buikspier, die somtijds op de te hevige inspanning dezer deelen volgden, eene aanmerkelijke bloedstorting ten gevolge hadden, doch tot hiertoe eerst na den dood zijn herkend geworden †.

* P. J. SCHACHER, *de haemorrhagiis gravidarum*. Lips. 1717. *recus. in HALLERI disputat. path.* Vol. IV. N. 136.

** KALTSCHMIDT, *de partu cum haemorrhagia uterina conjuncto*. 1762.

SPENCE, *Diss. de sanguinis ex utero gravidarum et puerperarum profluviis*. Edinb. 1767.

RIGBY'S *Versuch über die Mutterblutflüsse, die vor der Entbindung ausgetragener Kinder hergehen. a. d. Engl.* Leipzig, 1786.

RIGBY'S *Essay on the uterine haemorrhage*. 5. edit. 1811.

GEHLER, *de sanguine in partu profluente*. Lips. 1759. te vinden in GEHLER'S *kleine Schriften*. I. Th. S. III.

DENMAN, *Essay on the uterine haemorrhages*. Lond. 1785.

Traité des pertes de sang chez les femmes enceintes, par A. PASTA, traduit de l'Italien par ALIBERT. an VIII. Tom. II.

A. D. DE SAINT AMAND, *Diss. sur les pertes de sang qui affectent les femmes pendant la grossesse lors et à la suite de l'accouchement*. Paris, 1803. 8. (zie §. 535.)

BOER, *vom Blutflüsse aus der beschwängerten Gebärmutter in de Abhandl. und Versuche*. III. B. 7. Buch. S. 149. ffg.

WIGAND, *Beiträge*. I. Heft. S. 2.

*** WIGAND, in *Hamb. Magaz. für Geburtsh.* I. B. I. St. N°. 4.

Trattato delle Emorragie uterine nel tempo della gravidanza del parto e dopoparto dell dottore GIOVANNI BIGESCHI. Fiorenz. 1816. 2. part.

SEVERIN DOMINIUS CHRISTIAENS, *de hemorrhagia uterina*

- in graviditate, partu, coque peracto, superveniente.*
L. B. 1816.
- L. COLLMANN'S *Abh. über die Schiefstellungen der Gebärmutter und die verschiedene Gattungen und Ursachen der Blutflüsse.* Wien. 1818. 8.
- E. VON SIEBOLD, *de haemorrhagiis uteri gravidarum et parturientium.* Wurzb. 1814.
- ANDREW BLACK, *aphorisms illustrating natural and difficult cases of accouchement, uterine haemorrhage and puerperal peritonitis.* Lond. 1818. 8.
- Nouveau traité sur les hémorrhagies de l'uterus, d'EDUARD RIGBY, et de STEWARD DUNCAN, avec 124 observations, tirées de la pratique des deux auteurs. Traduit de l'Anglais, accompagné de notes par Mme. BOIVIN.* Paris, 1818.
- BÄHRENS, *de uteri haemorrhagia.* Berol. 1826. 8.
- † DUGÉS, t. a. pl. p. 239.

§, 266.

B. Tot de oorzaken der onregelmatige verlosfingen, die haren zetel hebben in *de deelen, welke met de verlossing in eene naauwe betrekking staan*, behooren: 1) bijzondere *zwakte van de baarmoeder*, onvolkomene of geheel ontbrekende weeën *. De oorzaak van dit gebrek aan zamentrekkingskracht kan liggen in *rheumatismus* der baarmoeder, in algemeene zwakte en slapheid van al de buiksingewanden, in te veelvuldig op elkander volgende verlosfingen, in te groote uitzetting van de baarmoeder door tweelingen of te veel lamsvocht, in verzwakking der baarmoeder door vroegere miskramen en bloedingen, en in te hevige inspanningen bij den aanvang der verlossing. Meestal is dit gepaard met verhoogde prikkelbaarheid (overmatige zenuwgevoeligheid), waaruit *kramachtige*

weeën volgen. (*) 2) *Volbloedigheid en ontstekingsachtige gesteldheid der baarmoeder*. Door voorbeschiktheid tot aambeijen, en onder begunstiging van een werkdadig bloedvaatgestel kan er eene zoodanige overmaat der slagaderlijke of aderlijke werkzaamheid in de baarmoeder plaats grijpen, dat hare zamentrekkingen of te hevig worden en eene nadeelige bespoediging der verlossing ten gevolge hebben, of integendeel onvermogen worden, en haren invloed op de uitdrijving des kinds verliezen. Men kent deze gesteldheid uit de teekenen der volbloedigheid en der aambeijen in het algemeen, en in het bijzonder uit het roode gelaat der vrouw, uit den vollen of onderdrukten, echter altijd hardachtigen pols, uit de ongewone hitte in de scheede, uit de gevoeligheid van het ligchaam bij het opleggen der hand, uit aderspatten vooral in de nabijheid der teeldeel en van den aars ** enz. *Wezenlijke ontsteking der*

(*) Ontstaan de te zwakke weeën uit atonie en gebrek aan opwekbaarheid, dan kunnen wijn, aether, opium, enz. zeer dienstig zijn, alsmede aromatische wrijvingen. Rust, slaap en eene goede rigting der hartstogten doen soms veel af. Wanneer het gebrek aan weeën het gevolg is van de te groote uitzetting der baarmoeder, kan soms ook het breken der vliezen zeer nuttig zijn. Volledig vindt men alles wat de oorzaken, herkenning en geneeswijze der onregelmatige, te zwakke, te sterke of geheel ophoudende weeën behandeld bij WIGAND, *de Geboorte van den mensch*. I. D. bl. 69-235. SIEBOLD's *Handboek* enz III. D. II. St. bl. 237—294 en bij de aldaar aangehaalde schrijvers. — In het algemeen, en vooral bij zwakke vrouwen, is het van belang om in het begin de krachten te sparen, door alle medewerking op de weeën afteraden. Zie RITGEN, in *Gemeinsame Deutsche Zeitschrift*. III. B. I. St. PILGER, *Ibid* IV. Band. 3. St.

baarmoeder *** door uitwendig geweld en door verzuimde of verkeerde hulp veroorzaakt, wordt gekend uit de aanleidende oorzaken, uit de voortdurende pijn, die bij elke wee en bij de uitwendige betasting toeneemt, alsmede daaruit, dat men tevens alle andere teekenen vindt, die bij de ontsteking van de buiksgewanden plaats hebben; ook deelen gewoonlijk de uitwendige teeldeelen in de ontsteking der baarmoeder, blijkende uit hunne hitte en droogheid. (*)

(*) De meest gewone oorzaak dezer ontsteking is eene te lang voortgezette geboorte-arbeid wegens beletsel, welke de natuur niet overwinnen kan, en welke ontsteking door eene ongeschikte ruwe behandeling nog vermeerderd wordt. De afloop is meestal doodelijk, al wordt ook de verlossing, die het eenigste redmiddel is, behoorlijk volvoerd.

Nog moet men op eene bijzondere ziekte der baarmoeder opmerkzaam wezen, welke BOER beschrijft onder den naam van *putrescentia uteri*, welke niet op den arbeid volgt, maar reeds op het einde der zwangerheid aanwezig is, en toegekend wordt aan een bijzonder bederf der *membrana decidua*. Deze ziekte doodt nu eens snel, dan na eenige dagen, en heeft geene bekende kenteekenen. — Wanneer bij eene vrouw, die door deze ziekte aangetast is, de arbeid begint, gaat alles langzaam en vermoeijend, echter wordt bij overigens gunstige omstandigheden de geboorte nog al voleindigd; na dezelve verandert alles ten nadeele, de vrouw sterft, en hij, die de oorzaak niet kent, staat er verbaasd over. Bij de lijkopening wordt de versterfving gevonden zich te bepalen bij de binnenste vlakte van de baarmoeder, meest bij den hals; terwijl ook de trompetten en eijerstokken wel eens wankleurig waren. Men leze daarover BOER's *Abhandlungen*. I. B. 3. St. S. 73. CH. F. W. KAISER, *diss. sistens quaedam de sphacelo uteri*

* ALEVELD, *de doloribus in partu silentibus*. Ciess. 1770.
NOLDE's *Beiträge etc.* 3. St. S. 268.

PAUL NUSS, *Diss. de partibus difficilibus aut per vires naturae non perficiendis ob statum irregularem virium expellentium et curatione eorum*. Heidelb. 1819.

**. Ten aanzien der verschillende eigenaardige ziekten der baarmoeder bij de verlosfing, verwijzen wij naar het voortreffelijke werk van WIGAND, *die Geburt des Menschen in physiologisch - therapeutischer Beziehung*. Herausgegeben von F. C. NAEGELE, II Th. Berl. 1820. 8. vert. door C. V. ELDIK, Amst. 1822.

De gevallen, in welke tot het geregeld doen afloopen van onregelmatige geboorten, vooral gebruik te maken is van inwendige middelen, behandelt ook OEHLER, in *Allgemeine med. Annalen des 19ten Jahrhunderts*. Neue Folge von PIERER. Altenb. 1826. 4. August.

*** J. C. GEBHARD, *de inflammatione uteri*. Marb. 1786. 4.
J. P. FRANK, *de curandis hominum morbis epitome*. Tom. II.
BEHRENS, *de inflammatione uteri*. Francof. 1800.

§. 267.

3) *Scheeve liggingen van de baarmoeder* (§. 139.):
a) naar voren, hangbuik, die door de slapheid van
gravidi obss. illustrato. Jena, 1810. 8. J. E. ZIMMERMANN
praes. K. G. KÜHN, *diss. de putrescentia uteri, adjunct. historia*. Lips. 1815. 4. G. VERSCHUUR, *observ. med. varii argument.* Gron. 1819. J. F. OSIANDER's *Nachrichten aus Wien etc.* Tub. 1817. S. 223. ffg. J. LOCHER, *de putrescentia uteri*. Berol. 1819. 8. C. G. CARUS, *Gynäkologie*. II. Th. S. 247. §. 1063. J. C. G. JOERG, *Handbuch der Krank. des Weibes*, 2. Aufl. S. 43, 755. LIPPICH, *observata de metritide septica etc.* Vindob. 1823. 8.
E. VON SIEBOLD, *Handboek, enz.* IV. D. 1, St. bl. 241 tot 272. W. J. SCHMIDT, in *Heidelberger klinische Annalen*, 1826. 2. Bd. 1. Heft.

de voorste bekleedselen der buiksholte veroorzaakt wordt, en dikwijls buitengemeen groot zijn kan; de baarmoedermond kan dan slechts met groote moeite achter en hoog boven in het bekken gevoeld worden. *b) Naar achteren*, zijn deze slechts mogelijk op het einde der zwangerheid, bij eene geheel misvormde ruggegraat, die onmiddellijk boven het heiligbeen bol naar achteren gebogen is: de onderbuik is in dit allerzeldzaamste geval niet gewelfd, maar zeer plat, en de baarmoedermond wordt geheel naar voren boven de schaambeenderen waargenomen. (De *voor- en achterwaartsche overbuiging der baarmoeder*, welke in de tweede en derde maand der zwangerheid voorkomt, zullen wij eerst (§. 283.) later overwegen). *c) De scheeve ligging naar ééne zijde* moet reeds zeer aanmerkelijk zijn, indien de verlossing daardoor onregelmatig zal gemaakt worden. Men noemt deze scheeve ligging der baarmoeder gewoonlijk *volkomen*, als men in de scheede volstrekt niets meer van den baarmoedermond voelt, en *onvolkomen*, als de baarmoedermond slechts niet in het midden des bekkens staat. Doch eene volkomene (de onvolkomene zijn zeer menigvuldig) scheeve ligging zal wellicht meer in een gebrekkig onderzoek, dan in de wezenlijkheid gegrond zijn. (*) Eene meer gewigtige oorzaak van de onre-

(*) VAN DEVENTER was de eerste, die de scheeve liggingen der baarmoeder als oorzaak van moeilijke geboorten en verkeerde ligging van het kind heeft opgegeven; na hem is zij een geruimen tijd als zoodanig aangenomen, zoodat men de keering ondernam in elk geval van scheefligging der baarmoeder. Naderhand heeft men hare werking in twijfel getrokken, zoodat zelfs BOER (*Abhandl.* I, B,

gelmatigheid eener verlossing, dan de gewone scheeve ligging, (waarbij het scheidgedeelte naar de tegen-

2. St. S. 129.) dezelve geheel ontkent. VAN DEVENTER en zijne navolgers hebben de uitwerking der verplaatsing van de baarmoeder te ongunstig, en BOER dezelve te eenzijdig en als van te weinig belang voorgesteld. Wanneer men in aanmerking neemt hetgeen voorheen gezegd is, omtrent de rigting van de zamentrekking der baarmoeder naar derzelve as, kan het niet onverschillig zijn of het voorliggend deel des kinds naar het midden der bekkenholte of tegen een' der randen gedreven wordt; in dit laatste geval wordt zelfs bij de beste ligging het achterhoofd gedrukt tegen de ongenaamde lijn, terwijl het beweegbaar gedeelte des hoofds, hetwelk niet vast ligt, in het bekken daalt, of indien de scheefligging zeer aanmerkelijk is, schiet het hoofd over dezen rand heen, en een ander deel van het kind vertoont zich boven den ingang van het bekken. De ondervinding der beroemdste verloskundigen bevestigt deze nadeelen volkomen, doch leert tevens, dat dikwijls alle deze gevolgen eensklaps voorgekomen of verwijderd worden door de vrouw te doen liggen op die zijde, welke tegenovergesteld is aan die van den bodem der baarmoeder. Vergelijk A. E. VON SIEBOLD, *Lehrbuch der theoretisch-praktischen Entbindungskunde*. Th. I. S. 221. LUCINA, 2. B. 2. St. S. I. VAN DEN ENDEN, *Verloskunde* waarna bl. 40. 62. F. L. MEISSNER, *die Dislocationen der Gebärmutter etc. von Seiten ihres Entstehen, ihres Einfluss und ihres Behandl.* Th. II. Leipz. 1821. 8.

Alle de afwijkingen der baarmoeder uit de as van het groote bekken worden bevorderd door de bijzondere gedaante van het bekken en van den ruggegraat, of door de te groote slapheid en rekbaarheid der buikspieren. Daar de ronde wand der baarmoeder niet gemakkelijker kan rusten op de gewelfde kolom der lendewervelen, zijn kleine zijde-

zijde van die der afwijking van den bodem der baarmoeder is gerigt). 4) *De scheeve gedaante der*

waardse afwijkingen zeer gewoon, en wel meest altijd naar de rechterzijde; een gevolg van de plaatsing der *flexura coli sinistra* en des endeldarms. Meer dan gewone wijde en vlakke der darmbeenderen en verkeerde buiging van de ruggegraat kunnen de baarmoeder ook zijdwarts doen overhellen. Zij hangt voorwaarts over, wanneer het bekken in die rigting te veel van de ruggegraat afwijkt, en deze afwijking is de moeilijkste en gevaarlijkste van alle; want de baarmoeder eenmaal buiten den as van het bekken geweken zijnde, heeft geheel geene bepaling, dan door de buikspieren, welke even als het buikvlies of de banden van de baarmoeder aanmerkelijk uitgespannen kunnen worden. (Zie F. B. OSIANDER's *Grundr. der Entbindungsk.* Th. II. §. 212.). De verslapping der buikspieren, welke oorzaak en uitwerking tevens is der voorwaartsverplaatsing, wordt eene nieuwe bron van gevaar na de verlossing, dewijl de vaten van den buik hun behoorlijken steun misfende, het bloed niet opwaarts kunnen voeren, waarvan eene snelle, somtijds doodelijke bezwijming het gevolg is. Vertraging der geboorte, sterke uitwendige ondersteuning van den buik, horizontale ligging, opwekkende middelen en dergelijken zijn hier aangewezen. — Bij de achterwaartsche ligging der baarmoeder, die zelden voorkomt, is eene tegenovergestelde plaatsing der vrouw aangewezen, en somwijlen ook het bevorderen der verlossing. — Bij al deze scheeve liggingen is de baarmoedermond aan de tegenovergestelde zijde van den bodem gelegen, de ontsluiting geschiedt langzaam en zoodanig, dat veeltijds dat gedeelte, hetwelk door het voorliggende kindsdeel gedrukt wordt, dikker is dan het andere; bij de ligging naar voren kan de baarmoedermond zoo hoog zijn opgetrokken tegen het heiligbeen, dat hij niet te vinden is.

baarmoeder, waarbij er eene algemeene ongelijke uitzetting van de baarmoeder op zoodanige wijze plaats heeft, dat hare as niet van het middelpunt van haren bodem door den baarmoedermond loopt, maar het scheedegedeelte dikwijls naar dezelfde zijde gerigt is, waarhenen de bodem is gekeerd. 5) Een bijzonder merkwaardig geval, waarbij de voorste wand van de baarmoeder met den rand van het net was zamengegroeid, en de zwangere vrouw plotseling stierf, voordat de zwangerheid nog ten halve volbragt was, is door WEIDMANN medegedeeld. *. 6) *Onregelmatige (krampachtige) en aanhoudende zamentrekkingen van bijzondere plaatsen der baarmoeder*, waardoor het kind zoo vast wordt gehouden, dat het, zoo lang zij duren, noch door de natuur, noch door bloot werktuigelijke hulp kan geboren worden ** (*).

(*) Deze onregelmatige zamentrekkingen hebben veelal plaats bij zwakke vrouwen met een aandoenlijk zenuwgestel, en komen veelal in de latere tijdperken der verlossing voor. Krampachtige en zenuwtoevallen, het meer dan gewoonlijk terugtreden van het kind na iedere wee, en een krampachtige pols, doen dezen toestand vermoeden. Krampstillende geneesmiddelen, somwijlen eene aderlating, warme clysmata, voetbaden, opium, omslagen om den buik van lijnmeel en kamillen, melk met opium, inspuitingen van melk of lijnmeelafkooksel, olie en opium, enz., alsmede de keering of de tang zijn hier aangewezen. Dikwijls echter is het hoogst moeilijk voor den verloskundige, om alles gelukkig te doen afloopen. Vergelijk BAUDELOCQUE, §. 1117. en de door FRORIEP aangehaalde werken. — Zie ook J. C. UNZER, *cur. femin. Europ. et illustr. prae rusticis gent. aliis sunt partus laborosiores*. Gött. 1771. 4.

C. F. C. HENNEMANN, *de obliquitate uteri etc.* Goett. 1769.

D. JAHN, *de situ uteri obliquo.* Helmst. 1785.

BAUDELOCQUE's *l'art des accouchemens*, p. 477. sqq.

BOER, *über das Unwahre der gemeinen Begriffe von der Schiefstellung der Gebärmutter*; in deszelfs *Abh. und Vers.* 1. 2. Buch. S. 84—103.

LEOPOLD COLLMANN's *Abhandlung über die Schiefstellung der Gebärmutter und die verschiedenen Gattungen der Blutflüsse des weiblichen Geschlechts.* Wien. 1818. 8.

* *Memoria casus rari in gynaeceis praecipue adnotandi, cum uteri antica facie omenti margo ex aliqua parte coaluerat: praegnans facta, medium graviditatis non assecuta inopinato moritur.* Moguntiaci, 1818. 4. m. pl.

** STARK's *neues Archiv.* 1. Bd. 1. St. S. 88.

GAITSKELL in *the London medical repository*, 1823. March. p. 206. MOLL en ELDIK's *tijdschrift*, III. Jaarg. 2. St. bl. 179. III. Jaarg. 3. St. bl. 764. V. Jaarg. 1. St. bl. 93. VII. Jaarg. 5. St. bl. 449. RUST, *Magazin u. s. w.* XV. B. 2. Heft. 382. XXXVI. B. 3. Heft. S. 573.

§. 268.

7) *Scheuring van de baarmoeder*, door stooten, steken, enz., vooral scheuring door inwendige oorzaken, inzonderheid bij eene gebrekkige vorming, ongeschikte ligging, enz. der baarmoeder. Deze verscheuring gaat vergezeld van een inwendig geruisch, de weeën houden plotseling op, het voorliggende deel verdwijnt geheel, of komt, als het kind slechts ten deele door de scheur dringt, ten minste in een hooger stand dan te voren; bij het uitwendig onderzoek voelt men de deelen des kinds onmiddellijk door de

bekleedselen des buiks. (*) 8) *Openscheuring van de scheede* **, die zeer zelden, en dan slechts bij een

(*) De scheuring der baarmoeder, gewoonlijk het gevolg der geweldige zamentrekking derzeive, kenmerkt zich door plotselijk ophouden der weeën, zwakte, bleekworden, flauwten, stuipen, kleinen, nauwelijks voelbaren pols, koude der ledematen en het veelal verdwijnen van het voorliggende deel; de darmen treden somwijlen in de baarmoeder en scheede, of zakken uit, en men voelt de ledematen en ook wel de beweging des kinds door de buikbekleedselen. De verlossing op de beste wijze te volbrengen, is het eenigste middel ter redding van het kind, en somtijds, hoewel zelden, tot het levensbehoud der moeder; zij geschiedt door de keering of door de tang, of bijaldien het kind in de buikholte is uitgestort, door de opening der buikholte. Men raadplege ook nog BAUDELOCQUE §. 2156. HALLER, *Opera minora*. Tom. III. p. 335. V. D. ENDEN, t. a. pl. XXII. waarn. bl. 329. KALTSCHMIDT, *Progr. de puerperæ hernia et ruptura uteri vaginae laborante*. Jena, 1754. J. STEIDELE, *Observationes de rupto in partu utero*; in WASSERBERG's *Opusc. min.* fasc. I. pag. 64. CRANTZ, STEIDELE et LEBMACHER, *de utero in partu rupto*; in WASSERBERG's *Diss.* fasc. I. N^o. 2. *Observations on the rupture of the gravid uterus* by DOUGLAS. Lond. 1788. 4. *Two plates of a ruptured and inverted uterus*; by T. DENMAN. Lond. 1788. 4. DENDY in *The London medical repository and review*. Lond. 1826. Mei. — W. BIRCH en SCHMIT, in *Medico-chirurgical Transactions*. Vol. XIII. P. II. Lond. 1827. ELSE in HORN's *Archiv. für med. Erfahr.* 1828. Mei. vooral ook E. VON SIEBOLD's, *Handboek*. III. D. 3. en 4. St. bl. 309—320. *Med. chir. Zeitung*, 1825. 17 Febr. *Beilage zur N^o. 14*. S. 255. *Dictionaire des sciences medicales*. Tom. XLIX. p. 249. art. *rupture de la matrice*. belangrijk. *Gemeins. Deutsche Zeitschr.* etc. I. Bd. I. St. Weimar, 1826.

naauwen bekken-ingang en hoogen stand der baarmoeder plaats heeft. 9) *Uitzakking der baarmoeder*, die door een te wijd bekken, slapheid der baarmoederbanden en der scheede bevorderd, en door lichaams-inspanningen te weeg gebragt kan worden. (*) 10) *Vernauwing van den uitwendigen baarmoedermond*, zamengroeiing met een van de zijwanden der scheede, krampachtige zamentrekking en vereeling

(*) In een te wijd bekken heeft de baarmoeder te weinig steun, en hier moet de kunst de natuur te hulp komen door ondersteuning van den buik met de handen, doelmatige ligging en leiding der geboorte, verbieden van alle te hevige inspanning tot het verarbeiden der weeën, en men trachte zoo veel mogelijk voor te komen, dat eene onvolkomene uitzakking niet in eene volkomene verandere. De volkomene uitzakking der baarmoeder bij de geboorte is eene der gevaarlijkste toevallen, wegens de dikwijls op dezelve volgende versterving. Men moet dezelve zoodra mogelijk trachten terug te brengen, en vervolgens de verlossing, naar omstandigheden aan de natuur overlaten, of door tang of keering bevorderen. Bij ontsteking en zwelling der baarmoeder is dit echter meestal onmogelijk, en als dan wordt na verrigte verlossing de baarmoeder in hare plaats hersteld. Leerzame waarnemingen van uitgezakte baarmoeders vindt men bij VAN DEN ENDEN, p. 320-328. STARK's *neue Archiv*. I. B. 1. St. S. 73. II. B. S. 240. Zie ook F. C. FABRICIUS, *de foetus vivi extractione uteri prolapsu*. Halae, 1748. J. F. OSIANDER, *diss. de fluxu menstruo et uteri prolapsu*. Goett. 1818. MEISNER, t. a. pl. j. II. W. KLINGE, *comment. de uteri procidentia etc.* Gött. 1789. 8. Vooral ook E. VON SIEBOLD's *Handboek enz.* III. D. 3. en 4. St. bl. 321—328. IV. D. 2. bl. 273—308. en aldaar aangeh. schrijvers.

(*callositeit* (?)) van denzelve. 11) *Vernauwing* en gedeeltelijke *toegroeijing der scheede*, en de gebreken van de uitwendige teeldeelen (§. 84—86.) hebben een bijzonderen invloed op den afloop van het derde en vierde tijdperk der verlossing. (*)

(*) Men zij steeds oplettend, om de volkomene en tegennatuurlijke vernauwing en onrekbaarheid niet te verwarren met de hardheid en zeer langzame ontsluiting, welke niet zelden bij bejaarden, voor het eerst barenden, plaats heeft; hier helpt geduld, het besmeeren met vet, *ungt. opiatum*, een dampbad en eene krampstillende behandeling. Alle werktuigelijke uitrekking (offchoon door OSIANDER aanbevolen) is nadeelig. — In werkelijk tegennatuurlijke vernauwing van den baarmoedermond is de verwijding van denzelven door het mes het beste middel, hetwelk meermalen met eenen gelukkigen uitslag in het werk is gesteld, en altijd de voorkeur verdient boven de inscheuring, die in deze gevallen volgt op het geweld der weeën. In zeldzame gevallen kan (als een gevolg van ontsteking) de vernauwing zoo sterk zijn, dat de baarmoeder eerder van de scheede zou afscheuren, of met het kind worden afgedreven, dan dat eenig deel van het kind eenen doorgang zou kunnen vinden. Zie FRITSE, in HORN'S *Archiv für med. Erfahr.* III. B. 1. St. S. 35. PIETSCH, *Journal de médecine*. Tom. XXXVIII. p. 76. SAUCEROTTE, *Ibid.* Tom. XXVIII. p. 64. MOLL en ELDIK'S *prakt. tijdschrift*, VII. Jaarg. 5. St. bl. 449—455. FRORIEP'S *Notizen u. s. w.* XVIII. N°. 6. GUILLEMOT, *Journal universel des sciences médicales*. Paris, 1828. Jan. WITTIG, *Diss. sistens observationem vaginae in parturiendo disruptae*. Wurceb. 1828. NAUGHTON, in *the London medical repository and review*. Lond. 1828. Mai. Vooral ook E. VON SIEBOLD, *Handboek enz.* III. D. 2. St. bl. 211—235.

- J. J. BEHLING, *de rupto in partu utero*. Altdorf. 1736.
in HALLERI *disp. chir.* Vol. III. N^o. 82.
- J. J. MULLER, *de rupto in partu utero*. Basil, 1745. —
Ibid. N^o. 83.
- H. N. CRANTZ, *commentarius de rupto in partus doloribus
a foetu utero*. Lipsiae, 1756. 8.
- J. C. GEHLER, *Progr. III. de utero in partu rupto*. Lips.
1783. 4. in deszelfs *kleine Schriften*. II. Th. N^o. 9. 10. 11.
- DENALX, *Diss. sur la rupture de la matrice*. Paris, 1804. 4.
- SAXTORPH, *gesamm. Schrift*. S. 274.
- * * BOER'S *Abhandl.* I. Bd. 1. Buch. S. 24. ff. S. 62. fgd.
II. Bd. 4. Buch. S. 60—68.
- STEIN'S *Annalen*. 1. Stück. S. 101.
- LODER'S *Journal*. 2. Bd. S. 768.
- Geschichte einer Zerreissung der Mutterscheide von C. L.
KLOSE, in VON SIEBOLD'S Journal für Geburtshülfe etc.*
I. B. 1. St. S. 80.
- K. E. HEDERICH praes. C. G. ESCHENBACH, *diss. sistens
partus cum placenta praevia atque ruptura uteri com-
plicata, historiam*. Lips. 1814. 4.
- Die Zerreissung der Gebärmutter etc. ein Prozess. zwis-
schen BAUDELOCQUE und SACOMBE, a. d. Fr. mit Anm.
von G. K. H. SANDER*. Goett. 1807. 8.
- Cases of laceration of the uterus*. Bij RADCLIFFE WOOD.
London medical repository. 1821. Juny pag. 450.
(hoogst belangrijk.)
- LASSUS, *Heelkundige Ziektekunde*. II. D. 2. St.
- * * * MÜLLNER'S *Nachricht von einer sammt dem Kinde
ausgefallenen Gebärmutter*. Nürnberg. 1771.
- J. VON SIEBOLD, in *Lucina*. III. Bd. 3. St. S. 372.
- * * * * J. LABORDETTE, *Obliteration presque totale du va-
gin chez une femme grosse de son second enfant*.
In het *Journal de medecine par CORVISARD, LEROUX
et BOYER*. 1812. Tom. XXII. p. 138.

Journal de médecine. Tom. XXX. p. 140.

Zwei Fälle von Ruptur des Uterus von J. G. COFFIN,
in de *Salzb. med. chir. Zeitung.* 1819. p. 325.

§. 269.

12) *Te groote helling van het bekken* (§. 51. 52. 253), welke zich door een hangbuik, zonder verflapping van de buikbekleedselen, door diepe inbuiging van de ruggegraat, door beneden- en achterwaarts gerigte uitwendige teeldeelen, te kennen geeft, belet gewoonlijk het voorwaartsdringen van het voorliggende hoofd, geeft aanleiding tot het uitzakken van andere deelen, en verwekt daarbij ligtelijk drukking op de pisblaas en moeilijke pisontlasting, enz. 13) *Een te wijd bekken* (§. 66.) veroorzaakt, dat het voorliggend hoofd in het laatste tijdperk der zwangerheid (vooral wanneer het *bekken*, bij een wijden bekkeningang, tevens eene *geringe helling* heeft) geheel in het bekken treedt, en bij de zwangere vrouw het gevoel verwekt, als wilde er iets uit haar ligchaam dringen; de voeten en schaamlippen zwellen op, en de stoelgang en de pisontlasting is belemmerd. Is ook de uitgang te wijd, dan kan de verlossing te spoedig eindigen, het kind met de vliezen geboren worden, op den grond vallen, en allerhevigste bloedstortingen, ja dikwijls zelfs omkeeringen van de baarmoeder ontstaan.

J. C. EBERMAIER, *de nimia pelvis muliebris amplitudine*
et. Gött. 1797.

FACTORPH'S *gesammelte Schriften.* S. 37.

L. V. HERDER, *Beiträge etc.*

14) *Eene wezenlijke* (en betrekkelijke (§. 272.)) *te groote engte des bekkens* (§. 64 en 65.), waarbij het ligchaam op het einde der zwangerheid niet flinkt, en het voorliggende deel (het hoofd) in het bekken bijna niet bereikbaar is. Het kind kan in het geheel niet, of alleen met moeite, in den ingang des bekkens komen, het blijft te lang in de bekkenholte zitten, en kan in het geheel niet, of ten minste niet door de natuurkrachten alleen, door den uitgang heendringen.

15) *Vreemde deelen, die de ruimte des bekkens verminderen*, maken insgelijks de verlossing onregelmatig, al ware zij ook ten aanzien van de ligging des kinds volkomen regelmatig; daartoe behooren: *a)* eene zoodanige ophooping van pis in de blaas, dat er gevaar van verlamming volgt; *b)* blaassteen; *c)* verhardingen, gezwellen ** en *abscessen* in de scheede (en in de naburige deelen), die somtijds, als zij zich bij het doordringen des hoofds openen, een minkundigen verloskundige kunnen doen vermoeden, dat de etter uit het hoofd des kinds is gekomen; *d)* beenuitwasfen, beenspekgezwollen in de bekkenholte, en meer dergelijke gebreken. Somtijds moet men hiertoe ook opgehoopte drekstoffen brengen (*).

(*) Daar men eenige zeldzame gevallen heeft waargenomen, waarin de blaas tegelijk met den voorsten wand der scheede voor het hoofd was ingedaald, zoo zij men steeds oplettend, om een dergelijk gezwel niet voor de gespannene watervliezen te houden, maar hetzelfde door den catheter te onderzoeken en te doen verdwijnen. Men leze A. SNOEK, *Verlosk. waarn. van zeldzame gevallen*, Leid, 1792. 6. waarn. — CORVISARI's *Journ. de médi-*

E. A. BUECHNER, *de difficultate pariendi ex mala pelvis conformatione*. Halae, 1756. (vergelijk §. 67.)

MEYER, *de partu difficili et laborioso ob angustam nimis et depravatam pelvim*. Argent. 1777.

** DREW, in het *Edinburgh medical and surgical journal*. Jan. 1805, in het Hoogd. vertaald (in de voorrede van ABERNETHY's *med. chir. Beobachtungen*) door G. F. MECKEL, Halle 1809. V—XV.

MERRIMAN, in de *medico-chirurgical transactions*. Vol. X. Part. 1. Lond. 1819.

E. C. DE FREMERY, *de mutationibus figurae pelvis etc.* L. B. 1793. 4.

Ceb. Demonstr. VII. Heft. Taf. 27-30. Heft 1. Taf. 2.

III. *Van de onregelmatige verlossing, ten gevolge van gebreken en ziekten van het kind.*

§. 271.

De oorzaken, die tot de derde klasse der onregelmatige verlossing behooren, door welken eene anders regelmatige verlossing (§. 228—251.) onregelmatig, en eene vroeger reeds onregelmatige (§. 252—270.) nog meer onregelmatig wordt, betreffen niet alleen het kind, maar ook de deelen die het omgeven. —

cine. Tom. XXV. 1822. p. 398. Gevallen van knoestgezwellen in de scheede verhaalt VAN DEN ENDEN, t. a. pl.

Abscesfen moeten, indien zij den doorgang verhinderen, en van zelve niet bersten, geopend worden; men verzekere zich echter vooraf van den waren aard van het gezwel om geene scheedebreuk voor een absces te nemen. Somwijlen is de stofverzameling achter de scheede in de buikholte en belet de verlossing, of de scheede loopt gevaar van daardoor te bersten; in dit geval doet men best het gezwel bij tijds te openen door middel eener *troiquart*, make echter de wond zoo klein mogelijk.

Eigenlijk zouden hiertoe ook de buitenbaarmoederlijke zwangerheid (§. 129—201.), en de onregelmatige liggingen des kinds (§. 253—261.) behooren, indien zij niet, wegens hare groote belangrijkheid, eene afzonderlijke beschouwing hadden gevorderd.

§. 272.

A. Tot de *oorzaken, die alleen het kind betreffen*, behoort: 1) *een te groot hoofd van het kind*, dat of wezenlijk te groot (zoodat zijne afmetingen de vereischte maat (§. 169.) overschrijden), of slechts in zoo verre voor een bekken van gemiddelde ruimte te groot is, als de naden en fontanellen gedeeltelijk of geheel verbeend zijn (hetgeen echter slechts zeldzaam plaats heeft), zoodat de beenderen van het bekkeneel niet over elkander kunnen heen schuiven, en op deze wijze het hoofd niet behoorlijk naar het bekken kunnen wijzigen. Het gevolg daarvan is, dat het hoofd niet behoorlijk door het bekken gaat, maar in eene der openingen daarvan vast blijft staan. Men noemt dit *de beklemming* (*paragomphosis, caput inouncatum*.) en neemt gewoonlijk drie graden daarvan aan. De eerste graad, waarbij het hoofd wel bijna onmerkbaar, hoezeer toch werkelijk, in het bekken voortbewogen wordt, moet (bijaldien er door bijzondere omstandigheden geen gevaar voor moeder of kind ontstaat), nog niet als onregelmatig, maar als eene *schijnbare beklemming* beschouwd worden, die ook kan voorkomen, als het hoofd gedurende eenigen tijd in eene minder gunstige afmeting of in eene eenigzins scheeve ligging intreedt. In den tweeden graad, waar de weeën het te groote hoofd niet

meer kunnen doen vorderen, maar altijd zwakker worden, kan de verlossing door de krachten der natuur niet anders volbragt worden, dan door het kind daarbij aan een bijna zeker levensgevaar bloot te stellen, en de moeder aan eene menigte gevaarlijke toevallen te onderwerpen. In den derden graad van de beklemming zijn de krachten der natuur doorgaans niet toereikend, om de verlossing te volbrengen; het hoofd is te groot, al ware ook na den dood des kinds, door de flinking van het hoofdgezwel, zijn omvang eenigzins verminderd. De beklemming kan echter ook bij eene volkomen regelmatige gedaante van het hoofd plaats hebben, als het hoofd, wegens een te eng bekken, slechts eene betrekkelijke (§. 270.) overmatige grootte heeft (*).

(*) Wanneer de verhouding van het kind tot het bekken zeer ongelijk is, kan het in het geheel niet ingeklemd worden; dus zal een hoofd van drie en een half duim in zijne dwarse afmeting niet in eene *conjugata* van twee duim indringen, maar boven het kleine bekken beweegbaar blijven liggen; dan als de *conjugata* drie duim houdt en het kind de gewone grootte heeft, is somtijds de werking der natuur zoo vermogend, dat zij het hoofd, door de naden over elkander te schuiven, genoegzaam kan verkleinen, om hetzelve in de vernaauwde *conjugata* te drijven. Dan offchoon wij ons in vele gevallen over het groot vermogen der natuur met regt mogen verwonderen, zoo is hetzelve in ware beklemming veelal ongenoegzaam; na lang wachten sterft het kind, en de moeder komt om door de kwetsing, drukking, ontsteking en versterving der deelen, die met de verlossing in betrekking staan, en door de uitputting van hare krachten. Gelukkig dat wij in de tang (indien slechts de evenredigheid tusschen kind en bekken

J. E. HEBENSTREIT, *de capitonibus laboriosa partu nascentibus*. Lips. 1743. 4.

J. C. AULBER, *Diss. de praegnandi foetus capite partum impediante*. Giessae, 1745. 4.

ARMBRUSTER, *de paragomphosi capitis foetus in partu*. Goett. 1749.

KALTSCHMIDT, *de variis partus impedimentis ex capitis vitio*. Jena, 1757.

SANTORPH's *ges. Schriften*. S. 71.

niet al te groot is) een middel hebben dat ons niet ligt verlaat.

In eene ware beklemming (die alleen na voorafgegane sterke weeën ontstaat), staat het hoofd vast in het bekken, het voorliggende deel is geweldig gezwollen en daardoor lager ingedaald, terwijl het beenig gedeelte van het hoofd geplaatst is, tuschen twee punten van den ingang des bekkens, en niet dan met vele moeite opwaarts, en somtijds nog bezwaarlijker naar beneden, bewogen wordt. De zachte deelen der barende zijn door den verhinderden bloedsomloop, de scheede en de baarmoedermond door de drukking zelve, welke ontfeking en versterking veroorzaakt, sterk gezwollen; tevens is de pisonlasting meestal geheel verhinderd. In verreweg de meeste gevallen ligt het hoofd met zijne dwarse afmeting in de rechte van den ingang (zie §. 63.); doch de beklemming kan ook in de dwarse en schuinsche afmetingen des bekkens plaats hebben, en hoewel de beklemming meest in de bovenste opening geschiedt, kunnen echter ook in het midden en aan den uitgang van het bekken gebreken in de evenredigheid plaats hebben, die de geboorte van het hoofd verhinderen. — De beklemming van andere deelen, dan het hoofd, wordt bij §. 485 behandeld.

§. 273.

2) *Wanfstaltigheid des kinds*, namelijk: de *monstra per excessum* (§. 283.). Gewoonlijk is ook het be-
loop der verlossing van zulke wanfstaltige kinderen
onregelmatig, hoezeer er ook vele voorbeelden zijn,
dat de natuur alleen zonder groote moeilijkheden
zoodanige verlossingen volbragt heeft, (Van dien aard
is bij voorbeeld de geboorte van een kind met twee
hoofden, of van twee kinderen, die op de eene of
andere plaats des ligchaams met elkander zijn zamen-
gegroeid. — *Onvolkomene misgeboorten en wanfstal-
tigheden (monstra per defectum et situm mutatum)*
maken gewoonlijk alleen de herkenning en niet den
afloop der verlossing bezwaarlijk (§. 184 en 185.),
of het moest zijn, dat, als er een deel ontbrak, een
ander deel weder zeer groot ware, b. v. als bij hoof-
delooze kinderen, waar men de hersenen bloot op de
grondvlakte des schedels voelt liggen (*acephali*), de
schouders zeer breed en dik zijn (*).

(*) Dit laatste heeft bij hoofdelooze kinderen vooral
plaats, is echter zelden oorzaak eener onregelmatige verlos-
sing, en dan zelfs is kunsthulp niet moeilijk. Hij, die
de meest voorkomende gevallen van misgeboorten steeds
voor oogen heeft, de noodige verloskundige kennis en
een goed oordeel bezit, zal voor elk dezer gevallen ge-
makkelijk de wijze hoe te helpen kunnen opmaken. —
De hindernissen, welke door de gebrekkige vorming der
vrucht aan de verlossing worden toegebracht, zijn onlangs
naauwkeurig beschreven door A. DUGÉS, in de *Memoires de
l'academie royale de medicine*. Tom. I. Paris, 1828. 8.
met 6 pl. Eene verlossing, die door buitengewoon groote
nieren onregelmatig was, beschreef J. F. OSIANDER, *Gemeins.
Deutsche Zeitschrift*. Weimar, 1826. 1. St. Vergelijk
verder de bij §. 185—185 aangeh. schrijvers, en *Dict.
des sciences med. art. monstruosité*.

3) *Waterzucht van het kind*: a) *Waterhoofd* (*hydrocephalus*), hetwelk men herkent uit de ver van een verwijderde naden en aan de veel te groote fontanellen, en hetwelk zich somtijds boven den bekken-ingang voordoet, als een groot en plat gewel, met eenige beendeelen en eene meer of minder duidelijke vochtgolving. Het hoofd kan daarbij α) geheel buitengewoon kegelvormig gepunt, of β) plat gemaakt worden (dit laatste heeft gewoonlijk aan de grondvlakte des schedels plaats, en het water vloeit door mond, neus, oogen en ooren weg); in beide gevallen kan het hoofd alsdan door de weeën alleen voort bewogen worden, of γ) het wordt in het bekken beklemd, of δ) het kan zelfs niet in het bekken dringen, en in deze beide gevallen kunnen de krachten der natuur niets uitrigten. (*) b) *Buikwaterzucht* kan bij een voldragen kind den voortgang der verlossing tot een hinderpaal zijn, dien men nog daarenboven dikwijls niet eens verwachtte, dewijl het hoofd niet groot is en gemakkelijk geboren werd. Het kind overleeft zijne geboorte in het geheel niet, of slechts een zeer korten tijd. Is het kind ontijdig, dan wordt de verlossing minder door de buikwaterzucht

(*) Men kent het waterhoofd, behalven door de opgegevene verschijnselen, ook door zijne bijzondere grootte, welke men door het inbrengen van de hand ontdekt. — Het wordt naar omstandigheden door de natuur, de keering, de tang, door afstapping van het water door der troicar of door den haak verlost.

verhinderd. (*) 4) *Stuipen van het kind* maken insgelijks eene verlossing wel onregelmatig; doch het is evenzeer moeilijk om stuipen van sterke bewegingen des kinds te onderscheiden.

GEHLER'S *kleine Schriften*. I. B. S. 372.

LEONTOWILSCH, *de partu praeternaturali ex vitiis trunci foetus*. Argent. 1766.

§. 275.

B. *Tot de gebreken der deelen, die tot het kind behooren en het omgeven*, door welken eene verlossing onregelmatig wordt, brengt men: 1) *te groote dikte en sterkte der vliezen*, zoodat zij niet ter regter tijd scheuren, maar veeleer diep in de scheede afgedreven worden, en aanleiding tot verwisfeling en zeer ongunstige toevallen kunnen geven. — Het is echter ook nadeelig, als de vliezen *al te dun zijn*, en daardoor te vroeg, of nog op eenigen afstand van den baarmoedermond breken, waarbij alsdan het lamsvocht te vroeg wegvloeit, en de verlossing, vooral bij voor de eerstemaal barende vrouwen, moeilijker kan gemaakt worden. (†)

Ueber den früheren Abgang des Fruchtwassers und die Furcht vor trocknen Geburten. Von W. J. SCHMITT, in de medicin. Jahrbüchern des K. K. Oester. Staates. VI. B. 4. St. 1821. S. 32.

(*) Wanneer de verlossing van een zoodanig kind zeer moeilijk is, tappe men ook hier door de kromme *troicar* van FLEURANT of eenig ander werktuig het water af.

(†) Bij een zeer wijd bekken wordt somwijlen de vrucht met het geheele ei uitgedreven, waardoor somwijlen doodelijke slaauwte, en indien de zamentrekking niet spoel-

Gebreken van den navelstreng. a) Men vermoedt, dat de *navelstreng te kort*, of *te lang*, of *meermalen* om het kind gewonden is, als het hoofd, bij eene regelmatige verhouding tusschen het hoofd en bekken, bij goede weeën enz. hoog en beweeglijk blijft staan, en de verlossing evenwel niet vorderen wil, en als er, wegens het losworden van den moederkoek, telkens na iedere wee eenig bloed ontlast wordt. Te onregte heeft men echter de terugwijking van het hoofd na

dig volgt, geweldige bloedstorting kan ontstaan. — Door te groote dikte der vliezen kan de moederkoek te veel getrokken en te vroeg losgemaakt worden, en daaruit bloeding ontstaan, of bijaldien dezelve aan den bodem der baarmoeder vast blijft zitten, kan deze mede binnen- en benedenwaarts getrokken worden. — Te vroeg (dat is voor het einde van het tweede tijdperk der verlossing) gebrokene vliezen, vertragen de behoorlijke ontsluiting van den baarmoedermond, het achterste of tweede vruchtwater vloeit te spoedig af, de teeldeelen worden droog en hard, en de verlossing traag en pijnlijk. Zie D'OUTREPONT, in *Gemeinsame Deutsche Zeitschrift*. Bd. III. Stuck I. — Het is echter niet altijd de teederheid der vliezen, die het water te vroeg doet afloopen: drukking derzelve tusschen de beenderen van het bekken en het ligchaam des kinds, verkeerde ligging, scheeve baarmoeder, uitwendig geweld, stooten, hoesten, niezen, het onvoorzigtig inbrengen van de hand en vingers enz., kunnen hiertoe medewerken. — Niet altijd echter heeft het vroegtijdig afloopen van het water nadeelige gevolgen. Zie DUGÈS in de *Memoires de l'academie royale de Médecine*. Paris, 1828. Tom. I. L. MENDE, *Beobachtungen und Bemerkungen aus der G.* II. Goett. 1824.

elke wee, die op het einde van het vierde tijdperk geschiedt, als een kenmerk dezer omflinging beschouwd. (*) b) *Affscheuring der* (welligt zeer weeke of korte) *navelstreng*, door ongepaste kunsthulp of stuipachtige bewegingen des kinds (?) verwekt, wordt alleen door het onderzoek erkend, en is, uithoofde der bloedstorting, zeer gevaarlijk voor het kind (†). 3) *De uitzakking der navelstreng* is dikwijls reeds voor het breken van de vliezen voelbaar; zij komt het meest voor bij eene onregelmatige ligging des kinds, doch ook bij het voorliggen des hoofds of der billen, of bij het intreden der voeten. Eene uitgezakte navelstreng maakt de verlossing daarom onregelmatig, dewijl de plaatshebbende bloedsomloop

(*) Deze terugwijking toch is een gevolg van den vorm van het hoofd en bekken, en kan ook door krampachtige zamensnoering van de baarmoeder (§. 267.) bevorderd worden. G. L. MIGCHORIUS, *de funiculo umbilicali foetus collum stringente*. Gron. 1822. 8. W. A. CRONE, *de prolapsu funiculi umbilicalis*. Gron. 1816. 8.

(†) Ook voor de moeder somwijlen zeer gevaarlijk en pijnlijk, door het te vroege losgaan en de verscheuring des moederkoeks, en wegens de verbloeding. Eene zoo korte navelstreng, dat de geboorte daardoor verhinderd wordt, is zeldzaam; omflingingen echter zijn niet zeldzaam, zij kunnen het kind eene verkeerde ligging geven, de halsaderen drukken en eenen apoplectischen dood veroorzaken. Somwijlen ook breekt de navelstreng, als wanneer het kind, (ten zij het op hetzelfde oogenblik geboren wordt,) aan belette bloedsomloop en verbloeding sterft. Eene leerzame beschrijving eener misgeboorte zonder navelstreng, vindt men bij FRORIEP, *Geburtshülfliche Demonstrationen*. Weimar, 1826. Tab. 14.

in de navelstreng door de drukking, die zij tusfchen het voorliggende deel des kinds en de beenderen des bekkens lijdt, of door de toetreding van den kouden dampkring, gestuit of tot volkomen stilland kan gebragt worden. (*)

BOER's *Abhandl. und Versuche*. II. Bd. IV. Buch. S. 135.

ZELLER's *Bemerkungen etc.* S. 50. fgd.

H. J. F. ALBERT, *Diss. de iis, quae in partu nobis offert funiculus umbilicalis, impedimentis*. Goett. 1804. 8.

J. C. G. JOERG, t. a. pl. pag. 66.

§. 277.

De geheele of gedeeltelijke plaatsing van den moederkoek op den baarmoedermond (waarvan de oorzaken nog niet geheel bekend zijn) vermoedt men voor de verlossing, als er in de laatste helft der zwangerheid steeds van tijd tot tijd kleine bloedstortingen uit den eenigzins geopenden baarmoedermond plaats hebben, en het ligchaam platter is, dan naar gewoonte. De weeën zijn bij de verlossing onbeduidend, en de bloedstorting wordt bij iedere wee vermeerderd, terwijl de bloedstorting in andere gevallen altijd door de zamentrekkingen der baarmoeder wordt verminderd. Dikwijls houdt de bloedstorting voor een korten tijd

(*) Zoodra de navelstreng aan de lucht is blootgesteld, begint door de koude het bloed stil te staan, en het kind sterft. Drukking der navelstreng kan dezelfde uitwerkselen te weeg brengen. Men trachte bij uitzakking dezelve in de uitholling van het heiligbeen te plaatsen; en bijaldien de baarmoedermond genoegzaam geopend, en het hoofd reeds in het kleine bekken ingedaald is, trachtte men (indien dit zonder nadeel van de moeder kan geschieden) de verlossing te bespoedigen. NAEGELE, *Heidelb. klinische Annalen*, III. B. 4. Heft. S. 486. MOLL en ELDIK's *praktisch tijdschrift*, VIII. Jaarg. bl. 173 volgg.

op, en men kan (bij eene horizontale plaatfing der vrouw), wegens het geronnen bloed, den moedermond in het geheel niet bereiken; na eenigen tijd, vooral wanneer het bloed, dat de fcheede opvult, wordt weggenomen, keert de bloedftorting met nieuwe hevigheid terug. In den geopenden baarmoedermond voelt men een oneffen ligchaam, dat zich op het gevoel bijna even als de bovenfte vlakke van den weeken kruin van eene bloemkool voordoet. De gevolgen en verschijnselen van deze plaatfing des moederkoeks zijn: de zeer gevaarlijke bloedftorting, en meestal ook de fcheeve ligging des kinds. (*)

BRUNNER, *de partu praeternaturali ob situm placentae super orificium internum uteri.*

J. C. BRAND, *de secundinis ambitui ostii matricis interni adfixis.* Lugd. Bat. 1770. *recus* in SCHLEGEL's *Sylloge*. Vol. 2. N^o. 22.

F. B. OSIANDER, *de causa insertionis placentae in uteri orificium etc.* Goett. 1792. — Dezelfde, *Denkwürdigkeiten für die Heilkunde*. S. 308.

SAXTORPH's *gesammelte Schriften*. S. 213.

OBERTAEUFER, in STARK's *neues Archiv*. B. I. St. 2. S. 1.

(*) Bij voorliggende moederkoek moet men, zoodra de deelen eenigzins zijn voorbereid, de verlossing bevorderen, dewijl men, behalve het bloedverlies, dat de vrouw reeds gedurende de verlossing ondergaat, ook nog na de zelve veel te duchten heeft. Bloedstempende middelen en rust, hoewel niet te verwerpen, zijn echter slechts palliatieve middelen. Zie *Annalen für die gesammte Heilkunde*. III. B. 2. Heft. S. 146. *Gemeinsame Deutsche Zeitschrift*. II. B. 3. Heft. S. 539. MOLL en ELDIK, *praktisch Tijdschrift*, VII. Jaarg. 6. St. bl. 551. VIII. Jaarg. 4. St. bl. 369. 2. St. bl. 200. *Geburtsh. Demonstratr.* IX. Heft. Taf. 37 en 38. *Tijdschrift van Vis unita fortior*, Amst. 1830. III. D. 2. St. bl. 188. volg. bl. 201. volg.

C. F. HEFFTER, *Diss. de placenta praevia*. Lips. 1804. 4.
KÖLPIN, *de placenta praevia in partu*. Francof. 1791. 4.
GABRIEL RÜSCH, *von den Mutterblutflüssen während der Schwangerschaft und Geburt, und von dem Sitz des Mutterkuchens auf dem Muttermunde*. Würzb. 1817. 8.

§. 278.

5) *Te vroege loslating van den moederkoek* kan insgelijks eene anders regelmatigte verlossing onregelmatig en gevaarlijk maken (*). 6) *Een ongewoon vaste samenhang van den moederkoek met de baarmoeder*, maakt het vijfde tijdperk der verlossing onregelmatig door bloedstorting, als de baarmoeder verzwakt of welligt eene plaats des moederkoeks afscheiden, en slechts een gedeelte daarvan zoo ongemeen vast met de baarmoeder verbonden is. (†)

(*) Namelijk door bloedstorting; de hoeveelheid en snelheid van deze, de staat der weeën en de toestand der deelen moeten beslissen of dezelve gevaarlijk voor moeder en kind is, en of men de geboorte moet bespoedigen.

(*) Zoo lang de moederkoek overal vastzit, ontstaat er geen bloedvliet; doch zoodra dezelve gedeeltelijk loslaat, stroomt het bloed naar buiten, en alvorens de moederkoek niet geheel losgemaakt is, kan de baarmoeder zich niet geheel zamentrekken. Uitvoerig vindt men over den belleten voortgang der nageboorte gehandeld in E. VON SIEBOLD's *Handboek enz.* III. D. 3. en 4. St. bl. 329—352. en aldaar aangehaalde litteratuur. Zie over de ziekten des moederkoeks, vooral als oorzaak van den dood des kinds BRACHET, in het *Journal général de médecine etc.* Paris, 1828. en *Revue médicale française et étrangère etc.* 1828. Mars. p. 476. gedeeltelijk overgenomen in MOLL en ELDIK's, *prakt. Tijdschrift*, IX. Jaarg. III. St. bl. 246. volgg. STEINTHAL, ald. IV. Stuk. bl. 357. A. E. VON SIEBOLD, *Journal für Geb. etc.* IX. B. 2. St. S. 466.

IV. *Van de onregelmatige verlosfingen
door verkeerde kunsthulp.*

§. 279.

Door verkeerde kunsthulp kunnen ook de regelmatigste verlosfingen, in elk tijdperk derzelven, onregelmatig, en de oorspronkelijk onregelmatigen nog verergerd * worden; en behalven de reeds in het voorbijgaan vermelde, *te vroege en gebrekkige pogingen der kunst* bij regelmatige verlosfingen, behooren hiertoe vooral de volgende gevallen: 1) *Terugblijving van bijzondere*, van het overige ligchaam losgerukte *deelen des kinds*; zoo kan *a*) de romp des kinds terugblijven, als hij, wegens beklemming van breede schouderen of van een wanstaltig ligchaam, bij reeds geboren hoofd niet wil volgen, en nu, door een onverstandig sterk trekken aan het hoofd, de hals afgerukt wordt; zoo kan *b*) het hoofd terugblijven, als na eene voetgeboorte het hoofd (als het volstrekt of betrekkelijk te groot is, of door krampachtige zamentrekking van den baarmoedermond teruggehouden wordt) niet wil volgen, en er aan den romp zoo ruw en onhandig getrokken wordt, dat hij van het hoofd wordt gescheiden. Weekheid en rotting der vrucht, als ook sterke helling des bekvens en eene onvoorzigtige, plotselinge oprigting der moeder, kunnen zulk eene afscheuring begunstigen. (*)

SCHUBART, *de obstetricantium erroribus circa partum difficilem etc.* Lips. 1777.

(*) Het achtergebleven hoofd draait in dit geval naar alle kanten, en wordt, bij gebrek aan steunpunt, door de

§. 280.

2) Ook *verbreking van de beenderen des kinds* maakt eene verlossing onregelmatig, en vordert somtijds de hulp der kunst. 3) *Afgebrokene stukken van instrumenten*, die in de scheede en de baarmoeder gedrongen en aldaar gebleven zijn, maken insgelijks, dat de verlossing bijzondere kunsthulp behoeft. (*)

V. *Van de ontijdige verlossing.*

§. 281.

Wij verstaan hieronder thans elke verlossing in de eerste zes maanden der zwangerheid, en alzoo ook de miskraam (*abortus*. §. 213.), wanneer de vrucht nog niet op zich zelve, van de moeder afgescheiden, kan bestaan. Het meest komt de miskraam in de derde en vierde maand voor, wanneer de aanhechting van den, nog niet volkomen gevormden, moederkoek nog niet vast is, en in welk geval dezelve bijna altijd plaats heeft op het tijdstip, waarop de vrouw, ingeval zij niet zwanger geweest ware, haren gewonen stondenvloed zou gekregen hebben.

§. 282.

Tot de oorzaken, die de miskraam verwekken, behoort alles, wat de ontwikkeling van de zwangere

kunst zeer moeilijk in het bekken gebragt; terwijl de romp, goed geplaatst, en het bekken ruim genoeg zijnde, gemakkelijker is uit te brengen. Men leze hierover L. MENDE, in het *Gemeins. Deutsche Zeitschr.* IV. Bd. III. Hest.

(*) Eenige waarnemingen hebben geleerd, dat door eene bijzondere dispositie bijna alle beenderen, vooral van het hoofd, gebroken waren; hetgeen van belang is voor de geregtelijke geneeskunde.

baarmoeder, de vorming van het ei en van de vrucht, en vooral de verbinding van het ei met de baarmoeder kan verhinderen. — 1) Alle heete (niet ligt, echter slepende) asthenische ziekten, bij voorbeeld in de typhouse epidemie van het jaar 1813, kregen in *Wurtemberg* vele vrouwen, die daardoor werden aangetast, eene miskraam, met oogenschijnelijke verbetering harer ziekte; 2) ware volbloedigheid (die men echter uit de vroegere oorzaken, en niet blootelijk uit dikwijls bedriegelijke verschijnselen, moet leeren kennen); 3) hevige opwekkende gemoedsbewegingen (bij voorb. schrik), doch vooral de zoogenoemde nederdrukkende zielsaandoeningen; 4) sterke aderlatingen en vele hevig werkende drastische ontlastmiddelen; 5) te sterke, ongewone, of onvoorzigtige lichaamsbewegingen; 6) onmatigheid in den bijslaap, te spoedig op elkander volgende bezwangeringen, gebreken van het weeffel der baarmoeder, b. v. knoestgezwollen, polypen enz.; 7) verschillende, van buiten op de baarmoeder of op het ligchaam der vrouwen werkende, oorzaken, b. v. de drukking van een blaassteen, stooten, slagen, of een val op het onderlijf, wonden van de baarmoeder, alsmede alle *beledigingen van de vliezen* door den baarmoedermond. (*)

(*) Wanneer zwangere vrouwen door heete koortsen met sterke uitputting worden aangedaan, zijn zij zelden zoo gelukkig van een levend kind ter wereld te brengen; blijkens de epidemie van 1826 en anderen. Vergelijk mijne verhandeling in de *Nat. Verh. van de Holl. Maatsch. te Haarlem*. XVIII. D. bl. 53. en aldaar aangeh. schrijvers.

Onder de oorzaken van miskramen schijnt ook nog de wanstaltigheid der vrucht gerekend te moeten worden;

§. 283.

Met daarlating van andere zeldzame en twijfelachtige oorzaken, moet hier nog als oorzaak vermeld worden: 8) *de achteroverkanteling der baarmoeder (retroversio uteri)*, die welligt meermalen dan men denkt eene miskraam veroorzaakt. De hals der baarmoeder wordt door zijn verband met de pisblaas (§. 103.) voor- en bovenwaarts gerigt, en de bodem der baarmoeder zinkt naar achteren in de uitholling van het heiligbeen, en verkrijgt zijne uitzetting in de bekken-

door vele waarnemers, vooral door RUISCH, WRISBERG, AUTENRIETH en SOEMMERING is opgemerkt, dat zeer vele, door miskraam uitgeworpene, vruchten, bijzonder de allerkleinsten, misvormd zijn. Voldragene monsters zijn zeldzaam. Men leze SOEMMERING, *Icones embryonum etc.* pag. 2. Zie verder over de oorzaken, gevolgen, verschijnselen, geneeswijze en litteratuur der ontijdige vruchten. E. VON SIEBOLD, *Handb over de ziekten van het vrouwel. geslacht*, III. D. 1. St. bl. 1—47. DUGÉS, in *Ephemerides medicales de Montpellier*, 1826. April. CHOULANT, HAASE, KUSTNER en MEISSNER's *Bereicherung. f. d. Geburtsh. u.s.w.* B. I. S. 91. HUFELAND's *Journal der pract. Heilk.* 1827. Jan. S. 7. BRACHET, *Revue medicale Francaise et étran. gere.* 1828. Mars. p. 476. A. E. VON SIEBOLD, *Journal für Geburtshülfe etc.* IX. B. 2. St. S. 466. Madame BOIVIN, *Recherches sur une des causes les plus frequentes de l'avortement etc.* Paris, 1828. 8. MOLL en ELDIK's *prakt. Tijdschrift*, II. Supplem. III. St. bl. 227—250. II. Jaarg. 3. St. bl. 217—226. VII. Jaarg. 1. St. bl. 1 volgg. IX. Jaarg. 3. St. bl. 246. 4. St. bl. 357. — Bij deze schrijvers vindt men veel belangrijks omtrent de ziekten, het vroeg afsterven der vrucht en de oorzaken der miskraam.

holte. (Daalt de baarmoeder daarentegen naar voren, zoo als hoogst zeldzaam gebeurt, dan bestaat er eene *vooroverkanteling der baarmoeder (pronatio uteri)*. In de derde maand vindt de baarmoeder in de bekkenholte geene ruimte meer, en dewijl zij zich nu niet, gelijk behoorde, boven het bekken voorwaarts kan uitzetten, zoo wordt zij beklemd en verwekt door de drukking op de naburige deelen buikverstopping en pisopstopping. De mond der baarmoeder staat dan zeer hoog, boven aan de schaambeenderen; doch de bodem staat van achteren diep in het bekken, en kan zeer gemakkelijk door den endeldarm gevoeld worden. Als er geene hulp wordt aangebragt, en er ten gevolge van deze achteroverkanteling geene miskraam ontstaat, dan kan zij ontsteking der teeldeelen, versterking der blaas en eindelijk den dood te weeg brengen (*).

J. MELITSCH's *Abhandlung von der sogenannten Umbeugung der Gebärmutter*, Prag. 1790.

W. HUNTER, in de *medical observations and inquiries*. Vol. IV. Lond. 1771.

(*) Hoogstbelangrijk over de verplaatsing, voor- en achteroverkanteling, ombuiging, binnen- en buitenwaartskeering, de oorzaken, verschijnselen enz. der baarmoeder, is E. VON SIEBOLD's *Handboek, enz.* IV. D. 2. St. bl. 273 — 291. Bij de door FRORIEP en SIEBOLD, en de reeds bij §. 104 opgegevene litteratuur, voege men: *Heidelberger klinische Annalen*, IV. B. 2. St. D'OUTREPONT, in *Gemeins. Deutsche Zeitschrift*, I. B. 2. St. Weimar 1826, en *Bemerkungen und Erfahrungen über einige Gegenstände der praktische Geburtshülfe etc.* von J. PHIL. HORN, mit 2 Kupf. Wien. 1826. 8. J. HELLER, in *HIPP. Magaz.* enz. VI. D. bl. 169—177.

- ABR. WALL, *Diss. de uteri gravidæ retroversione*. Hal. 1782.
- LOHMEIER, in THEDEN's *neue Bemerkungen und Erfahrungen*, III. Th. S. 145.
- BAUMGARTEN, *Diss. de utero retroverso*. Argent. 1785.
- RICHTER's *Chirurgische Bibliothek*. V. B. 3. St. IX, B. 1. St.
- JOHN, *de retroverso utero*. Jena, 1787.
- STARK's *Archiv*. I. Bd. 1. St. II. Bd. 3. St. IV. Bd.
- M. SAXTORPH's *gesammelte Schriften etc.* S. 258.
- MURRAY, *Diss. in uteri retroversionem animadversiones*. Upsal, 1797.
- KORSHECK, *Diss. de retroverso utero*. Halae, 1799.
- BURN's *anatomy of the gravid uterus*. p. 16. ct.
- HUNTER's *Anatomische Beschreibung etc.* S. 13. in de
aanmerking.
- NAEGELE, *von der Zurückbeugung der Schwangeren
Gebärmutter etc.* in zijne *Erfahrungen etc.* S. 339. fgd.
- BUZYNSKY, *de retroversione uteri*. Vilnae, 1811.
- * * NOLDE's *Beiträge*. S. 220.
- Observazioni sopra la retroversione dell' utero sugli aborti,
e su quelli specialmente procidenti della sifylide, sulla
emorragia d'utero sopra alcuni parte difficili e sulla
lazerazione della vagina e del perineo del Dre GUISEPPE
TRINCHINETTI*. Milano, 1816.
- BERHN. FR. VAHLE, *Diss. de retroversione uteri*. Berol. 1817.
- MERRIMAN, *ou the retroversion of the womb*.
- EICHHORN, *von der Zurückbeugung der schwangern und
nicht schwangern Gebärmutter*. Würzb. 1822.

§. 284.

Alle deze oorzaken (1—8) werken bijzonder ligt bij teedere zwakke vrouwen, vooral echter bij zulke, die reeds eens eene miskraam gehad hebben; bij deze komt de miskraam zeer ligtelijk weder, en wel bij voorkeur op denzelfden tijd der zwangerheid, waarop

zij de eerste maal plaats had. Zoo kunnen er gevallen voorkomen, waarin vrouwen twaalf achtereenvolgende malen altijd in de derde maand der zwangerheid eene miskraam gehad hebben. (*)

§. 285.

De gewone *voorboden van den miskraam* zijn: 1) zwaarte, vermoeidheid, koude en stijfheid der ledematen; 2) eene ongewone zwaarte en spanning in den als puntig wordenden buik, benevens een pijnlijk gevoel van uitzetting van de lenden- en liesstreken, en aandrang tot waterlozing; 3) bij de ontijdige verlossing in de vijfde maand, kunnen ook de teekenen van den dood der vrucht gedurende de zwangerheid (§. 263.) somtijds tot voorboden dienen; 4) pijnelijke zamentrekkingen van de baarmoeder, die bijna gelijk aan de regelmatige weeën, doch slechts minder sterk zijn, en onder welken de baarmoedermond zich eindelijk opent; 5) slijmachtige, dikwijls zeer kwalijk riekende, weiachtige vloeijing, en ten laatste bloedstorting uit de teeldeelen. — Sometijds zijn echter alle deze voorboden aanwezig, en evenwel volgt de gevreesde miskraam niet; somtijds komt dezelve integendeel ook zonder voorboden. (†)

(*) Er zijn echter ook vele waarnemingen, dat miskramen, offchoon hebbelijk geworden, telkens later kwamen, zoodat eindelijk de vrouw kort voor of op den gewonen tijd beviel. Zie BAUDELOCQUE, §. 2229. — Over het algemeen zijn de oorzaken der miskraam niet ligt te herkennen en moeilijk weg te nemen.

(†) Daar voor vele dezer aandoeningen ook niet zwangere vrouwen blootstaan, en deze dezelve ook uit andere oorzaken kunnen krijgen, ziet men ligtelijk dat zij niet altijd de miskraam voorspellen.

Het ei wordt nu door de krachten der natuur, in langer of korter tijd, naar buiten gedreven. Het werktuigelijk beloop van eene ontijdige verlossing bestaat daarin, dat er te vroegtijdig, en ten gevolge van een bijzonderen, door bloedaandrang geprikkelden, toestand der baarmoeder, zamentrekkingen der laatste ontstaan, waardoor de vliezen van hun verband met de baarmoeder losgemaakt worden. Bij de miskraam in de eerste drie maanden wordt het ei genoegzaam altijd onbeschadigd ontlast; doch bij de latere ontijdige geboorten breken de vliezen vooraf; (dikwijls maakt ook het breken der vliezen, hetwelk dadelijk na eene gelegenheid gevende oorzaak tot miskraam volgt, het begin der voorboden uit); de vrucht wordt alsdan zonder de vliezen, en wel doorgaans zonder moeilijkheid, uitgedreven, welk eene ligging zij overigens ook hebben moge (*). Men heeft zelfs waargenomen, dat hoofdliggingen bij ontijdige geboorten zeldzamer zijn, dan bij tijdige. De uitdrijving der nageboorte geschiedt hier echter gewoonlijk langzamer, dan bij tijdige geboorten, en er zijn voorbeelden,

(*) Zelfs in de zesde en zevende maand kan de vrucht gemeenlijk in allerlei rigtingen, en zelfs geheel dwars door het bekken gedreven worden. — De vliezen, en vooral het daarin bevatte vocht, zijn zeker van het hoogste belang voor het bestaan der vrucht, dewijl al wat aanleiding tot belediging der vliezen en afvloeiing van het water geeft, steeds miskraam ten gevolge heeft. Zie W. J. SCHMITT, in MOLL EN ELDIK'S *Tijdschrift*, II. Jaarg. IV. St. bl. 339-343. *Medic. Jahrbücher etc.* VI. B. 4. St. S. 32. fgg.

dat zij een aanmerkelijken tijd — weken — ja maanden lang — terugblijft, tot zij onder zeer pijnelijke en langdurige weeën uitgedreven wordt; gewoonlijk wordt de vrouw eerst op dit tijdstip door de opvolgende bloedstorting in gevaar gebragt. De voorzegging wordt gemaakt naar het tijdperk der zwangersheid, naar de sterkte en aanhoudenheid der bloedstorting, de hevigheid en duur der pijnen, de koorts en andere bijkomende toevallen.

STAHL, *Diss. de abortu et foetu mortuo*. Halae, 1704.

HALLERI, *collectio disput.* Tom. IV. N^o. 139.

COOPER, *de abortionibus*. L. B. 1767.

MARRAY, *de abortu*. Edinb. 1787.

C. W. STEINMETZ, *de abortu*. Jena, 1788.

K. F. MR. JAEHKE, *de abortus causis ac prophylaxi*.

Fracof. a. V. 1795.

CHR. DE EHRHARD, *de abortu*. Landsh. 1817.

Journal für Geburtshelfer. I. N^o. 8.

Ueber früh- und spätreife Geburten. Manh. 1807.

Vergel. PLOUCQUET, *Literatura medica digesta*. Vol. I. p. 6.

DUGÉS, *Manuel d'Obstetrique*. p. 194.

VIJFDE HOOFDDEEL.

VAN DEN DOOD DES KINDS, GEDURENDE

DE VERLOSSING.

§. 287.

Het is in het geheel niet gemakkelijk om over het leven en den dood van het kind te beslissen, en daarom moet men met de grootste zorgvuldigheid alles te baat nemen, wat slechts ten aanzien van dit gewigtig punt

eenige inlichting kan geven. Men moet alzoo ook letten op den toestand der moeder en des kinds in de voorafgegane zwangerheid (§. 202, 203.), op den duur van den geboortearbeid, op den graad van de onregelmatigheid der verlosfingen en op de aangewende hulp.

§. 288.

De oorzaken, welke gedurende de verlossing den dood des kinds kunnen te weeg brengen, zijn: belediging, spanning en drukking van edele deelen van het kind, vooral bij eene ongunstige ligging van hetzelfde; stremming des bloedomloops in de navelstreng (§. 276.); vroege loswording van den moederkoek voor dat het kind geboren is; toetreding van den dampkring tot de luchtwegen van het kind, die, eene onvolkomene adembaling ten gevolge hebbende, naderhand weder ophoudt; niet wel verrigte, of ook slechts te langdurige kunstbewerkingen, en velerlei ziekten en toevallen der baarmoeder, enz. (*)

(*) De dood van het kind is waarschijnlijk, als de vrouw gedurende de zwangerheid of geboortearbeid veel geleden heeft, of als bij sterke weeën en reeds lang afge-loopen water de buik, borst of het ruggemerg sterk gedrukt is geworden, (zoo als bij borst-, rug-, buik- of halsliggingen plaats heeft;) wanneer de navelstreng koud of gedrukt, door mislukte keering, verkeerde plaatsing, of sterke drukking der tang het ligchaam des kinds gekwetst is, en als bij eene of meer van deze omstandigheden sommige van de genoemde teekenen des doods tevens worden waargenomen.

§. 289.

Teekenen van den dood van het kind gedurende de verlossing zijn, behalve de oorzaken daarvan, de volgende: *a*) de weeën worden spaarzamer en zwakker; *b*) het water is met pekstof of met bloed gemengd; *c*) de beweging van het kind ontbreekt; *d*) men voelt den polsslag noch aan de navelstreng, noch in de hartstreek; het niet hooren van den hartslag der vrucht bij de *auscultatie* kan niet als een teeken des doods, het hooren echter daarvan als een teeken des levens dienen (de fontanellen kunnen hier volstrekt niets beslissen); *e*) er wordt geen gezwel van het kindsgedeelte, geen hoofdgezwel, gevormd, of als dit bestaat, dan wordt het slap, en de schedelbeenderen worden ligtelijk en met een knarsend geluid over elkander geschoven; *f*) de aars is geopend; *g*) de deelen des kinds duiden geen spoor van beweging aan, ja zij zijn slap en brijachtig op het gevoel; ook toont de afscheiding der opperhuid het beginsel van rotting. De deelen des kinds zouden meer dan gewoon warm zijn op het gevoel (ADELON), dewijl de doode vrucht den overgang van de overmaat der warmte van de moeder boven de zijne niet langer wederstaat. (*)

(*) Het teeken *a*) bewijst op zich zelf weinig of niets, dewijl een dood kind even gelijk een levend door de weeën wordt uitgedreven; alleen de beweging van het kind zou de weeën kunnen vermeederen; dan deze heeft niet altijd plaats, vooral niet indien het kind schijndood is. Het teeken *b*) is bij voorliggende sluit zeer gewoon, en kan ook door drukking op den buik veroorzaakt worden. Water met bloed gemengd kan ook door gescheurde navelstreng, losgewordene moederkoek enz. te weeg gebracht

§. 290.

Doch alle deze teekenen (§. 289. *a, b, c, d, e*, en zelfs *f* en *g*) kunnen bestaan, zonder dat het kind dood is, en ook kunnen er eenigen (*a, b, f, g*) ontbreken en het kind echter dood zijn. Uit enkele teekenen moet men nimmer zijn besluit opmaken; zijn alle teekenen voorhanden, dan geven zij eene groote waarschijnlijkheid; doch als men slechts nog een enkel teeken van leven vindt, dan geldt dit meer dan eene menigte van teekenen des doods.

HENR. AUG. WRISBERG, *de signis vivi foetus et mortui in partu difficili*. Goett. 1780.

ERN. GOTTL. BOSE, *de morte foetus ejusque diagnosi*. Lips. 1785.

GEHLER's *kleine Schriften*. 2ter Th. S. 3 u. 162.

J. D. HERHOLD's *Comment. de vita imprimis foetus humani ejusque morte sub partu*. Koppenh. 1802. 8.

Dezelfde, *Comment. über das Leben und über dem Tod unter die Geburt; a. d. Lat. von J. CLEM. TODE*. Koppenh. 1803. 8.

W. L. CHUDEN, *de signis foetus vivi et mortui*. Gott. 1756. 4.

zijn; *c*) kan ook door flauwte en zwakheid veroorzaakt worden; *d*) kan slechts bij sommige liggingen van het kind worden waargenomen; *e*) heeft ook plaats wanneer door het bersten der vaten eene plaatselijke uitstorting van vocht onder de bekleedselen aanwezig is; *f*) kan ook het gevolg zijn van eenen krampachtigen toestand der sluitspier. Over het algemeen is er (blijkens de ondervinding) niets onzekerder dan de beslissing over het leven en den dood van een ongeboren kind. Uitvoerig en uitmuntend is dit onderwerp behandeld door BAUDELOCQUE, Tom. II. §. 1906—1920. Zie een merkwaardig voorbeeld van de onzekerheid van de teekenen van den dood der vrucht bij E. VON SIEBOLD, *Journal für Geburtshülfe*. VI. Bd. 2. St. S. 194. MOLL en ELDIK, t. a. pl. VI. Jaarg. 2. St. bl. 188.

VIERDE AFDEELING.

De Leer van het Kraambed.

EERSTE HOOFDDEEL.

VAN HET REGELMATIGE BELOOP DES KRAAMBEDS.

§. 291.

Na de volbragte verlossing bespeurt de vrouw eene zekere algemeene matheid, die met de gewone vermoeijng na zware lichaamsinspanningen overeenkomt, en die slechts in eenige gevallen, door eene zeer kortstondige huivering, wordt afgebroken. Er is neiging tot slaap, aan welke de kraamvrouw toegeeft, als dit door geene bijzondere omstandigheden belet wordt, en gedurende denzelven breidt zich eene gelijkmatige warmte en uitwaseming over het ligchaam uit. Bij het ontwaken uit dezen slaap, die van verschillenden duur is, voelt de vrouw zich verkwikt en denkt aan de zoging van het kind.

§. 292.

Zeldzaam echter gebeurt het dat eene kraamvrouw geheel vrij is van pijnen in het onderlijf en aan de eenigzins gekneusde teeldeelen; doch indien ook deze

pijn niet hevig is, dan kan het toch wel niet anders, of de zoo bijzonder spoedige wegneming van de uitzetting des buiks, die tot dusverre plaats gehad had, en van de daarmede gepaard gaande drukking, moet eenige gevolgen naar zich slepen. Daarbij komt nu nog, dat er ligtelijk eenig bloed, hetwelk onmiddellijk na de verlossing, uit de vaten der baarmoeder, kleine klonters vormende, in dit ingewand achterblijft; de baarmoeder tracht zich van deze vreemde ligchamen te ontdoen door *zamentrekkingen*, die men de *tweede naweeën* noemt. Deze naweeën zijn gewoonlijk menigvuldiger na ligte dan na eenigzins langdurige verlossingen, en bij vrouwen, die voor het eerst baren minder pijnlijk dan bij haar die meermalen gekraamd hebben, daar de reeds meer verzwakte baarmoeder zich bij de laatste niet zoo ligt en zoo regelmatig kan zamentrekken.

§. 293.

Na de verlossing ontlast er zich uit de teeldeel (vooral uit de plaats, waar de moederkoek aan de baarmoeder was vastgehecht) eene meer of min aanmerkelijke hoeveelheid bloed, hetwelk men de *kraamzuivering* (*lochia*) noemt. In den beginne is het uitvloeiende bloed geheel onvermengd; het gaat ten deele in kleine klonters af, en voert de overblijfselen van het afvallend vlies met zich. Zoo lang deze vloeijing, die zoo wel in de hoeveelheid als in de hoedanigheid zeer verschillend is, nog geheel rood is, noemt men dien de *eerste* of *bloedige kraamzuivering* (*lochia primitiva sive rubra*); na twee of vier dagen wordt echter het afvloeiend vocht gelijk aan bloed-

water, en op den zesden of achtsten dag is het reeds geheel bleek, ongekleurd en waterachtig, en later slijmerig: dit noemt men de *tweede* of *melkachtige kraamzuivering* (*lochia secundaria* s. *alba*). De tweede kraamzuivering duurt gewoonlijk eenige weken, vermindert dan in hoeveelheid (slechts in zeer zeldzame gevallen krijgt zij op nieuw eene geheel dikke, als etterachtige hoedanigheid), en houdt bij zogende vrouwen eerder op, dan bij niet zogende, waar zij dikwijls tot in de derde maand kan aanhouden. Somwijlen blijven ook de naweeën eenigen tijd met de kraamzuivering voortduren.

C. G. CARUS verhaalt een merkwaardig geval van eene zonderlinge vertraging en verandering der verschijnselen, die anders gewoonlijk bij pas verlostte vrouwen plaats hebben; in het *Gemeinsame Deutsche Zeitschrift* etc. Bd. I. Heft I. S. 137.

§. 294.

De teeldeelē keeren nu weldra bijna in denzelfden staat terug, in welken zij zich voor de zwangerheid bevonden, en slechts gedurende een korten tijd kan men, na de geboorte van een voldragen kind (bij eene niet voleindigde dragt vindt men dit minder volledig), het volgende waarnemen: de scheede is wijder, weeker, bloederig, smerig, en eenigzins pijnlijk; het scheedegedeelte is niet kegel- maar rolvormig, dik en als eeltachtig; de baarmoedermond is zoo wijd geopend, dat hij zeer gemakkelijk den vinger doorlaat, zijne beide lippen sluiten niet naauwkeurig op elkander (hetgeen ook in het vervolg blijft), en zijn aan haren rand hier en daar ingescheurd en gevoelig; op het onderlijf ziet men vlekken van eene vuile kleur; indien

men het niet eenigzins dikker bevindt dan te voren, dan blijven er ten minste altijd eenige dwarse plooiën overig, en boven de schaambeenderen voelt men de nog eenigzins uitgezette baarmoeder.

§. 295.

De borsten hebben nu eene matige grootte, zijn met blaauwachtige aderen doorweven, en de tepels puilen doorgaans vrij sterk uit; zij bevatten de tot de voeding des kinds gevorderde melk. Reeds voor de verlossing (§. 148.) is er eene melkachtige vloeistof voorhanden: doch eerst na de verlossing, wanneer zij dikker en beter wordt, neemt hare hoeveelheid zeer toe. Als het kind niet vroeg genoeg aan de borst gelegd wordt, dan ontstaan er stekingen en spanning in de borsten, met een ligten aanval van hitte en koude, dien men, als hij zeer zacht is, *zogkoude*, doch als hij hevig is, *zogkoorts* noemt. Zoo lang de vrouw zoogt blijven gewoonlijk de maandelijksche zuiveringen achterwege, behalve dan, wanneer zij gedurende de zoging op nieuw zwanger wordt, als wanneer zij gewoonlijk eenmaal terugkomen, om daarna op nieuw achter te blijven. Als de vrouw niet meer zoogt, dan verwekt de stremming van de zogasscheiding doorgaans weder eenige ligte toevallen, en de borsten beginnen daarna eenigzins flets neder te hangen.

J. G. GUENZ, *de mammarum fabrica et lactis secretione*. Lips. 1734.

J. R. BOEHMER, *de consensu uteri cum mammis*. Lips. 1750. 4.

J. ANEMAET, *de mirabili quae mammae inter et uterum intercedit sympathia*. Lugd. Bat. 1764.

De ondoorschijnende witte melk, die bij eene ligte drukking op de borst uit onderscheidene melkbuisjes spuit, en dikwijls van zelve uitvloeit, heeft een aangename zoeten smaak, is bijna zonder reuk, matig dik, zoodat er, als men een druppel daarvan laat vallen op den schuins gehouden nagel, bij het afvloeijen een witkleurig spoor nablijft. In een glas water gedruppeld, breidt elke druppel zich uit in eene ligte, allengskens verdwijnende wolk. Slechts de melk der eerste dagen (*colostrum*) is dunner. De bestanddeelen zijn, even als bij de melk der dieren, eene olieachtige vetstof, melksuiker in water opgelost, en de kaasachtige zelfstandigheid: slechts de verhouding der hoeveelheid is hier anders dan bij de melk der dieren. De meer naauwkeurige scheikundige ontleding levert hier gelijkaardige uitkomsten op, als bij andere dierlijke stoffen. (*)

PARMENTIER et DEYEUX, *précis d'expériences et d'observations sur les différentes espèces de lait etc.* Paris, an VIII.

(*) De vrouwenmelk wordt niet zoo snel zuur als die der planteetende dieren, stolt niet door plantenzuren en is zoeter; waarom men ook om dierenmelk voor het kind smakelijk te maken, er steeds zuiker moet bijvoegen. Een belangrijk bestanddeel der melk is ook de *vapor animalis*, waarom ook het zog op verre na zoo voedzaam niet is, nadat het eerst met den dampkring in aanraking is geweest, dan wanneer het terstond uit de borst gezogen wordt. Over de bestanddeelen en eigenschappen eener goede en gezonde melk, en over de ziekelijke veranderingen in de hoedanigheid en hoeveelheid van het zog, raadplege men E. VON SIEBOLD, *Handboek*. IV. D. II. St. bl. 405—434.

§. 297.

Bij het kind wordt na de geboorte, wanneer het eene aanmerkelijke verandering der temperatuur ondervindt, de vroegere bloedsomloop (§. 176.) onvoldoende; het bloed gaat nu eerst, in den kleinen bloedsomloop, door de longen, eer het zich door het gansche ligchaam verspreidt. Thans beginnen er verrigtingen plaats te grijpen, die tot dusverre in volkomen rust waren; gelijk integendeel sommige werktuigen, tot het leven der vrucht bijzonder dienende, werkeloos en kleiner worden, en gedeeltelijk ook wel geheel verdwijnen. — Het voldragen kind zuigt vrij sterk aan de borst, ontlast spoedig na de geboorte de pis, en in de eerste vierëntwintig uren ook de eerste drekstof, wier ontlasting nog door de eerste meer dunne melk (*colostrum*) schijnt bevorderd te worden.

CH. JAC. TREW, *de differentiis hominis nati et non nati* Altd. 1736.

JAC. AD. GESNER, *de mutationibus, quas subit infans statim post partum*. Erl. 1795.

H. C. REST, J. P. PAULS *et* F. SCHMITZ, *respiratio pulmonum foetus et cutis*. Argent. 1806. 4.

J. A. BENNET, *de homine primum respirante*. Harderw. 1782. 8.

TWEEDE HOOFDDEEL.

VAN EENIGE ZIEKTEN EN TOEVALLEN
DER KRAAMVROUWEN.

§. 298.

Reeds door het regelmatig, doch des te meer door het zoo menigvuldig onregelmatige verloop der zwan-

gerheid en verlosfing, en al de daarvan afhankelijke veranderingen in het vrouwelijk ligchaam, ontstaan er eene menigte van ongesteldheden, die zich het gemakkelijkst na de verlosfing openbaren, vooral daar er ook alsdan nog vele ongewone omftandigheden plaats hebben. Daarom komen eenige ziekten der kraamvrouwen zoo menigvuldig voor, dat men langen tijd geneigd was, om ze te beschouwen als aan dit tijdstip noodwendig en regelmatig verbonden. *Het karakter dezer toevallen kenmerkt zich door gezonkene * prikkelbaarheid, verhoogde gevoeligheid* (vooral in den omtrek des onderbuiks), *als ook door verhoogde reproductieve werkzaamheid **: van daar het gevoel van matheid en zwakte; de neiging tot krampachtige toevallen, de voorbeschiktheid tot ontstekingen van den onderbuik en tot uitzweetingen van wei ** B.

§. 299.

Tot de oorzaken van deze gesteldheid behoort het volgende: 1) verhooging der verdierlijking (*assimilatio*) en der wedervoortbrenging (*reproductio*) gedurende de zwangerheid, waardoor op het einde derzelve het gansche ligchaam der vrouw, en vooral de onderbuik, rijker aan vochten en inzonderheid aan bloed wordt, dan te voren, terwijl er bij de regelmatige verlosfing niet zoo veel ontlast wordt, als tot de volkomene herstelling van het evenwigt noodig is (B.); 2) gemis van beweging in den laatsten tijd der zwangerheid; 3) het gevoel van angst voor de verlosfing, en ook dikwijls de vrees voor schande; 4) de moeilijke en ten deele belemmerde spijsverteering, die door de uitzetting van de zwangere baarmoeder en de daardoor

veranderde ligging der ingewanden te weeg gebragt wordt; 5) pijnen en overmatige inspanningen der spieren gedurende de verlossing; 6) de dikwijls plotselinge veranderingen, die in den bloedsomloop en de verschillende afscheidingen en uitwerpingen gedurende en na de verlossing plaats hebben, en inzonderheid de belette afscheiding der melkachtige kraamzuiveringen en huiduitwaseming; 7) verkeerde aanwending van geneesmiddelen, vooral verhittende, onnoodige aderlatingen, ongeschikte behandeling bij de verlossing, die dikwijls in ware mishandelingen, kneuzingen enz. overgaat. — Ten gevolge van deze nadeelig werkende oorzaken en aandoeningen van bijzondere deelen, hebben er vele belemmeringen plaats, die gedeeltelijk op zich zelve, gedeeltelijk op eene veelvoudige wijze in onderling verband staan, waarvan de hier volgende zeker de menigvuldigste en gewigtigste zijn.

I. *Van de bloedstortingen uit de baarmoeder na de verlossing.*

§. 300.

De bloedstortingen zijn van een tweeledigen aard: 1) het bloed vloeit op eene *zigtbare* wijze, (en dikwijls tot schrik van den verloskundige en der bijzijnden, met een regelmatig stroom) uit de teeldeelen af. Daarbij ontbreken de weeën, de baarmoeder blijft altijd uitgezet of wordt dit op nieuw; zij trekt zich niet zoodanig te zamen, dat zij zich op het gevoel als een kogel boven de schaambeenderen vertoont. Het gevolg daarvan is een zeer gevaarlijk verlies van krachten, dat zelfs bezwijming, en dikwijls den dood kan veroorzaken. (*)

(*) Dit verlies van krachten is kenbaar uit eene lijk-

§. 301.

2) Het bloed komt wel uit de vaten, doch wordt echter door het geronnen bloed, dat zich voor den mond der baarmoeder bevindt, of door een gedeelte der vliezen in de holte der baarmoeder teruggehouden. Voor het bestaan van deze zoogenoemde *verborgene bloedstorting* pleiten de volgende teekenen: een aangenaam gevoel van warmte, dat door eene stompe pijn wordt gevolgd, opgezetheid en oogenschijnelijke zwelling van den buik, zonder dat men de baarmoeder als een vasten kogel boven de schaambeenderen (§. 227.) kan voelen, en eindelijk alle toevallen, welke gewoonlijk een hoogen graad van zwakte plegen te vergezellen, b. v. bleekheid des gelaats en der fiddere lippen, een meer en meer afnemende pols, eene doffe, matte blik, koud zweet op het voorhoofd, zuchten, geeuwen, koude der ledematen, flauwten enz. (*)

achtige koude, bleekheid, ingevallen gelaat en kleinen pols, die eindelijk, indien de oorzaak niet bij tijds kan worden weggenomen, in stuiptrekkingen en den dood overgaat. Soms herhaalt zich de bloedstorting, na reeds een geruimen tijd, ja zelfs dagen, te hebben opgehouden. Zie de *Traité des hemorrhagies internes de l'uterus, qui surviennent pendant la grossesse, dans le cours du travail et apres l'accouchement*, par A. C. BAUDELLOCQUE. Paris, 1830. 12°. *Histoire des hemorrhagies, de leur causes et traitement etc.* par D. LATOUR. Paris, 1830. II Vol. 8°.

(*) Dit alles staat gelijk met hetgeen bij §. 265. omtrent de bloedstorting voor de geboorte gezegd is, behalve dat het tijdperk, waarover wij nu handelen, gevaarlijker is, dewijl de vaten van de baarmoeder geene andere vastheid hebben dan in derzelver eigene zamentrekkingen, en

De oorzaken, door welken er na de verlossing het ligtst bloedstortingen ontstaan, zijn: te spoedige verlossingen, waarbij de moederkoek zich ten deele of geheel heeft losgemaakt, en de baarmoeder, door de te plotselinge ontlediging, hare zamentrekkingskracht eenigermate verloren heeft; te hevige inspanning bij eene te langdurige verlossing en de daaruit voortkomende zwakte der baarmoeder; ophooping in dezelve, koortsachtige opgewektheid van het vaatgestel door prikkelende dranken en geneesmiddelen, door gemoedsaandoeningen en andere oorzaken verwekt. De grootheid van het gevaar hangt af van de hoeveelheid van het uitgestorte bloed; doch het gevaar is des te grooter, naarmate het bloed in een korteren tijd verloren wordt. De gevolgen zijn flauwten, en eene zoodanige uitputting, dat of de dood meestal onder stuiptrekkingen geen steunpunt van den op het ligchaam der vrucht nog door de aanhangende moederkoek gedeeltelijk gestopt worden; terwijl ook de toevloed van bloed vermeerderd wordt door het gemis van ondersteuning der groote vaten in het bekken. De bloedvloeijing na de verlossing heeft echter ook voordeelen boven anderen: 1) dat dezelve de nu reeds geboren zijnde vrucht niet regstreeks in gevaar brengt; 2) dat de hulpmiddelen een veel ruimer toegang vinden, en niettegenstaande het gevaar de hoop op genezing steeds groot is. BOER's *Abhandlungen*. I. Bd. 1. St. S. 100 fgd. II. Bd. 1. St. S. 36. — Daar alles, wat de kraamzilveringen, naweeën en bloedvloeijing in het kraambed betreft, door SIEBOLD in zijn *Handboek enz.* bl. 37—194. IV. D. 1. St. BAUDELLOCQUE en LA TOUR, t. a. pl. uitvoerig en uitmuntend is behandeld, kunnen wij volstaan met derwaarts te verwijzen.

volgt, of er eene dikwijls langdurige krachteloosheid overblijft.

ROESCHLAUB's *Magazin der Heilkunde*. V. B. 2. St. S. 257.

A. LE ROY, *Vorlesungen über die Gebärmutter Blutflüsse etc. a. d. Fr. mit Anm. von J. CL. RENARD*, Leipz. 1802. 8. — A. LE. ROY, *Leçons sur les pertes de sang pendant la grossesse, lors et à la suite de l'Accouchement etc.* Paris, 1801. 8.

C. A. SPANGENBERG, *über die Blutflüsse*. Braunschw. 1805.

Dr. MENDE, in het *Gemeinsame Deutsche Zeitschrift für Geburtskunde*. Bd. 1. Heft. 2. S. 315.

II. *Van de stuipen na de verlossing.*

§. 303.

Stuiptrekkingen in het algemeen zijn onwillekeurige zamentrekkingen dier spieren, welke anders aan den wil zijn onderworpen, waarbij niet zelden de bewustheid verloren gaat. Het beloop van een aanval is genoegzaam als volgt: de spieren van het aangezicht maken gewoonlijk den aanvang, en geraken in onge-regelde beweging, daarop volgen de spieren van den hals en der ledematen; daarbij rollen de oogen, de tanden knersfen, en de mond wordt met schuim bezet. Er volgt mondklem en stijfte van het gansche ligchaam met eene bewustelooze sluimering; allengskens keert de bewustheid weder, en alleen de herinnering, als ook de geestvermogens in het algemeen, blijven gewoonlijk nog eenigen tijd in een lijdenden toestand.

§. 304.

De meest gewone oorzaken van het uitbreken der stuipen na de verlossing, zijn: te snelle ontlediging der baarmoeder, plotselinge schrik en kwelling, enz.,

indien zij vrouwen treffen, die buitendien zeer geleden hebben; deze oorzaken, als ook de bekende voorboden (§. 263.), moeten den verloskundige opmerkzaam maken. Als de stuipen zonder bijzonder hevig werkende oorzaken ontstaan, dan bestaat er gewoonlijk eene zekere, nog niet genoegzaam bekende voorbeschiktheid en ook niet zelden een plaatselijk gebrek, b. v. borstwaterzucht, enz. Evenwel zijn zij somtijds ontstaan en doodelijk geworden, zonder dat de voorafgaande omstandigheden of de lijkopening de geringste opheldering gegeven hebben. — (Het gevaar bij dezelve hangt niet af van de hevigheid der stuip-trekkende bewegingen, maar van den graad van het verlies der bewustheid B.) — Als zij uit een hoogen graad van zwakte, na een hevig bloedverlies ontstaan, dan zijn zij niet zelden de voorboden des doods. (*)

Betrachtungen über Entstehung und Behandlung einiger krankhaften Zustände, welche zuweilen bei Gebärenden gleich nach der Geburt des Kindes einzutreten pflegen, von Dr. C. G. CARUS, in HUFELAND'S Journal der prakt. Heilkunde. 1816. Dec. N°. II.

(*) Over het algemeen is het zeer moeilijk de oorzaken der stuipen in allen gevalle te kennen, ten zij dezelve van bijzondere of organische gebreken afhangen. — Zie PETRI, *de convulsionibus gravidarum, parturientium et puerperarum*. Goett. 1790. MIGUEL, *Abhandlung von der Convulsionen bei Schwangern, Gebärenden und Wochnerinnen*. Leipz. 1824. 8. E. VON SIEBOLD, *Handboek enz.* IV. D. 3. en 4. St. bl. 596—612. DEWEES, in MOLL en ELDIK's *praktisch tijdschrift*, 2. Suppl. 4. Stuk. bl. 289 volgg.

III. *Van de zogkoorts.*

§. 305.

Somtijds ontstaan er van den tweeden tot den vierden dag na de verlossing koortsachtige verschijnselen, die door de vroedvrouwen en vele vroedmeesters als doorgaans noodwendig beschouwd en *zogkoorts* genoemd worden. Onder de menigte van onderstellingen, die wij over het ontstaan van de zogkoorts bezitten, is de meest algemeene thans nog die, welke de in de borsten dringende melk en de ongewone afscheiding derzelve als oorzaak der zogkoorts beschouwt; doch ook tegen dit gevoelen kan men verschillende redenen inbrengen; en wel inzonderheid, dat de melk immers niet altijd na, maar meestal reeds voor de verlossing, en alsdan zonder koorts in de borsten komt. (*)

§. 306.

Het valt wel niet te ontkennen, dat de aanvang van alle aanmerkelijke afscheiding met eene koortsachtige

(*) De algemeen verhoogde levenswerking, vermeerderde bloedsomloop en afscheiding, welke in de zwangersheid plaats heeft, en de vrucht deszelfs voedsel geeft, blijft ook nu nog voortduren, en is voldoende voor de zogaffscheidung, zoodat de melkkoorts eene ware ziekte is en als zoodanig moet behandeld worden. Ook zoude het te verwonderen zijn, dat juist bij dit gedeelte van het voortteelingswerk de natuur meer aangedaan werd, dan bij andere verrigtingen, b. v. de bevruchting; nogtans is zoo wel de eene als de andere verandering groot genoeg om koortsachtige bewegingen te veroorzaken, vooral bij ziekelijke en aandoenlijke vrouwen. — J. C. F. RUST, *de lactis metastasibus*. Gott. 1793. 4.

beweging is verbonden, en dat de gewigtigheid van de melkafscheiding aldus ook iets dergelijks doet veronderstellen, desniettegenstaande schijnt de oorzaak der zogkoorts in een algemeen lijden van de werktuigen tot den bloedsomloop, en in verandering der bloedmasa gelegen te zijn, die afhangen van eene wezenlijke, of door verhinderde of door verzuimde melkontlasting afkomstige overvloed van vochten, voor de zogafscheiding bestemd. Daarvoor pleiten de volgende redenen: 1) de zogkoorts heeft niet bij alle kraamvrouwen plaats, en kan dus van geene wezenlijke toevallen van het kraambed afhangen; 2) slechts de vrouwen, welke hare kinderen laat aan de borst leggen, krijgen eene kenbare zogkoorts; diegene daarentegen, welke eenige uren na de verlossing zogen, krijgen die bijna in het geheel niet; vrouwen, die in het geheel niet zogen, krijgen ook de zogkoorts het sterkst; 3) de zogkoorts is bij die vrouwen het hevigst, bij welken de borsten reeds voor de verlossing sterk waren uitgezet, en die in het algemeen een zeer bloedrijk gestel hebben; 4) bij de speening, waarbij ook de melkafscheiding gestoord wordt, neemt men bijna dezelfde verschijnselen waar, als bij de zogkoorts. (*)

(*) Bij de speening wordt het zog in deszelfs ontlastbuizen teruggehouden en verhinderd zich te ontlasten, en geen nieuwen toevoer kunnende opnemen, door de daardoor verwekte koortsachtige bewegingen weder in het bloed opgenomen, of door een rijkelijk zweet door den huid ontlast; immers is de reuk van zuurachtige melk, bij de, op het einde dezer koorts sterk zweetende vrouw, niet zelden onderscheidenlijk waar te nemen.

§. 307.

Het beloop der koorts is als volgt: eene ligte hui-vering, die weldra in hevige koude (vooral in de streek van de ruggegraat en in de bovenste ledematen) overgaat, wordt vervangen door hitte over het gansche ligchaam, dorst, versnelde ademhaling, veranderen of ongeregelden bloedsomloop, hoofdpijn, gespannen en volle borsten, met overlopende melkbuizen, en onderdrukking van de kraamzuivering. De aanval duurt omtrent acht tot twaalf uren, en eindigt gewoonlijk met een algemeen zweet, gedurende hetwelk er van zelve melk uit de borsten vloeit, en de kraamzuivering van zelve wederkeert. — De ziekte is op zich zelve niet gevaarlijk, maar kan dit door verzuim wezenlijk worden. (*)

J. H. MUELLER, *Diss. de febre lactea et ejus metastasi.*
Aug. Trevir. 1782.

J. A. BRAUN, *ueber den Werth und die Wichtigkeit der weiblichen Brüste für das Wohl der Menschheit.*
Erfurt, 1804. I. Bd. S. 265.

H. C. A. OSTHOFF, *ueber das Selbststillen.* S. 238.

(*) De verschijnselen, als: hevige dorst, sterke hitte, opgezet, rood aangezigt, ijling, volle en snelle pols enz., hebben dikwijls geheel het voorkomen eener ontstekingskoorts (*synocha*); door eene doelmatige behandeling verdwijnen dezelve echter zeer spoedig. Men leze E. VON SIEBOLD's *Handboek enz.* IV. Deel IV. Stuk. bl. 483-503. en de aldaar aangehaalde schrijvers.

I. D.

Y

IV. *Van de kraamvrouwenkoorts.*

§. 308.

De *kraamvrouwenkoorts* (*febris puerperarum*, *typhus puerperalis*) behoort, in weerwil van vele daaromtrent uitgegevene geschriften, tot de allerminst bekende en minst naauwkeurig bepaalde ziekten. — Somwijlen begint de kraamvrouwenkoorts, even als de zogkoorts: de toevallen zijn slechts heviger, en men bespeurt vooral dit verschil, dat de aanleidende oorzaak van de zogkoorts ontbreekt, en er in het algemeen een plaatselijk lijden van den onderbuik en pijn in de streek van de baarmoeder ontstaat.

§. 309.

Meestal heeft echter de ziekte, als het ware, haar eigen beloop. Allereerst ontstaat er koude, die van zeer onderscheidene graden zijn kan, en gevolgd wordt door eene brandende hitte (*calor mordax*). Deze aanvallen van koude en hitte nemen gewoonlijk een remitteerenden vorm aan; zelden zijn zij bestendig aanhoudend, en nog zeldzamer wil men haar als tusschenpozend hebben waargenomen. De pols is menigvuldig, klein en zwak; doch dit is niet standvastig aldus. Met de melkafscheiding is het verschillend gelegen: zij houdt of na den aanvang van de koorts, of reeds voor dien tijd op, en dan slinken de borsten, of zij duurt ook onafgebroken voort; eveneens is het met de kraamzuivering, die gewoonlijk onderdrukt, of van hoedanigheid veranderd is, doch ook dikwijls ongestoord blijft. Het gewoonste en bijna *wezenlijkste verschijnsel* is eene hevig snijdende *pijn in den onder-*

buik, die of slechts eene bepaalde plaats, vooral de liesstreek, of den ganschen onderbuik inneemt, en met den hoogsten graad van gevoeligheid op het aanraken verbonden is, zoodat zelfs de gewone bedekking niet wordt verdragen. — Zeer gewoonlijk vindt men hierbij ook allerhande zoogenaamde gastrische verschijnselen, van den bitteren smaak af tot de braking toe, waardoor er eene geel-groene slijmachtige stof wordt uitgeworpen. De ontlasting is verschillend; zeldzaam is er verstopping, meermalen een zeer stinkende buikloop. De huid is droog of met zweet bedekt, en de pis is of helder of zeer donker; meestal echter zonder bezinkfel. Als nu de ziekte eenigen tijd geduurd heeft, dan komt er hoofdpijn, matheid, neerslagtigheid, en eene zoo groote zwakte, dat de lijderessen haren toestand niet eens beschrijven, en ten hoogste alleen over pijn in den onderbuik kunnen klagen. — Er volgt bewusteloosheid, stille en dikwijls woedende ijling (*deliria blanda vel furiosa*), het gelaat vervalt; was het aangezigt vroeger rood en opgezet, met een glinsterenden wilden blik, zoo wordt het ten laatste bleek en ingevallen. Zeer gewoonlijk vindt men ook gierstuitslag, scharlaken- en blutsvlekken; en ook krampachtige toevallen, van beving en peeshuppeling af tot vlokkenlezing en verlamming van enkele deelen toe, ontbreken niet. Het bestendigste en meest kenmerkende teeken der ziekte is echter de *onbestendigheid* van alle deze verschijnselen. (*)

(*) Men zou hier nog vele andere, echter niet minder onbestendige, verschijnselen kunnen bijvoegen; dezelve verschillen echter zeer, naar mate van de verschillende in-

De dood volgt of door beroerte (*apoplectisch*) of langzaam; en of op eene geheel zachte wijze, of onder kleine schokken. Na den dood vindt men de huidvlekken donkerder, en na een gering tijdsverloop vloeit er eene bruine etterachtige stof uit den neus en den mond. Bij de lijkopening vindt men in de buikholte (dikwijls ook in de borst- en schedelholten), eene weiachtige, melkaardige vloeistof, door wier geelachtig witte vlokken de ingewanden aan elkander vastgekleefd zijn. De hoeveelheid dezer vloeistof is verschillend, dikwijls gering en niet in het oog vallend, somwijlen echter zeer aanmerkelijk; zij riekt geheel kaasachtig, en heeft een zoutachtig zuren smaak; bij het scheikundig onderzoek vertoont deze vloeistof de grootste overeenkomst met de bloedwei. Het is een groot jammer voor de wetenschap, dat men tot dusverre nog geen naauwkeurig onderzoek omtrent de menging des bloeds bij eene kraamvrouw heeft gedaan, en ik moet dit zeer aanbevelen, want dat de betrekkelijke hoeveelheid der weiachtige bestanddeelen zeer overmatig zijn moet, wordt door vele regelmatige en onregelmatige verschijnselen van het kraambed meer dan waarschijnlijk. In verschillende ingewanden van

dividueele en epidemische gesteldheid. Vrij gewoon is echter nog eene opzetting van den pijnlijken buik, het zij geheel of plaatselijk, vooral in eene der *regiones iliacaë*, alsmede eene bleekachtige, papachtige, of oedemateuse zwelling aan onderscheidene deelen, voornamelijk aan de dijen, welke somtijds openbreekt, en eene dunne melkaardige, etterachtige stof uitwerpt.

den onderbuik vindt men sporen eener vooraf plaats gehad hebbende ontsteking. De baarmoeder, die niet veel grooter is dan gewoonlijk na de verlossing, is in zeer vele gevallen over hare gansche inwendige oppervlakte, en dikwijls ook slechts op eene enkele plaats, zwartkleurig, en eenige lijnen diep als *koudvurig*. Deze plaatsen zijn zeer stinkend, en de zelfstandigheid der baarmoeder is daar zelfs bijzonder week. Slechts in enkele gevallen is de scheidde tevens aangetast. In andere gevallen is de baarmoeder minder veranderd, doch de eijerstokken en de buizen van FALLOPIUS des te meer.

§. 311.

Omtrent de natuur der kraamvrouwenkoorts kan men, als men de groote menigte van verschillende gevoelens doorloopt, en openhartig zijn wil, nog niets zekers zeggen. Altijd bestaat er eene ontstekingachtige plaatselijke aandoening der baarmoeder en van hare aanhangsels, van de ronde banden der baarmoeder, der buizen van FALLOPIUS of der eijerstokken (*), welke ontsteking zich door het buikvlies,

(*) Uit de menigvuldige malen herhaalde lijkopeningen blijkt, dat de ingewanden steeds ontstoken en koudvurig, met etter ovetdekt, met schijnvliezen aan elkander verbonden zijn, dat er zich veelal in het bekken etterzakken gevormd hebben, dat er veelal ichor, stinkend vocht, melkachtige wei of kaasachtige etter in onderscheidene holten, vooral van den buik, is uitgestort, en dat de baarmoeder meermalen in deze ongesteldheden betrokken en door versterking en koudvuur is aangetast; dan uit dit alles blijkt nog niet stellig (zoo als de schrijver stelt), dat de ontsteking der baarmoeder bij uitsluiting tot het wezen der

hetwelk deze deelen bekleedt, ook over andere onderbuiksingewanden kan uitbreiden, gelijk dan ook het buikvlies somtijds alleen de zetel der ontsteking is. De koorts (hoezeer zij den schrijver, van den jare 1799 tot 1813, slechts als van een typheusen aard is voorgekomen) schijnt een zeer onderscheiden karakter te kunnen aannemen, dat waarschijnlijk aan de heerschende epidemische gesteldheid en den staanden ziekte-toestand onderworpen is. Als gelegenheid-gevende oorzaken kunnen, behalven de boven in het algemeen bijgebragte, de volgende omstandigheden werken: te vroege verarbeitung der weeën, moeilijke verlossingen, nalatige en geweldige kunsthulp, hevige gemoedsaandoeningen (§. 298.), belemmeringen van de eigenlijke kraamafscheidingen der huid, der borsten, der baarmoeder, mislagen in den eetregel, te spoedige afwisseling der temperatuur, inspanningen onmiddellijk na de verlossing, onzuivere, ongezonde dampkring, en werkelijke tot dusverre nog onbegrijpelijke besmetting, gelijk in het algemeen bij den typhus.

§. 312.

Alle verloskundigen stemmen daarin overeen, dat de ziekte buitengemeen gevaarlijk en ligt doodelijk is; hier en daar verspreid, (*sporadisch*) is zij niet zoo

ziekte behoort. Zie HUFELAND's *Journal der prakt. Heilkunde*. Band XIV. St. 2. S. 106 fgd. Band XIII. St. 2. N°. 1. B. XIX. St. 4. N°. 1. Bd. XX. St. 1. — G. A. RICHTER, *Spec. Therapie*. Tom. II. S. 147 fgd. HORN's *Archiv*. Bd. I. St. 1. N°. 1. W. H. BUSCH, in *Gemeins. Deutsche Zeitschrift für Geb.* Weimar, 1828. I. Bd. 3. St. II. B. 1, 2 en 3, St. III. B. 1. St. RITGEN, *Ibid*, IV. Bd. 4. St.

gevaarlijk, dan wanneer zij, algemeen-heerschend, in kraamvrouwengeftichten voorkomt. Hoe grooter de onvoorfchilligheid en neerflagtigheid der ziel is, des te erger is het; eveneens moet men, wanneer er uitflag of fcharlakenkoorts bijkomt, eene ongunftige voorzegging doen; wanneer men bij het onderzoek den bodem der fcheede en het *fcheedegedeelte meer koud dan warm* vindt, als de *pijnlijkheid* van het uitgezette onderlijf *plotseling verdwijnt*, en men daarin eene *vochtgolving* kan befpeuren, dan is dit een onfeilbaar voortteeken des doods. (*)

(*) Men vergelijke verder (behalve de door FRORIEP aangehaalde fchrijvers) E. VON SIEBOLD, *Handboek enz.* IV. Deel. 3. en 4. Stuk. bl. 504—574, en de aldaar bl. 574—577 en 625—654. I. St. bl. 194—241. vermelde fchrijvers; benevens RUST's *Magazin für die ges. Heilkunde*. Band XVIII. Heft 3. S. 462. *Neue Samml. aus-erles. Abhandl.* Band V. St. IV. overgenomen in MOLL en ELDIK's *Tijdschrift*. II. Jaarg. 1. St. bl. 55—63. Zie ook Ald. II. Supp. 4. St. bl. 369. III. Jaarg. 2. St. bl. 107—113. VIII. Jaarg. 6. St. bl. 523 volgg. — HORN's *Archiv. u. s. w.* 1822. Nov. Dec. 1829. Jan. Febr. W. H. BUSCH, *Observata quaedam de febre puerperali*. Marb. 1827. W. J. SCHMITT, *Heidelberger klinische Annalen*, 1827. III. Bd. 1. St. J. G. HUBNER, *de febribus puerperarum*. Wurzb. 1826. 8. G. A. HENSLER, *de febre puerperali*. Wurzb. 1826. 8. C. A. W. BEHRENS, *Vorlesungen über praktische Arzneiwissenschaft*, herausgegeben von CARL. SUNLEDIN. VI. B. 2. Abth. Berl. 1828. G. J. POOL, *Handleiding tot de erkenning en genezing der kraamvrouwenkoorts*. Amst. 1828. 8. F. AMELUNG, in HUFELAND, *Journal etc.* 1828. April. Mai. — J. B. VAN DEN ZANDE, *Bemerkingen nopens de geneesk. behandel. der kraamkoorts*, Antw. 1822. RIJGEN, t. a. pl.

SACHTLEBEN'S *Kritik der vorzüglichsten Hypothesen, die Natur, Ursache und Heilung des Kindbettefiebers betreffend.* Leipz. 1795.

HECKER'S *Annalen der gesamm. Medic.* 1810. Sept. u. Oct.

BOER'S *Abhandl. etc.* I. Bd. 2ter und 3ter Th.

W. A. FICKER'S *Beiträge zur A. W., W. A. W. und Entbindungskunst.* I. Hest. Munster, 1796.

E. HORN'S *Archiv für die med. Erfahr.* I. B. Leipz. 1801.

Dezelsde, *Archiv.* 1809. Mai. 1810. November.

J. C. E. HARTWIG, *Diss. de febre puerperarum.* Goett. 1803. 4.

Versuch eines, nach Grundsätzen der Erregungstheorie abgefassten, medicinisch praktischen Leitfadens zur Heilung einiger sthenischen, besonders asthenischen Krankheitsformen etc. Leipz. 1807. 2ter Theil. 8.

F. C. NAEGEL'S *Schilderung des Kindbettefiebers, welches von Junius 1811 bis April 1812 in der G. H. Entbindungsanstalt zu Heidelberg geherrscht hat.* Heidelb. 1812. 8.

NIC. GREGOR. VAN DER SMISSEN, *Diss. de peritonitide, febris puerperarum dicta.* Lugd. Bat. 1819.

AUG. SCHIEBLER, *Diss. de febre puerperarum.* Berol. 1818.

JOH. LAW, *Diss. de febre puerperali.* Erl. 1810.

D'OUTREPONT, *Bemerkungen ueber das im Entbindungsinstitut zu Würzburg 1820 herrschende Kindbettefieber, in Salz. med. chir. Zeitung.* 1821. — Dezelsde, *Geschichte eines ansteckenden Kindbettefiebers, welches in der Entbindungsanstalt zu Würzburg herrschte.*

In TEXTOR'S *neuem Chiron.* I. Bd. I. St. p. 151. Sulzbach, 1821. 8.

A. E. VON SIEBOLD, *Versuch einer pathologisch-therapeutischen Darstellung des Kindbettefiebers, nebst Schilderung desjenigen, welches im Februar, März und April 1825 zu Berlin geherrscht hat.* Frankf. 1826. 8. Nederl. Amst. 1828.

LOBSTEIN, *Diss. sur la fièvre puerperale*, Art IX.

D. G. KIEZER, *de febris puerperarum indole, varia forma et medendae ratione*. Jenae, 1826. 4.

DR. BUSCH, *Betrachtungen ueber das Kindbettfieber*, in het *Gemeins. Deutsche Zeitschrift etc.* Bd. I. Heft 2. S. 346.

Vergelijk in PLOUCQUET's *literatura medica digesta* en in het daartoe behoorende *supplementum* I. het artikel *febris puerperalis*.

V. *Van de omkeering der baarmoeder.*

§. 313.

De baarmoeder kan na de geboorte des kinds onvolkomen, doch ook zoo volkomen omgekeerd worden, dat hare inwendige oppervlakte buiten de teeldeelen afhangt (*prolapsus uteri cum inversione*). Er ligt dan voor de teeldeelen een rood, ruw en glinsterend, zeer gevoelig gezwel, waaraan somwijlen de moederkoek nog is vastgehegt, en waaruit gewoonlijk eenige bloetvliet plaats heeft. Boven de schaambeenderen voelt men daarentegen niets van den harden kogel, die de baarmoeder anders gewoonlijk na de verlossing vormt. Doorgaans hebben er in den beginne flauwten enz. plaats. Duurt deze gesteldheid eenigen tijd hulpeloos voort, dan ontstaat er ontsteking met hevige pijn en koorts, en eindelijk volgt er ook wel versterking, waarbij dan het leven der vrouw in het grootste gevaar verkeert. De oorzaken, welke dit toeval kunnen te weeg brengen, zijn: zware baarmoederpolypen, al te spoedige verlossingen bij een zeer wijd bekken en bij een opgerigten stand der vrouw, en eene onbehoedzame, onverstandige, ruwe trekking aan de navestreng, alvorens de moederkoek zich van den

wand der baarmoeder heeft losgemaakt, en cene plotfelinge sterke drukking van buiten op den bodem der baarmoeder (?). Deze oorzaken zijn dan vooral te vreezen, als er zwakte en slapheid der baarmoeder bestaat. (*)

F. J. ARMBRUSTER, *sistens felicem uteri post partum inversi repositionem*. Argent. 1766.

J. F. WEISSENBORN, *von der Umkehrung der Gebärmutter*. Erfurt 1738.

SAXTORPH's *gesammelte Schriften*. S. 300.

(*) De omkeering der baarmoeder heeft dikwijls, indien er geene spoedige hulp gebezigd wordt, zeer nadeelige gevolgen, zoo als: stoornissen in de kraamzuivering, drukking op den endeldarm en op de blaas (*dysurie*, *strangurie* en *ischurie*), geweldige pijnen, veroorzaakt door de uitrekking van het buikvlies, de banden van de baarmoeder enz., ontsteking, verharding, knoestgezwel, versterking enz. Men vergelijke E. VON SIEBOLD's *Handboek* enz. IV. D. 2. St. bl. 279-391. II. D. 2. en 3. St. bl. 229-247, en aldaar aangehaalde schrijvers, alsmede W. J. SCHMITT, in A. E. VON SIEBOLD's *Journal für Geburtshülfe, Frauenzimmer und Kinderkrankheiten*. III. B. 1. St. S. 40. 1825. V. Bd. 3. St. 1826. VII. B. 2. St. 1827. HORN, in het *Gemeins. Deutsche Zeitschrift für Geburtskunde*, 1828. Band III. St. 2. KELSCH, ald. III. B. 1. St. Eene *prolapsus uteri inversi bicornis* beschrijft FR. W. STURM, in HARLESS *neue Jahrbücher der Deutschen Medicin. und Chirurgie*. Band XVI. 2. Supplementheft. Bonn. 1827. Zie ook A. NORTIER, in *HIPP. Magaz.* VI. D. bl. 275-418. G. SALOMON, in de *Geneesk. Bijdragen*, Rott. 1830. III. D. 1. St. bl. 65. en v. en aldaar aangehaalde schrijvers. FRORIEP's *Notizen u. s. w.* 1829. XXVI. Bd. S. 43 fig. *Geburtsh. Demonstrat.* VIII. Heft. Taf. 31.

A. J. DAILLEZ, *précis des leçons de Mr. Baudelocque sur le renversement de la matrice*. Paris, 1803. 8.

G. V. HERDER, *diagnostisch-praktische Beiträge*. S. 119-154.

C. J. FRIES, *von der Umkehrung oder eigentlichen Inversion der Gebärmutter*. Münster, 1804. 8.

BASSELLANCE, *sur le renversement de l'uterus*. Paris, 1811. 8.

KOEPPEN, *de inversione uteri*. Rostock, 1806. 8.

NAUCHÉ, *des maladies de l'uterus*. Paris, 1816. 8.

E. M. HERZOG, *de inversione uteri*. Wirceb. 1817. 4.

F. R. A. MEISSNER, *die Dislocationen der Gebärmutter etc.* Leipzig, 1822. 8.

D. BREDENOLL, *Beobachtung eines vollkommenen Vorfalles mit Umstülpung der Gebärmutter*, v. SIEBOLD's *Journal*. 1823. IV. Bd. S. 67.

DR. FLAMM, *Umstülpung der Gebärmutter durch ungeschicktes Lösen der Placenta bewirkt*. Zie RUST's *Magazin*. XV. Bd. 1823. S. 536.

E. VON SIEBOLD, *Lehrbuch der praktischen Entbindungskunde*. 4. Aufl. §. 636 - 688.

VI. *Van eene bijzondere vooroverkanteling van de baarmoeder, die in een hoek gebogen is.*

§. 314.

De baarmoeder kan zich na de verlossing in een bijzonderen staat van slapte en uitzetting bevinden; zoodat, terwijl het onderste gedeelte der baarmoeder in de natuurlijke rigting en ligging blijft, hare bovenste helft zich voorover buigt: de baarmoeder is dan als geknakt, het bovenste gedeelte der achterste vlakke ligt naar voren, de bodem is tegen de schaambeenderen gerigt, en het onderste deel der voorste vlakke ligt tegen het onderste gedeelte derzelfde vlakke aan. —

Als voorafgaande en daartoe gedeeltelijk voorbeschikkende oorzaken en als begeleidende toevallen, heeft men het volgende waargenomen: een zwak ligchaam; een sterken hangbuik; groote gevoeligheid der scheede en menigvuldige krampachtige opzetting van den onderbuik bij de verlossing; op den derden dag na de verlossing pijn (in den aanvang een gevoel, dat gelijk naar de anders op dezen tijd gewoonlijk ophoudende naweeën), die zich achter de schaambeenderen en in de strekking naar de dijën voordoet, koorts, terugblijving der kraamzuiveringen en van het zog, teekenen van een lijden der spijsverterende werktuigen en van het zenuwgestel, enz. — Op den elfden dag na de verlossing volgde de dood, waarna de lijkeopening de kwaal eerst leerde kennen. (*) — Op dergelijke wijze kan de baarmoeder zich met het boven-deel achteroverbuigen, en er eene *achteroverbuiging* der baarmoeder (*retroversio uteri*) na de verlossing ontstaan. (†)

(*) Daar FRORIEP de vooroverbuiging der baarmoeder zeer kort afhandelt, zoude ik hier (vreesde ik niet dit verloskundig handboek door mijne aantekeningen voor leerlingen te zeer in prijs te doen stijgen) uit de werken van CARUS, JOERG, MEISSNER en anderen, nog veel belangrijks kunnen bijvoegen, en het onderscheid tusschen vooroverbuiging (*versio uteri antrosum*, *antroversio*) en ombuiging (*pronatio*), (welke laatste eigenlijk door FRORIEP bedoeld wordt,) moeten opgeven; dan daar dit alles breedvoerig en uitmuntend in E. VON SIEBOLD'S *Handboek* enz. IV. Deel II. Stuk bl. 340—357 is behandeld, wil ik derwaarts verwijzen.

(†) Ook de achteroverbuiging en achterwaartskanteling

MOELLER, *de pronatione uteri post partum, morbo atroci nondum descripto*. Marburgi, 1803. 8.

Ueber Umbeugung der Gebärmutter nach der Geburt etc. in SIEBOLD's *Lucina*. IV. Bd. S. 55.

HORN, *Geschichte einer mit Zehrfieber verbundenen und glücklich geheilten Versio uteri (antrorsum)* in het *Archiv. für med. Erfahr.* VI. Bd. 2. Heft. S. 316.

Von der Zurückbeugung der Gebärmutter in ungeschwängertem Zustand von Dr. BRÜNNINGHAUSEN, in SIEBOLD's *Journal*. III. Bd. 1. St. S. 59.

VII. *Van de ontsteking der borsten.*

§. 315.

De gewone oorzaken zijn verkouding, uitwendige drukking en stooten, hevige gemoedsbewegingen enz., voornamelijk echter verzuim en ongeschikte behandeling der borsten. De opgezwollene borsten worden rood, heet, en zeer pijnlijk, en in gewone gevallen wordt de melkafscheiding minder, of zij houdt geheel op. In den beginne is de zwelling glad en glinsterend; bij een hooger graad, waardoor ook de melkvaten zeer sterk opzwellen, wordt de borst ongelijk en knobbelachtig. Als de ontsteking zeer hevig is, dan komt er nog koorts en hoofdpijn bij.

§. 316.

De ontsteking kan overgaan tot verdeeling, of als zij steeds hooger klimt, kan zij in verettering overgaan, hetwelk men uit de kloppende pijn in de borst

(*retroversio* en *supinatio*) der baarmoeder bestudeere men in het zoo even genoemde *Handboek* enz., bl. 310 - 340, en bij de aldaar aangehaalde schrijvers.

vermoedt, en uit de vochtgolving, als ook uit de witachtige vlek op de ontstokene plaats gevormd, kan opmaken. In zeldzame gevallen gaat de ontsteking tot verharding over. — Ook de tepels, vooral wanneer hare opperhuid zeer week is, worden dikwijls ontstoken, en gaan zelfs tot verzwering over, zoodat de zooging daardoor kan worden afgebroken. — Als er zich in eene inwendige holte des ligchaams eene melkachtige vloeistof bevindt, of wel, als er aan de oppervlakte des ligchaams gezwellen ontstaan, die met zulk eene vloeistof gevuld zijn, dan noemde men dit eene zogverplaatsing (*metastasis lactea*), en voedde omtrent de wording en den aard daarvan zeer zonderlinge begrippen. Zij is waarschijnlijk niets anders, dan eene ongewone nederzetting van een gedeelte der wei, welke de bloedmasa in dit tijdperk in overmaat bezit; eene afscheiding, die zeker afhangt van bijzondere omstandigheden, die men naauwkeurig moet gadeslaan. (Vergelijk §. 310. (*))

F. J. A. SCHLEGEL, *de statu sano et morboso mammarum in gravidis et puerperis*. Jena, 1792.

J. JOSEPH, *de metastasi imprimis lactea*. Halae, 1792. 8.

F. G. VOIGTEL, *de metastasibus lacteis*. Halae, 1795. 4.

BOER'S *Abhandlungen etc.* II. Band. I. Th. S. 103. fg.

(*) Over de ontsteking der borsten en de zoogenaamde zogverplaatsingen zie men E. VON SIEBOLD'S *Handboek*, enz. IV. Deel. 2. St. bl. 434—480. — N. BEHREND'S, *de lactis metastasibus*. Gott. 1781. 4. — G. E. RUST, *de nonnullis lactis et mammarum vitiis post puerperium*. Gott. 1785. 4. — ED. GRAEFE zag uit *abscessen* aan de knie, na onderdrukte zogafscheiding, zuivere melk te voorschijn komen. HUFELAND'S *Journal u. s. w.* 1826. Aug.

VIII. *Van de scheuring des bilnaads, de zwelling
der schaamlippen en de ontwrichting
des staartbeens.*

§. 317.

Deze scheuring is of zeer onbeduidend, zoodat zij alleen den schaamband betreft, of zij is aanmerkelijker, en dan is *a*) een gedeelte van den bilnaad zelve; *b*) de gansche bilnaad tot aan den aars gescheurd (*ruptura perinaei partialis et totalis*). — De omstandigheden, die de scheuring bevorderen en verwekken, zijn: 1) gebrekkige helling van het bekken, 2) opgerigte stand der vrouw in het vierde tijdperk der verlossing, 3) zeer harde en stijve vezelen van een zeer breed bilnaad, eeltachtige lidteekens van vroegere scheuringen, 4) een groot hoofd van het kind, 5) te spoedig voortdringen des kinds, 6) verzuimde en verkeerde behandeling van den bilnaad, en onhandig gebruik van instrumenten. — Eene kleine scheur heeft ook slechts eene ligte bloeding en geringe pijn ten gevolge. Is de bilnaad echter geheel opengescheurd, dan volgt er eene hevige ontsteking der naburige deelen, voornamelijk van den endeldarm, en verlamming van den sluitspier, benevens onvermogen om de drekstoffen en de pis op te houden. (*)

(*) Men kan hier nog verscheidene andere oorzaken van de scheuring des bilnaads bijvoegen (zoo als: de minder geregelde plaatsingen van het hoofd, vooral in de derde en vierde liggingen, volgens §. 205, 236 enz.). Men leze daarover TEXTOR's *Neue Chiron*. I. Bd. 2. St. S. 257. WIGAND's *geboorte van den mensch*. III. Deel. IX. Afd.

GEHLER, *de ruptura perinaei in partu cavenda*. Lips. 1781. — In het Hoogd. vertaald in zijne *kleine Schriften*, II. Th. S. 108.

FICKER'S *Beiträge etc.* I. Hest. S. 41.

TRINCHINETTI, *Observationi etc.* (§. 283.)

§. 318.

Niet zelden gebeurt het, dat de schaamlippen aanmerkelijk *opzwellen* en *ontstoken* worden; somwijlen zijn zij ook de zetel van eene somtijds zeer aanmerkelijke *bloeduitstorting*. De oorzaken zijn dezelfde omstandigheden, welke, in een hooger en graad voorhanden zijnde, ook tot de scheuring van den bilnaad (§. 317. N^o. 4 en 6.) aanleiding geven. Het gevolg hiervan is pijn, die vooral bij de pogingen, om van ligging te veranderen en de dijen tot elkander te voeren, zeer hevig worden kan. Men onderscheidt hier de zuchtige en de ontstekingsachtige zwelling. (*)

L. P. H. AUDIBERT, *sur l'épanchement sanguin qui survient aux grandes lèvres ou dans l'intérieur du vagin pendant le travail ou à la suite de l'accouchement*. Paris, 1812. 4.

§. 319.

Ontwrichting van het staartbeen (luxatio ossis coccygis) kan met de scheuring van den bilnaad, doch

LIPPERT, *de perinaei ruptura, inter parturiendum praecavenda etc.* Lips. 1826. 8. G. HOLTHOFF, *Diss. de ruptura petinaei novaque eam sanandi methodo*, Berol. 1829. 8.

(*) E. VON SIEBOLD, t. a. p. bl. 5—14, en 28—36. — MEISSNER, *ueber die Krankheiten der Schaamlippen*, in het *Gemeins. D. Zeitschr.* V. Bd. 2. Hest.

ook zonder dezelve, plaats hebben. De endeldarm, als ook het achterste gedeelte der scheede, is daarbij ontstoken en eenigzins gezwollen, en bij liet onderzoek, dat voor de vrouw zeer pijnlijk is, vindt men eene ongewone beweegbaarheid van het staartbeen. De oorzaken dezer ontwrichting zijn: een te groot hoofd van het kind, eene onnoodige achterwaartsche drukking van het staartbeen en eene ruwe aanwending van den hefboom en van de tang. (*)

(*) De schrijver zoude deze afdeeling (welke, hoewel voor den verloskundige onontbeerlijk, echter niet regstreeks tot de eigenlijke verloskunde behoort) met nog vele andere ziekten en gebreken hebben kunnen vermeerderen; vooral behoorden hier nog de witte pijnlijke zwelling der kraamvrouwen en de manie of krankzinnigheid. Daar wij hier niet breedvoerig zijn mogen, verwijzen wij naar E. VON SIEBOLD'S *Handboek enz.* IV. Deel. III. en IV. Stuk, en de opgegevene literatuur; alsmede naar VAN ELDIK, in het *praktisch Tijdschrift*. I. Jaargang. I. Stuk. bl. 8—20. II. Stuk. bl. 89—97. III. St. bl. 201—225. III. Jaargang. III. Stuk. bl. 200 volgg. III. Jaarg. II. St. bl. 21 en volgg. IX. Jaarg. VI. St. bl. 488—495. H. G. GRIM, *quaedam de phlegmasiae albae dolentis pathologia*, Berol. 1826. E. BOEHR, in VON SIEBOLD'S *Journal für Geburtshülfe etc.* 1827. VII. Bd. 2 St. GOLDMANN en AMMON, in *Gemeinsame Deutsche Zeitschrift*, II. Bd. 2. St. GUIETTE, *Journal général de médecine etc.* Paris, 1827. Janvier. HUFELAND'S *Journal u. s. w.* 1828. Nov. S. 3—24. R. GOUGH, in het *Hamb. Magazin für ausl. Literatur* 1821. Mai. SCHNEIDER, in zijne *Medicinisch-practische Adversarien etc.* Tüb. 1821. 1. Liefer. Kap. XII. en D. DAVIS, in *The London medical and physical Journal edited by MACLEOD. New series.* 1826. Vol. I. Nov. MEISSNER, in het *Gemeins. Deutsche Zeitschrift*. V. Bd. II. Heft.

- CHAMBON DE MONTAUX, *medizinisch-praktische Abhandlung von den Krankheiten der Frauen. Aus dem Franz. von SPOHR*, 2 Bde. Erfurt, 1789—1790.
- CH. L. MURSINNA'S *Abhandlung von den Krankheiten der Schwangern, Gebährenden und Wöchnerinnen*, 2 Bde. Berlin, 1792.
- HAMILTON'S *Unterricht in der Behandlung der Frauenzimmer und neugeborner Kinder-Krankheiten. A. d. Engl.* Leipz. 1793.
- J. VAL. MÜLLER'S *praktisches Handbuch der Frauenzimmerkrankheiten*. III. u. IV. Th. Frankf. 1793, 1795.
- SAYER WALKER, *observations on the constitution of women and on some of the diseases, to which they are especially liable*. Lond. 1803. 12.
- E. VON SIEBOLD, *Handbuch zur Erkenntniss und Heilung der Frauenzimmerkrankheiten*. 1 Bd. Frankf. 1811. 2 Bd. Franckf. 1815. 8. 2 Ausg. 1821. 2tes Bds. 3. Abth. Frankf. a. M. 1826. Ook onder den titel: *Handbuch zur Erkenntniss und Heilung der Krankheiten der Wöchnerinnen*.
- J. PLENK, *doctrina de morbis sexus feminei*. Vien. 1808. 8.
- SCHMIDTMÜLLER'S *Handbuch der medicinischen Geburtshülfe*. II. Band.
- J. CH. G. JOERG'S *Handbuch der Krankheiten des menschlichen Weibes*. Leipz. 1809. 8.
- J. J. C. MENDE, *die Krankheiten der Weiber*. II Bde. Leipz. 1810, 1811. 8.
- J. CAPURON, *traité des maladies des femmes depuis la puberté jusqu'à l'age critique inclusivement*. Paris, 1811. 8.
- CH. MANSF. CLARCKE, *observation on those diseases of females, which are attended by discharges, illustrated by copperplates of the diseases*. Pars I. Lond. 1804. 8.

- CLARCKE's, *Beobachtungen über die Krankheiten des Weibes, welche von Ausflüssen begleitet sind. A. d. Engl. von D. P. HEINECKE*, Hanov. 1817 und 1818. 2 Th. 8.
- WILL. P. DE WEES, *treatise of the diseases of females*. Philadelphia, 1827. 8.
- MARSHALL. HALL, *Commentaries on some of the more important diseases of females. In three parts*. Lond. 1827. 8.
- ROBERT GOOCH, *An account of some of the most important diseases peculiar to Women*. Lond. 1829. 8.
In het het Hoogd. Weimar 1830. 8.
- M. NAUCHE, *Des maladies propres aux femmes*. Paris, 1829. 2 vol. 8.
-

DERDE HOOFDDEEL.

VAN EENIGE ZIEKTEN EN TOEVALLLEN DER PASGEBOREN KINDEREN.

§. 320.

Het is in het oog vallend, dat de moeilijkheden der verlossing, de plotselinge verandering in den bloedsomloop (door de afsnijding van de navelstreng en door de ademhaling), de plotselinge overgang uit de temperatuur van het warme lamsvocht in die der meer koele dampkringslucht, en de aanvang van vele, voor de geboorte in het geheel niet aanwezige verigtingen, dat dit alles het kind zeer geneigd moet maken, om door ziekten te worden aangedaan. — Vele geneesheeren houden de pektstof, anderen het zuurworden der genuttigde melk voor de voornaamste oorzaken van vele ziekten der pasgeboren kinderen; doch bij een meer naauwkeurig onderzoek, is evenwel de ongepastheid van deze begrippen uit verschillende gronden gebleken.

V. Van eenige ziekten der pasgeboren kinderen.

§. 321.

De *schijndood* (*asphyxia neonatorum*) kan met den werkelijken dood (§. 288.) eenerlei oorzaak hebben, doch die slechts in een geringeren graad werken; hij kan echter ook alleen door de verandering, die het kind bij de verlossing ondergaat (§. 320.), en door werktuigelijke belemmeringen in de ademhalings-werktuigen te weeg gebragt worden. De teekenen van den schijndood komen bijzonder met de teekenen van den werkelijken dood overeen, weshalve ook ieder pasgeboren kind, dat geene teekenen van leven geeft (hetzij het eene blaauwroode of eene geheel bleeke kleur hebbe), slechts als schijndood moet beschouwd worden, ten zij de algemeene ontbinding den wezenlijken dood buiten twijfel stelde.

§. 322.

Teekenen van de terugkeering des levens zijn de volgende: *a*) de blaauwachtige bleeke kleur wordt rooder, de slappe ledematen worden steviger; *b*) het hoofd is niet meer hangend, en de onderkaak sluit zich; *c*) de hartslag en de klopping der navelstreng keeren terug, zoodat er uit de laatste, als zij niet toegebonden is, bloed begint te spuiten; *d*) snikkende en roghelende ademhaling; *e*) handen en voeten maken trekkingen, vooral bij uitwendige prikkeling; *f*) regelmatige ademhaling en helder schreeuwen. — Vindt men daarentegen deze teekenen des levens niet, of nemen zij weder af; is de mond open, de lippen bleek, en neemt men bij het kind eene volstrekte on-

gevoeligheid voor alle prikkels waar, dan wordt de wezenlijke dood meer waarschijnlijk. (*)

EHRHARDT, *Tractatus de asphyxia neonatorum*. Memming, 1789.

GEHLER, *de effluente meconio neogeniti vitam non probante*. Lips. 1790. ook in zijne *kleine Schriften*. II. Th. S. 176.

FRORIEP, *de methodo neonatis asphycticis succurrendi*. Jena, 1801. p. 6.

J. M. FRETEAU, *essai sur l'asphyxie de l'enfant nouveau né*. Paris, 1804. 4.

§. 323.

Stuiptrekkingen komen, wegens den hoogen graad van opwekbaarheid van het pasgeboren kind, niet zeldzaam voor, en worden, helaas! zeer ligt doodelijk. Als oorzaken daarvan kunnen de volgende om-

(*) Het is van het hoogste belang om op den toestand en de oorzaken van den schijndood acht te geven, dewijl zich hierop de aanwijzing der hulpmiddelen gronden moet. — Niet dezelfde geneeswijze is aangewezen bij schijndood, door gestremde bloedsomloop, ophooping van bloed naar de hersenen, verlies van bloed, door belette ademhaling en verstopping der luchtpijp door slijm, enz. Men leze TONGOOD, in *The London medical and physical Journal*. 1827. Augt. p. 19. seqq. LEBERTON, *Recherches sur les causes et le traitement de plusieurs maladies de nouveaux nés*. Paris, 1820. Overgenomen in MOLL en ELDIK's *Tijdschrift*, I. Jaarg. 3. St. bl. 265—274. VIII. Jaarg. 4. St. bl. 289—293. Vooral raadplege men de hoogstbelangrijke *dissertatio de asphyxia* van J. BAART DE LA FAILLE. Gron. 1817. 8. Caput IV. en WIGAND's *geboorte van den mensch*, III. D. X. Afd.

standigheden werken: overlading der maag met melk of door overvoeding, de zoding des kinds kort na de werking van hevige gemoedsaandoeningen van de moeder, verkouding, b.v. de doop met ijskoud water, ontsteking van den navelring, wormen en andere nog niet gekende omstandigheden (*). Het kind schreit met een dof geluid, wordt altijd blaauw en vertrekt de spieren van het aangezicht, de mond en neus is met schuim bezet, de onderbuik is opgezet en hard, de ontlasting en waterloozing zijn onderdrukt. Er volgt ligtelijk mondklem, waarbij de onderkaak, eenigzins van de bovenkaak verwijderd, het oog bijna ongevoelig voor prikkeling en stijf op eenig voorwerp gericht is; vervolgens ontstaat er algemeene verstijving en de dood, die of plotseling of ook wel zoo langzaam

(*) Daar wij nog geene ware theorie der zenuwwerking bezitten, is het ten uiterste moeilijk, zoo niet onmogelijk, de naaste oorzaak der stuipen te kennen. Alles echter, wat het hersengestel te zeer prikkelt of deszelfs werking belemmert, als drukking en bloedsophooping der hersenen, overmatige aandoeningen der zintuigen en der buiksingewanden, overlading der maag, vooral bij kunstmatig opgevoede kinderen, het gebruik van opium en andere vergiften, gramschap, schrik, ergernis der vrouw veroorzaken stuiptrekkingen. Daar het bij alle ziekten en vooral bij die der kinderen van belang is, de voorteekenen en beginselen tegen te gaan, beruste men niet in hetgene FRORIEP in dit hoofddeel omtrent de ziekten der pasgeborenen ter loops opgeeft; maar bestudeere dit hoogstbelangrijke, tot de verloskunde (hoewel niet regstreeks) behorende gedeelte bij de hierna opgegevene schrijvers, bij §. 330.

volgt, dat het kind eenige dagen met den dood worstelt. (Bij de lijkopening vond men niet zelden het ruggemerg ontstoken. B.)

BRACHET, *Memoire sur les causes des convulsions chez les enfans, et sur les moyens d'y remedier*. Par. 1824. 8.
Dr. POEL, *ueber Krämpfe und Zuckungen der Kinder in HORN'S etc. Archiv, März und April Heft*. 1825.
Practical observations on the convulsions of children. By JOHN NORTH. London, 1826. 8.

§. 324.

De geelzucht (*icterus neonatorum*) is zoo gewoon, dat men haar voor een noodzakelijk verschijnsel na de geboorte heeft gehouden. Zij is dit echter evenmin als de teruggetreden pekstof er de oorzaak van is. De ware oorzaak ligt veelmeer in eene krampachtige aandoening van de galbuis, die zeer ligtelijk door verkouding wordt veroorzaakt. Zoo gevaarlijk als het kind er dikwijls uitziet, van zoo weinig gewigt is de ziekte gewoonlijk, alleen de kleur lijdt, en het kind bevindt zich overigens meestal zeer wel. (*)

§. 325.

Het *kolyk*, dat insgelijks niet zeldzaam bij pasgeborene kinderen voorkomt, wordt door het aanhoudend schreien, de onrustige ligging, het optrekken en uit-

(*) Alles wat de geregelde uitstorting der gal in den twaalfvingerigen darm verhinderen kan, is oorzaak, dat dit vocht in het bloed teruggevoerd wordt. G. F. H. BRUNING, *de ictero spasmod. infantum etc.* Lipsiae 1773. 8. — J. PH. VOGLER, *von der Gelbsucht und deren Heilart*. Wezlar, 1791. 8. J. F. H. MÜHLENDORF, *de ictero etc.* Berol. 1818. 8.

stooten der voeten, en uit de rommeling in den onderbuik erkend. De oorzaken zijn: overlading der maag, verkouding, dikwijls ook het inslikken van koperroest, enz. Dezelfde oorzaken geven ook dikwijls aanleiding tot *buikloop*, waarmede doorgaans, behalve de groene als gehakte ontlasting, ook nog dezelfde toevallen verbonden zijn, als met het kolyk. (*)

§. 326.

De *spruw* (*aphtae*) zijn kleine witte vlekken en blaasjes, die zich allereerst aan den rand der bovenlip vertoonen, zich van daar allengskens verder in den mond en over de tong verspreiden, en, als zij altijd voortdurend in getal toenemen, door het darmkanaal tot aan den aars voortgaan, rondom welken de huid geheel rood is. Op de blaasjes vormt zich eene korst, en zoodra deze afvalt, volgt er dadelijk eene nieuwe en grootere. Het kind heeft daarbij koorts, weigert te drippen, of braakt de melk weder uit en vermagert. Meestal ligt de oorzaak in onreinheid en onachtzaamheid; de ziekte is in een hooger en graad aanstekend, en deelt zich aan de tepels der zoogster mede. Indien de blaasjes wit blijven, dan is de spruw gewoonlijk van een minder slechten aard, dan wanneer zij geelachtig bruin zijn. Als de kinderen in het leven blij-

(*) Zoowel de bij de kolyk of bij den buikloop ontlastte stoffen hebben gewoonlijk een zuren reuk, die echter meer als gevolg dan oorzaak moet worden beschouwd. Zie J. PURCELL, *Abhandlung von alle Gattungen der Kolik*. Leipz. 1787. 8. Dr. W. H. BUSCH, *Lehrbuch der Geburtskunde*. 1829. 8.

ven, dan duurt de ziekte toch gewoonlijk veertien dagen, en doet hen zeer vermageren. (*)

§. 327.

Bij de *ontsteking der oogleden (psorophthalmia neonatorum)* zwellen de oogleden in de eerste dagen en weken zoodanig, dat zij als het ware een zuchtig voorkomen hebben: zij keeren zich naar binnen om, worden rood, ontstoken, en de Meiboomsche kliertjes scheiden eene groote hoeveelheid etterachtige slijm af. Duurt de kwaal voort, dan wordt er, met de vermeerderde slijmafscheiding ook wel eenig bloed afgescheiden. Stijgt de kwaal nog hooger, dan worden het bindvlies en het hoornvlies aangetast, en alsdan kan het gezigt voor altijd verloren gaan. De voornaamste oorzaak is de te hevige prikkel van het licht, doch ook die van rook of stof, of van eene onreine lucht, verkouding en epidemische oorzaken. Ook schijnen kinderen, wier moeders aan witten vloed onderhevig zijn, ligtelijk door deze ontsteking te worden aangetast.

AMMON, in HECKER'S *literarischen Annalen der gesammten Heilkunde*. I. Jahrg. 1. St. Berlin, 1825.

S. E. STRATINGH, *de ophthalmia neonatorum*. Gron. 1798.

Encyclopädisches Wörterbuch von BUSCH, V. GRAEFE,

(*) Vergelijk J. CH. STARK'S *Abhandl. von den Schwämmchen, nebst eine Uebersetzung des KETELAAR und SLEVOIGT, von den Schwämmigen m. nöth. Anmerk.* Jena, 1784. 8. JUST. ARNEMANN, *Comment. de aphthis, quae a soc.* Paris, palmam obtinuit. Gott. 1787. 8. — C. P. CASPARI, *de aphthis*. Gott. 1797. — H. A. MIDDENBORG, *de aphthis neonatorum*. Gron. 1816.

HUFELAND, LINK, RUDOLPHI. IV. Bd. Berl. 1830. S. 89.
Overgenomen in MOLL en ELDIK's *praktisch tijdschrift der geneeskunde*, IX. Jaarg. 1830. Nov. Dec. bl. 546-565.
en aldaar aangehaalde schrijvers.

II. *Van de plaatselijke toevallen, die door de verlossing veroorzaakt worden.*

§. 328.

Hiertoe behooren: 1) de meestal onbeduidende *gezwellen van de hoofdbekleedselen* en de *verschuiving der schedelbeenderen*, door moeilijke verlossingen veroorzaakt, waardoor het hoofd gedurende een zekeren tijd eene onregelmatige gedaante verkrijgt. 2) De *bloedbuilen*, die zich vierëntwintig, zesënderig, ja achtënveertig uren na de verlossing (even ligt en nog lighter na gemakkelijke dan na zware verlossingen), op de meest verschillende plaatsen onder den peeskalot, (door het bloed dat tusssen den schedel en het schedelvlies uitgestort en grootendeels gewonnen is) als omschrevene gezwellen tot op de grootte van een hoenderei kunnen vormen, welke eene vochtgolving, die naar de diepte schijnt te gaan, doen waarnemen, doch waarbij de huid noch in kleur, noch in warmte, noch in haar verband met de onder haar liggende deelen veranderd is. Verder 3) *ontwrichtingen der ledematen*; 4) *afscheiding van de aangroefels der beenderen en beenbreuken*, welke aan den opperarm, het sleutelbeen en aan de dijbeenderen voorkomen, en meestal door eene ongeschikte kunsthulp zijn veroorzaakt geworden. Van an-

dere meer zeldzame beledigingen spreken wij hier niet. (*)

MICHAELIS, *über eine eigene Art von Blutgeschwülsten*, in LODER's *Journal*. II. B. 4tes St. 1799 S. 657.

NAEGELE, in zijne *Erfahrungen und Abhandlungen etc.* S. 245. en ZELLER, *de cephalaeomatè etc.* Heidelb. 1822. 8.

Dr. BUSCH, *Ein Beitrag zur Aufklärung des Wesens der Schädelgeschwülst etc.* in de *Heidelb. klinische Annalen*. 2. Bd. 2. Heft. S. 245. en de *Bemerkungen zu vorstehenden Aufsätze von FR. C. NAEGELE*, aldaar, pag. 257.

PALETTA, *exercitationes pathologicae*. Mediolani, 1820. 4. pag. 123.

G. F. HOERE, *de tumore cranii recens natorum sanguineo et externo et interno*. Berolini, 1824. 4. en VON SIEBOLD's *Journal etc.* V. Bd. 2. St. 1825. S. 219.

(*) Dat men bij het beoordeelen van de verschuivingen en kwetsingen der schedelbeenderen voorzigtig moet zijn, zie men bij W. J. SCHMITT, *Beleuchtung etc. der Kopfverletzungen neugeborner Kinder etc.* m. II. K. Leipz. 1813. H. A. HIRT, *de cranii neonatorum fissuris ex partu naturali etc.* Lips. 1815. 8. *Beobachtungen und Bemerkungen über die Kopfblutgeschwülste der Neugeborenen von Dr. HUETER in Marburg. Gemeins. Deutsche Zeitschrift*. Weimar, 1829. IV. Bd. 2. Heft.

Zoodra men bij de keering verzuimt de natuurlijke buiging der ledematen in acht te nemen en te volgen, zijn beenbreuken, ontwrichtingen en nog meermalen de afscheiding der *epiphyses* het onmiddellijk gevolg daarvan. Deze en volgende §§ behooren eigenlijk tot het gebied der heilkunde.

III. Van eenige aangeborene plaatselijke gebreken.

§. 329.

Aangroeiing der tong, door den te korten tongriem, of door kleine ter zijde der tong geplaatste bandjes. Het kind kan alsdan de tong noch aan het gehemelte, noch aan de lippen brengen; het kan daarom slechts weinig of in het geheel niet zuigen, en daar de tong de doorzwelging dan niet kan bevorderen, zoo moet het kind altijd hoesten bij de slikking.

§. 330.

De gesloten aars: a) ter plaatse waar de aars wezen moest, vindt men in de plaats daarvan eene blaauwachtig doorschijnende weekte plek, waarachter, even als achter een vlies, de pekstof zich in den endeldarm bevindt; b) de endeldarm zelfs is, en dikwijls zeer hoog toegegroeid, of ontbreekt in zeer zeldzame gevallen geheel (*). — Eene geslotene pisbuis wordt vermoed, wanneer het kind in de eerste twaalf of vierëntwintig uren geen water loost. — In zeer zeldzame gevallen kunnen ook de mond, de neus enz. door vliezen gesloten zijn.

(*) Belangrijk is het door Prof. BAKKER bij een zijner kinderen waargenomen geval, in het *Geneesk. Magazijn* van STIPRIAAN LUISCIUS, ONTYD en MACQUELYN, II. Deel. I. St. bl. 97—114. Zie ook J. G. HASSELMANN, *de ani intestinorumque atresia Traj. ad Rhen.* 1819. 8. ADR. VON PAPPENDORP, *von angeborner Verschlieszung der Hintern bey Kindern. a. d. Lat.* Leipz. 1783. 8.

ROSEN VON ROSENSTEIN'S *Anweisung zur Kenntniss und Kur der Kinderkrankheiten*. Goett. 1798. — R. V. R. van de ziekten der kinderen, uit het Zweedsch vertaald en met aantekeningen van E. SANDIFORT, 2 deelen, 's Hage 1779. 8.

A treatise on the diseases of children, with directions for the management of infants from the birth. Lond. 1784. By MICH. UNDERWOOD, M. D. De nieuwste uitgave is de *Eighth edition, revised, with notes and observations* by SAMUEL MERRIMAN, M. D. London, 1826. 8. — (De door Dr. DE LA SALLE bezorgde Fransche vertaling, is wegens de door JADELOT daarvoor geleverde inleiding en aantekeningen betrekkelijk de leer der teekenen uit het gelaat der kinderen, belangrijk. Zie de *Notizen aus dem Geb. der N. u. H.* N^o. 113. S. 45.)

Der Englische Kinderarzt nach den Grundsätzen der Herrn MOSS und UNDERWOOD. Leipz. 1786.

J. C. G. SCHOEFFER, *über die gewöhnlichen Kinderkrankheiten und deren Behandlung*. Regensb. 1792. Neue Aufl. Regensb. 1803. 8.

ALEX. HAMILTON, *Treatise on the management of female complaints and of children in early infancy*. Edinb. 1792. 8.

CHR. GIRTANNER'S *Abhandlung über die Krankheiten der Kinder*. Berlin, 1794. 8.

CHRIST. AUG. STRUVE'S *neues Handbuch der Kinderkrankheiten*. Berl. 1797.

NISSBETT, *a concise view of the diseases of infancy and childhood*. Lond. 1799.

JOHN CHEYNE, *essays of the diseases of children*. Lond. 1802. 8.

CHAMBON, *des maladies des enfans*. Paris, An VII.

- AUTENRIETH, *Observationes quaedam, quae neonatorum morbos frequentiores spectant.* Tubingae, 1799.
- F. JAHN, *neues System der Kinderkrankheiten etc.* Arnstadt, 1803. 8. 2. Aufl. 1807.
- C. B. FLEISCH, *Handbuch über die Krankheiten der Kinder.* 4 Bde. Leipz. 1803—1812.
- HUFELAND, *goede raad aan moeders.* Amst. 1803.
- J. CH. G. SCHAEFFER, *Beschreibung und Heilart der gewöhnlichen Kinderkrankheiten.* Neue Aufl. Regensb. 1803. 8.
- JOHN HERDTMANN, *Discourses on the management of infants and the treatment of their diseases etc.* Lond. 1804. 8.
- MAYGRIER, *Nouveaux Elements etc.* Paris, 1817. 2 vol. 8.
- OSTHOFF, *kleine Beiträge zur Erweiterung des medicinischen Wissens.* Duisburg, 1804.
- WIGAND, *guter Rath und Unterricht, wie Mütter, ihre Kinder gesund erhalten und Krankheiten bey zeiten erkennen sollen.* Hamburg, 1807. 8.
- GIUSTINI MARUNCELLI, *Compendio delle malattie dei bambini e delle donne.* Napoli, 1808. 8.
- J. J. PLENK, *Handleiding tot de kennis en genezing van de ziekten der kinderen. Uit het Latijn vertaald.* Amst. 1808. 8.
- ADOLF HENCKE, *Handbuch zur Erkenntniss und Heilung der Kinderkrankheiten.* Franckf. a. M. 1809. 2. Aufl. 2 Bde. 1817. 3. Aufl. 1821. 8.
- LUFAGE, *sur les maladies des nouveaux nés.* Par. 1812. 4.
- SCHMIDTMULLER's *Handbuch der medicinischen Geburtshülfe.* 2ter Theil. 1812.
- JOH. FEILER, *Paediatrik oder Anleitung zur Erkennung und Heilung der Kinderkrankheiten.* Sulzbach, 1814.

- L. A. GOELIS, *Praktische Abhandlungen über die vorzüglichsten Krankheiten des kindlichen Alters*. II. Bde. Wien, 1818. 8.
- ALEX. LEBRETON, *Recherches sur les causes et le traitement de plusieurs maladies des nouveaux-nés*. Paris, 1820. — Ook in het Hoogduitsch, door G. WENDT, Leipzig, 1820.
- Recherches sur les maladies les plus importantes et les moins connues de enfans nouveaux-nés*, par ANTON. DUGÉS. Paris, 1821. 4.
- J. CAPURON, *Abhandl. über die Krankheiten der Kinder, nach der 2. Aufl. Mit einer Vorrede begleitet von Dr. F. A. BENJ. PUCHELT*. Leipzig, 1821. *Cours complet d'accouchemens etc.* Paris, 1823.
- J. WENDT, *die Kinderkrankheiten systematisch dargestellt*. Breslau, 1822. 8. *Neue Ausg.* 1828. 8.
- GARDIEN, *Traité complet d'accouchemens et des maladies des filles, des femmes et des enfans*. 3. edit. Paris, 1823. 8. avec fig.
- WILL. P. DE WEES, *Treatise on the physical and medical treatment of children*. Philadelphia, 1825. 2. edition, with corrections. Philadelphia, 1826. 8.
- HEYFELDER, *Beobachtungen über die Krankheiten der Neugeborenen*. Leipz. 1825. 8.
- M. VERON, *Observations sur les maladies des enfans*. Paris, 1825. 8.
- J. CHR. G. JOERG, *über das physiologische und pathologische Leben des Kindes*; ook onder den titel: *Handbuch zum Erkennen und Heilen der Kinderkrankheiten, nebst der physiologie, psychologie und diaetetischen Behandlung des Kindes*. Leipz. 1826. 8. — Een zeer volledig en leerzaam werk, waarin de ziekten

der kinderen niet alleen met grootere uitgebreidheid dan gewoonlijk, maar waarin ook de *physiologie* der pasgeborene en ongeborene kinderen, als grondslag tot de *pathologie* en *therapie* derzelve, uitmuntend wordt behandeld.

C. BILLARD, *Traité des maladies des enfans nouveaux-nés et à la mamelle, fondé sur des nouvelles observations cliniques et d'anatomie pathologique etc.* Paris, 1828. 8. — *Krankheiten der Neugeborenen und Säuglinge etc. A. d. Fr. bearbeitet von F. L. MEISSNER.* Leipz. 1829. 8. Eene andere woordelijke Hoogd. vert. Weimar, 1828. 8. — Een hoogstbelangrijk, uit menigvuldige ervaring ontleend, zeer leerzaam werk. Tot hetzelfde behoort eene

Atlas d'anatomie pathologique, pour servir à l'histoire des maladies des enfans, par C. BILLARD, 10 planches avec le texte explicatif. Paris, 1828. 4.

F. L. MEISSNER, *die Kinderkrankheiten, nach der neuesten Ansichten und Erfahrungen etc. bearbeitet.* II Theile. Leipzig, 1828. 8. bevat weinig eigendommelijks, echter al het nuttige en bruikbare uit vroegere en latere schrijvers.

C. FL. TOURTUAL, *praktische Beiträge zur Therapie der Kinderkrankheiten.* Munster, 1829. 8. Een klein, hoogstbelangrijk, echt praktisch werkje.

MILES MARLEY, *On the nature and treatment of the most frequent diseases of children.* Lond. 1830. 8.







